



HAL
open science

Points de petite hauteur sur une sous-variété d'un tore

Francesco Amoroso, Sinnou David

► **To cite this version:**

Francesco Amoroso, Sinnou David. Points de petite hauteur sur une sous-variété d'un tore. 2005.
hal-00004206v1

HAL Id: hal-00004206

<https://hal.science/hal-00004206v1>

Preprint submitted on 10 Feb 2005 (v1), last revised 17 Oct 2009 (v2)

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Points de petite hauteur sur une sous-variété d'un tore

Francesco AMOROSO et Sinnou DAVID

Résumé : nous obtenons une minoration quasi optimale pour le dernier des minimums dits « géométriques » d'une sous-variété V d'un puissance du groupe multiplicatif \mathbb{G}_m^n . Plus précisément, nous montrons que si \mathbf{x} est un point de $V(\overline{\mathbb{Q}})$ n'appartenant pas à un translaté d'un sous-tore de \mathbb{G}_m^n contenu dans V , de hauteur majorée par une fonction essentiellement linéaire en l'inverse du degré de V , alors \mathbf{x} appartient à un ensemble « exceptionnel » de cardinal fini. Ainsi, à un « ε près », nous montrons les conjectures les plus précises que l'on peut formuler pour ce problème. Les meilleurs résultats connus précédemment, dues au second auteur et P. PHILIPPON fournissaient des minoration monomiales inverses en le degré de V (*confer* [Da-Ph]).

Abstract: we prove an almost optimal lower bound for the so called last “geometric” minimum for the height of a subvariety V of a power of the multiplicative group \mathbb{G}_m^n . More precisely, one shows that if \mathbf{x} is a point of $V(\overline{\mathbb{Q}})$ which does not belong to a translate of a sub-torus of \mathbb{G}_m^n lying in V , of height less than a function essentially linear in the inverse of the degree of V , then \mathbf{x} belongs to a finite “exceptional” subset of V . Thus, one proves “up to an ε ” the sharpest conjectures that can be formulated on this problem. Previously, the best known result in this direction was due to the second author and P. PHILIPPON, who provided lower bounds which were inverse monomial in the degree of V (*confer* [Da-Ph]).

1 Introduction

Dans un article récent, (*confer* [Am-Da1]), nous avons montré une minoration presque optimale pour le « minimum essentiel » de la hauteur des points algébriques d'une sous-variété algébrique V de \mathbb{G}_m^n définie sur $\overline{\mathbb{Q}}$ et géométriquement irréductible. Nous nous proposons ici de compléter ce travail en montrant qu'une minoration de même qualité est en fait valable pour le dernier des minima dits « géométriques » pour la hauteur des points de V . Commençons par rappeler plus précisément ces différentes notions.

Soit n un entier ≥ 1 . Dans ce travail, nous nous restreindrons pour simplifier à la compactification naturelle $\mathbb{G}_m^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n$ du tore¹. Soit V une sous-variété algébrique de \mathbb{G}_m^n , définie sur $\overline{\mathbb{Q}}$, et géométriquement irréductible; le degré de V sera celui de son adhérence ZARISKI dans \mathbb{P}^n . De même, si $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est un point de $\mathbb{G}_m^n(\overline{\mathbb{Q}})$ sa hauteur normalisée $\hat{h}(\boldsymbol{\alpha})$ sera la hauteur de WEIL logarithmique et absolue du point $(1 : \alpha_1 : \dots : \alpha_n) \in \mathbb{P}^n(\overline{\mathbb{Q}})$. Soit θ un nombre réel strictement positif. On note

$$V(\theta) := \{\boldsymbol{\alpha} \in V(\overline{\mathbb{Q}}) \text{ tel que } \hat{h}(\boldsymbol{\alpha}) \leq \theta\} .$$

¹L'essentiel des problématiques et une partie des résultats peuvent se formuler pour une compactification équivariante du tore plus générale. Nous ne rentrerons pas dans ces considérations au cours de ce texte.

Le *minimum essentiel* de V est alors :

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(V) := \inf \left\{ \theta > 0, \overline{V(\theta)} = V \right\} .$$

Rappelons que le minimum essentiel de V est nul si et seulement si V est un translaté d'un sous-tore par un point de torsion : c'est un théorème de S. ZHANG, *confer* [Zha1] pour les courbes et [Zha2] plus généralement (il s'agit de la variante torique du problème dit de BOGOMOLOV).

Rappelons enfin la notion d'*indice d'obstruction*; si V est une sous-variété de \mathbb{G}_m^n , son indice d'obstruction, noté $\omega(V)$ est l'infimum des degrés des hypersurfaces de \mathbb{G}_m^n contenant V . Nous pouvons maintenant rappeler le résultat principal de [Am-Da1] (théorème 1.4) :

Théorème 1.1 *Soit V une sous-variété² de \mathbb{G}_m^n , définie sur $\overline{\mathbb{Q}}$ et géométriquement irréductible. Alors, si V n'est pas contenue dans un translaté d'un sous-tore strict $B \subsetneq \mathbb{G}_m^n$, on a, en notant k la codimension de V :*

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(V) \geq c(n)\omega(V)^{-1} \times (\log(3\omega(V)))^{-\lambda(k)} ,$$

où $c(n)$ est un nombre réel strictement positif, effectivement calculable en fonction de la dimension ambiante n , et $\lambda(k) := (9(3k)^{(k+1)})^k$.

Ce théorème est optimal à des facteurs logarithmiques près : en effet, la conjecture la plus fine que l'on peut faire sur le comportement de $\hat{\mu}^{\text{ess}}(V)$ en fonction de l'indice d'obstruction est la suivante (conjecture 1.2 de *op. cit.*) :

Conjecture 1.2 *Soit V une sous-variété de \mathbb{G}_m^n qui n'est pas un translaté d'un sous-tore strict de \mathbb{G}_m^n . Notons B le plus petit translaté d'un sous-tore de \mathbb{G}_m^n contenant V , alors :*

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(V) \geq \frac{c(n)}{\omega(V, B)} .$$

Ici $\omega(V, W)$ est l'indice d'obstruction de V relatif à la sous-variété $W \supseteq V$, introduit dans la définition 1.1 de *loc. cit.*, i. e. la quantité

$$\min \left(\frac{\deg(Z)}{\deg(W)} \right)^{1/\text{codim}_W(Z)}$$

où Z parcourt l'ensemble des sous-variétés de \mathbb{G}_m^n tels que $V \subseteq Z \subsetneq W$. On a donc :

$$\omega(V, W) \leq \deg(V)^{1/\text{codim}_W(V)} .$$

De plus, il est facile de voir, en tenant compte d'un résultat de M. CHARDIN sur la fonction de HILBERT géométrique (*confer* [Cha], corollaire 2, chapitre 1, page 8 et exemple 1, page 9) que :

$$\omega(V, \mathbb{G}_m^n) \leq \omega(V) \leq n\omega(V, \mathbb{G}_m^n) .$$

L'indice d'obstruction relatif sert donc à tenir compte du degré du groupe ambiant, pour obtenir des résultats (ou conjectures) plus fin(e)s.

²D'une manière générale, toutes les sous-variétés de \mathbb{G}_m^n considérées dans cet article seront supposées algébriques, définies sur $\overline{\mathbb{Q}}$ et géométriquement irréductibles.

Le meilleur résultat dans la direction de la conjecture 1.2 connu précédemment était dû au second auteur de ces notes et à P. PHILIPPON (*confer* [Da–Ph], théorème 1.2) :

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(V) \geq 2^{-41} \deg(V)^{-2} \log(\deg(V) + 2)^{-2} .$$

Enfin, les premiers résultats quantitatifs concernant le minimum essentiel (minoration et non pas seulement non nullité) sont dus d’une part à E. BOMBIERI et U. ZANNIER (*confer* [Bo–Za]) et W. SCHMIDT (*confer* [Sch]) d’autre part qui ont obtenus des minoration pluri-exponentielles en le degré de V . Le lecteur pourra se reporter à [Am] et à [Da] pour plus de détails sur ces questions. Il convient de noter que toutes ces minoration ne *dépendent pas* d’un corps de définition de V , et ne sont fonctions que d’invariants *géométriques*.

Dans ce texte, nous nous intéresserons plus particulièrement à des quantités plus fines que le minimum essentiel. Pour ceci, commençons par introduire un ouvert naturel de V dans lequel ces quantités auront une chance de ne dépendre que d’invariants de nature géométrique.

Suivant E. BOMBIERI–U. ZANNIER et W. SCHMIDT, pour tout sous-tore H non trivial de \mathbb{G}_m^n , notons $V^a(H)$ la réunion des translatés de H contenus dans V . Notons également V^a la réunion des $V^a(H)$, pour H parcourant l’ensemble des sous-tores de \mathbb{G}_m^n de dimension ≥ 1 , et V° son complémentaire

$$V^\circ := V \setminus V^a .$$

L’ensemble V^a est un fermé de ZARISKI; de plus, il existe un ensemble fini $\{H_1, \dots, H_m\}$ de sous-tores de dimension ≥ 1 tels que

$$V^a = \bigcup_{i=1}^m V^a(H_i)$$

(voir [Sch], Theorem 1) et pour chaque sous-tore H l’ensemble $V^a(H)$ est un fermé de ZARISKI (voir [Sch], Theorem 2). Par contre, $V^a(H)$ n’est pas en général réunion d’un nombre fini de translatés de sous-tores de \mathbb{G}_m^n (*confer* le deuxième exemple ci-dessous).

Dans [Da–Ph], les auteurs ont introduit une série de « minima géométriques » notée $\hat{\mu}_j^\circ(V)$: nous rappelons ici ces définitions. Notons pour³ $j = 1, \dots, \dim(V)$

$$\hat{\mu}_j^\circ(V) = \sup_Y \inf \left\{ \hat{h}(\alpha), \alpha \in (V \setminus Y)(\overline{\mathbb{Q}}) \right\}$$

où le supremum est pris sur les fermés de ZARISKI Y de V de la forme $Y = Y_1 \cup Y_2$, où Y_1 est une réunion *finie* de sous-variétés de V de codimension j dans V et Y_2 est une réunion *finie*⁴ de translatés de sous-tores de \mathbb{G}_m^n contenus dans V et de codimension $< j$ dans V .

On notera que cette suite diffère de la suite usuelle des minimums successifs pour la hauteur (comme introduite par S. ZHANG dans [Zha2]) :

$$\hat{\mu}_j(V) = \sup_{\substack{Y \subset V, \\ \text{codim}_V(Y)=j}} \inf \left\{ \hat{h}(\alpha), \alpha \in (V \setminus Y)(\overline{\mathbb{Q}}) \right\}$$

³Par convention l’infimum sur l’ensemble vide vaut $+\infty$.

⁴En fait, la définition des $\hat{\mu}_j^\circ(V)$ de [Da–Ph] est légèrement ambiguë. On pourrait la comprendre soit en prenant naturellement Y_2 comme ici, soit en prenant pour Y_2 la réunion des $V^a(H)$ où la codimension de H est $< j$. Les résultats démontrés dans *loc. cit.* utilisent toutefois sur la même définition qu’ici et permettent de lever l’ambiguïté.

par le fait que l'on exclut aussi les translatés de sous-tore au lieu de se placer simplement en codimension j .

Par définition (on notera que la première égalité n'est valable que lorsque V n'est pas un translaté d'un sous-tore),

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(V) = \hat{\mu}_1^\circ(V) \geq \hat{\mu}_2^\circ(V) \geq \cdots \geq \hat{\mu}_{\dim(V)}^\circ(V) .$$

Notons que l'ouvert V° peut être vide : il suffit pour cela que le stabilisateur $\text{Stab}(V)$ de V soit de dimension ≥ 1 . Inversement, si $\text{Stab}(V)$ est discret, V° est non vide.

Ainsi, les $\hat{\mu}_j^\circ(V)$ ne sont en fait pas tout à fait les minimums successifs de la hauteur sur l'ouvert V° (et ce, même si $\text{Stab}(V)$ est discret : il suffit par exemple que l'un des fermés $V^a(H)$ que l'on retire soit de dimension $> \dim(H)$). Notons de plus que le minimum absolu de la hauteur sur V° peut être nul : il suffit que V° contienne (un nombre fini) de points de torsion. Toutefois, $\hat{\mu}_{\dim(V)}^\circ(V)$ n'est pas nul et peut même être minoré en fonction de n et du degré de V (cela résulte des travaux de E. BOMBIERI–U. ZANNIER et de W. SCHMIDT *confer* [Bo–Za], [Sch]).

Illustrons les notions précédentes à l'aide de quelques exemples :

Exemples : si $V = \{\alpha\} \times \mathbb{G}_m^{n-1}$, où $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}^*$, alors $\hat{\mu}^{\text{ess}}(V) = \hat{h}(\alpha)$. Par contre, $V^\circ = \emptyset$, et $\hat{\mu}_1^\circ(V) = \cdots = \hat{\mu}_{n-1}^\circ(V) = +\infty$.

Si maintenant \mathcal{C} est une courbe contenue dans \mathbb{G}_m^2 , de stabilisateur discret, et si $V = \mathcal{C} \times \mathbb{G}_m \subset \mathbb{G}_m^3$, alors, on a encore $\hat{\mu}^{\text{ess}}(V) = \hat{\mu}^{\text{ess}}(\mathcal{C})$ et $V^\circ = \emptyset$. Par contre,

$$\hat{\mu}_1^\circ(V) = \hat{\mu}^{\text{ess}}(V) = \hat{\mu}^{\text{ess}}(\mathcal{C}) ,$$

puisque V n'est pas un translaté d'un sous-tore mais $\hat{\mu}_2^\circ(V) = \hat{\mu}^{\text{ess}}(\mathcal{C})$ bien que V soit une réunion de translatés de sous-groupes de codimension 1.

Ces considérations montrent que non seulement les $\hat{\mu}_j^\circ(V)$ reflètent assez bien le comportement de la hauteur sur l'ouvert V° , mais ils prennent également en compte la variation de la hauteur sur V tout entier, notamment lorsque son stabilisateur n'est pas discret.

Nous nous proposons d'étudier le dernier de ces minima géométriques, $\hat{\mu}_{\dim(V)}^\circ(V)$ que nous noterons pour alléger $\hat{\mu}^\circ(V)$ dans la suite.

On peut aussi interpréter la quantité $\hat{\mu}^\circ(V)$ comme un infimum des minimums essentiels des sous-variétés de V ; plus précisément, nous verrons au lemme 2.2,

$$\hat{\mu}^\circ(V) = \inf_Z \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z)$$

où le infimum est pris sur les sous-variétés Z de V qui ne sont pas contenues dans un translaté B d'un sous-tore de \mathbb{G}_m^n tel que $B \subseteq V$.

Avant d'énoncer des conjectures précises sur le comportement de $\hat{\mu}^\circ(V)$, introduisons encore une notion : on appelle *indice d'interpolation* de V , noté $\tilde{\omega}(V)$, le plus petit entier δ pour lequel l'idéal de définition $\mathfrak{J}(V)$ est engendré en degré $\leq \delta$. Un indice *d'interpolation relatif* à une variété W intermédiaire est plus généralement introduit dans la définition 1.8 de [Am–Da1] : si $V \subsetneq W$, le plus petit entier δ tel qu'il existe des sous-variétés Y_1, \dots, Y_t de W

de codimension 1 dans W et degré $\leq \delta$ telles que $V = Y_1 \cap \dots \cap Y_t$ est l'indice d'interpolation relatif $\tilde{\omega}(V, W)$.

On peut alors conjecturer :

Conjecture 1.3 *Soit V une sous-variété de \mathbb{G}_m^n et B le plus petit translaté d'un sous-tore contenant V . Alors, l'ensemble des points \mathbf{x} de $V^\circ(\overline{\mathbb{Q}})$ de hauteur*

$$\hat{h}(\mathbf{x}) \leq \frac{c(n) \deg(B)}{\tilde{\omega}(V, B)}$$

est de cardinal fini, majoré par

$$\frac{c_2(n) \tilde{\omega}(V, B)^b}{\deg(B)^{b-1}},$$

où b est la codimension de B .

Remarques : en particulier, cette conjecture affirme que

$$\hat{\mu}^\circ(V) \geq \frac{c(n) \deg(B)}{\tilde{\omega}(V, B)}.$$

Il est intéressant de noter qu'en tout état de cause, $\tilde{\omega}(V)$ est majoré par $\deg(V)$. De plus, on voit facilement que $\tilde{\omega}(V, B) \leq \deg(B) \tilde{\omega}(V)$. Ainsi, la conjecture 1.3 entraîne en particulier :

$$\hat{\mu}^\circ(V) \geq \frac{c(n)}{\deg(V)}.$$

Enfin, il ne semble pas possible de conjecturer une minoration dépendant d'un invariant comme l'indice d'obstruction, comme le montre l'exemple ci-dessous. La conjecture 1.3 semble donc être essentiellement optimale quand au comportement de $\hat{\mu}^\circ(V)$ en fonction du degré de V .

Exemple : soit m un entier ≥ 1 ; considérons la sous-variété V de \mathbb{G}_m^4 définie par les équations :

$$F(x, y, z, t) := x^m + y^m - 1 = 0, \quad G(x, y, z, t) := x^2 + x^3 - z - t = 0.$$

On vérifie facilement que $V^\circ = V$, et que V n'est contenue dans aucun translaté de sous-tore strict de \mathbb{G}_m^n . Enfin, on voit aussi que $\omega(V) \leq 3$ (en fait $\omega(V) = 3$). Soit \mathcal{C} la courbe $\subset \mathbb{G}_m^2$ définie par $F = 0$ (vu comme polynôme de deux variables) et soit enfin (α_n, β_n) une suite de points de $\mathcal{C}(\overline{\mathbb{Q}})$ telle que $\hat{h}(\alpha_n, \beta_n)$ converge vers $\hat{\mu}^{\text{ess}}(\mathcal{C}) \sim \frac{1}{m}$. On pose

$$P_n := (\alpha_n, \beta_n, \alpha_n^2, \alpha_n^3).$$

Les points P_n sont donc tous dans V° , leur hauteur vérifie $\hat{h}(P_n) \leq 12\hat{h}(\alpha_n, \beta_n)$. Ainsi, on a exhibé une suite de points de V° de hauteur $\leq c/m$ ce qui montre bien que $\hat{\mu}^\circ(V) \leq c/m$. Pour m assez grand, ceci contredirait l'inégalité $\hat{\mu}^\circ(V) \geq c/\omega(V)$.

Toutefois, il n'est pas exclu que l'on puisse se contenter d'un *indice de quasi interpolation* défini comme suit.

Définition 1.4 Si $V \subsetneq W$, l'indice de quasi interpolation de V relativement à W est le plus petit entier δ pour lequel il existe des sous-variétés Y_1, \dots, Y_t de W , de degré $\leq \delta$ telles que V soit une composante isolée de $Y_1 \cap \dots \cap Y_t$. On le notera $\delta(V, W)$, et simplement $\delta(V)$ si $W = \mathbb{P}_n$.

Bien entendu, on dispose des inégalités :

$$\omega(V) \leq \delta(V) \leq \tilde{\omega}(V) \leq \deg(V) . \quad (1)$$

De plus, $\delta(V) = \tilde{\omega}(V)$ si V est une intersection complète.

Dans la direction de la conjecture 1.3, nous obtenons le théorème suivant :

Théorème 1.5 Soit V une sous-variété de \mathbb{G}_m^n . On a :

$$\hat{\mu}^\circ(V) > c'(n)^{-1} \delta(V)^{-1} \times \left(\log(3\delta(V)) \right)^{-\lambda(n-1)} ,$$

où $c'(n)$ est un nombre réel strictement positif, et $\lambda(k) = (9(3k)^{(k+1)})^k$ est la fonction de k introduite au théorème 1.1. Il existe donc un nombre fini de translatés de sous-tores B_1, \dots, B_m contenus dans V tels que

$$\hat{h}(\alpha) \geq c'(n)^{-1} \delta(V)^{-1} \times \left(\log(3\delta(V)) \right)^{-\lambda(n-1)} ,$$

pour tout

$$\alpha \in V \setminus \bigcup_{j=1}^m B_j .$$

Remarque : ce résultat semble indiquer qu'au moins pour les compactifications naturelles du groupe multiplicatif \mathbb{G}_m^n , on puisse conjecturer que le bon invariant pour ce problème est bien $\delta(V)$.

Le théorème 1.5 établi à une puissance du logarithme du degré près la minoration conjecturée pour le dernier des minimums géométriques, tout au moins lorsque le degré du groupe ambiant est négligé (comparer avec la conjecture 1.3 avec $B = \mathbb{G}_m^n$).

Si la minoration de $\hat{\mu}^\circ(V)$ dans le théorème 1.5 est assez satisfaisante (à l'exception peut-être des valeurs de $c(n)$ et $\lambda(n-1)$), on devrait pouvoir borner la quantité

$$D := \sum_{j=1}^m \deg B_j$$

en fonction du paramètre $\tilde{\omega}(V)$; il semble raisonnable de conjecturer que D est en fait majoré par (il s'agirait de renforcer la conjecture 1.3 pour inclure dans les exceptions les translatés par des sous-tores non triviaux) :

$$D \leq \frac{c''(n) \tilde{\omega}(V, B)^b}{\deg(B)^{b-1}} ,$$

où $c''(n)$ est un nombre réel > 0 , en reprenant les notations de la conjecture 1.3. De plus, par exemple lorsque $B = \mathbb{G}_m^n$, une borne du type

$$D \leq c''(n) \delta(V)^n \left(\log(3\delta(V)) \right)^{\kappa(n)} ,$$

est peut-être accessible à l'aide des techniques actuelles. En dehors de son intérêt propre, un tel résultat aurait notamment comme conséquence l'énoncé suivant. Soient $\Gamma \subset \mathbb{G}_m^n(\overline{\mathbb{Q}})$ un sous-groupe de rang $\leq r$, et a un nombre réel positif. Alors, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe au plus

$$c(n, \varepsilon) a^r \tilde{\omega}(V)^{r(n+1)+\varepsilon}$$

points de $(V^\circ \cap \Gamma)(\overline{\mathbb{Q}})$ de hauteur $\leq a$, une amélioration substantielle du théorème 1.4 de [Da-Ph]. Il est intéressant de noter qu'en fait (*confer* proposition 5.6 de *loc. cit.*) une borne polynômiale en le degré de V est connue pour D (essentiellement de l'ordre de $\deg(V)^{7\dim(V)}$).

En effet, une des applications d'énoncés comme le théorème 1.5 est une estimation pour le nombre de points de hauteur bornée de V° se trouvant dans un sous-groupe de rang fini. On pourra se reporter en particulier aux travaux de J.-H. EVERTSE et H.-P. SCHLIKWEI (*confer* [Ev-Sc]) et de G. RÉMOND (*confer* [Re]) pour plus de détails.

Rappelons que la meilleure minoration connue précédemment était due au second auteur et à P. PHILIPPON (*confer* [Da-Ph], théorème 1.3) et affirmait que si

$$q(V) := \left(2^{g+4d+22} \deg(V) (\log(\deg(V) + 1))^{2/3} \right)^{7\dim(V)},$$

alors, l'ensemble des points de $V^\circ(\overline{\mathbb{Q}})$ de hauteur

$$\hat{h}(\mathbf{x}) \leq \frac{1}{q(V)^{3/4}}$$

est fini, de cardinal au plus $q(V)$, soit une minoration de $\hat{\mu}^\circ(V)$ essentiellement du type $\deg(V)^{-7\dim(V)}$, à comparer à $\delta(V)^{-1-\varepsilon}$ dans le théorème 1.5. Les résultats antérieurs (*confer* E. BOMBIERI-U. ZANNIER et W. SCHMIDT) étaient quand à eux pluri-exponentiels en le degré de V .

La preuve du théorème 1.5 occupera le paragraphe 3. Ce dernier s'obtient à partir d'une variante quantitative du théorème 1.1 (le théorème 2.1), à l'aide d'une récurrence sur la dimension qui est assez proche de l'argument que l'on trouvera dans notre texte [Am-Da2] qui traitait pour sa part du « dernier minimum arithmétique ». Il est à noter que la récurrence est très différente de celle employée dans [Da-Ph] (arguments d'intersection, et théorèmes de BÉZOUT) qui est elle très coûteuse en terme de qualité des bornes. La preuve du théorème 2.1 occupe pour sa part le paragraphe 2. Comme cette dernière est très proche de celle du théorème 1.1, nous avons, pour garder à ce texte une longueur raisonnable et éviter trop de redites, fait appel très souvent aux arguments de [Am-Da1]. Il est donc conseillé au lecteur de garder cette référence à leur portée pour suivre les démonstrations. Que les lecteurs préférant un texte plus auto-explicite veuillent bien nous en excuser.

2 Résultats auxiliaires

Nous précisons dans ce paragraphe, le théorème 1.1 : dans [Am-Da1], nous avons *supposé* que V n'est contenue dans aucun translaté d'un sous-tore propre de \mathbb{G}_m^n , pour minorer son minimum essentiel en fonction de $\omega(V)$. Toutefois, comme c'est souvent le cas en géométrie

diophantienne on peut, dans le cas dégénéré, obtenir une information quantitative précise. Ici, cela reviendrait à proposer l'alternative suivante : ou bien le minimum essentiel de V est assez grand, ou bien V est contenue dans un translaté B d'un sous-tore strict de \mathbb{G}_m^n dont le degré est contrôlé précisément en fonction des données du problème (ici, $\omega(V)$, la dimension du groupe ambiant et la dimension de V). C'est très précisément ce qui se produit :

Théorème 2.1 *Pour tout entier $n \geq 1$, il existe un nombre réel strictement positif $c'(n)$, effectivement calculable, tel que la propriété suivante soit vraie. Soit V une sous-variété de \mathbb{G}_m^n de codimension k . Alors, ou bien il existe un translaté d'un sous-tore $B \subsetneq \mathbb{G}_m^n$ contenant V , tel que :*

$$(\deg(B))^{1/\text{codim}(B)} \leq c(n)\omega(V) \times \left(\log(3\omega(V))\right)^{\lambda(k)} ,$$

ou bien :

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(V) \geq c(n)^{-1}\omega(V)^{-1} \times \left(\log(3\omega(V))\right)^{-\lambda(k)} ;$$

comme dans le théorème 1.1, la nombre $\lambda(k)$ est explicitement connu et vaut :

$$\lambda(k) := \left(9(3k)^{(k+1)}\right)^k .$$

Démonstration : on suit la preuve du théorème 1.4 de [Am-Da1] dont nous conservons les notations; nous indiquons simplement les passages où il convient d'être plus précis.

Soit V une sous-variété propre et $\overline{\mathbb{Q}}$ -irréductible de \mathbb{G}_m^n de codimension k dont on suppose qu'elle a un petit minimum essentiel :

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(V) < \frac{c(n)}{\omega(V)} \times \left(\log(3\omega(V))\right)^{-\lambda(k)} .$$

Nous pouvons alors appliquer la proposition 5.5 de *op. cit.*⁵ : en particulier, on est assuré de l'existence de deux sous-variétés propres et $\overline{\mathbb{Q}}$ -irréductibles W_{i-1} et W_i de \mathbb{G}_m^n , de la même dimension, et de l'existence de certains entiers $l_1, \dots, l_i \in \mathbb{N}^*$ qui vérifient :

$$\dim(W_{i-1}) = \dim(W_i) , \quad [l_i]W_{i-1} \subseteq W_i , \quad [l_1 \dots l_{i-1}]V \subseteq W_i .$$

De plus, l_i est premier avec $[\text{Stab}(W_{i-1}) : \text{Stab}(W_{i-1})^0]$. Si W_i n'est pas un translaté d'un sous-tore propre de \mathbb{G}_m^n , alors la suite de la preuve du théorème 1.4 de [Am-Da1] conduit à une contradiction. On peut donc supposer que W_i est un translaté d'un sous-tore propre; il s'ensuit que

$$\tilde{B} := [l_1 \dots l_{i-1}]^{-1}W_i$$

est une réunion de translatés d'un sous-tore propre et contient V (car W_i contient $[l_1 \dots l_{i-1}]V$). Choisissons une composante, que nous noterons B , de \tilde{B} contenant V . Pour démontrer le théorème 2.1, il suffit de majorer le degré de B .

En appliquant les relations (ii) de la définition 5.3 et la scolie 5.4 de *op. cit.*, on en tire :

$$(\deg(W_i))^{1/\text{codim}(W_i)} \leq (P_{i+1} \dots P_k)^2 \omega([l_1 \dots l_i]V) \leq (P_1 \dots P_k)(P_{i+1} \dots P_k) \omega(V) ,$$

⁵L'hypothèse que V n'est contenue dans aucun translaté de sous-tore propre de \mathbb{G}_m^n , qui apparaît dans l'énoncé de cette proposition, n'est en fait pas utilisé dans sa preuve. Cette dernière n'apparaît qu'à une étape ultérieure de la démonstration, au paragraphe 5.3.

d'où (rappelons que W_i est un translaté d'un sous-tore propre de \mathbb{G}_m^n)

$$(\deg(B))^{1/\text{codim}(B)} = (\deg(W_i))^{1/\text{codim}(W_i)} \leq (P_1 \dots P_k)^2 \omega(V) .$$

Par ailleurs, $(P_1 \dots P_k)^2 = (C_0^2 \log(3\omega(V)))^u$, où (*confer* les choix des paramètres P_i et l'inégalité (5.2) dans *op. cit.*) :

$$u := 4(3k)^{k+1}(\rho_1 + \dots + \rho_k) \leq 8(3k)^{k+1}\rho_1 < (9(3k)^{(k+1)})^k = \lambda(k) .$$

On a donc :

$$(\deg(B))^{1/\text{codim}(B)} \leq \omega(V)(C_0^2 \log(3\omega(V)))^{\lambda(k)} .$$

Le théorème 2.1 est donc entièrement établi. \square

On se propose, au paragraphe 3 de déduire le théorème 1.5 du résultat précédent, au moyen d'une récurrence sur la dimension du groupe ambiant, analogue à celle utilisée dans la preuve du théorème 1.4 de [Am-Da2]. Pour ce faire, nous avons d'abord besoin d'exprimer $\hat{\mu}^\circ(V)$ en fonction du minimum essentiel de certaines sous-variétés de V :

Lemme 2.2 *Soit V une sous-variété de \mathbb{G}_m^n . On a alors :*

$$\hat{\mu}^\circ(V) = \inf_Z \{ \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \} ,$$

où l'infimum est pris sur les sous-variétés Z de V , qui ne sont pas contenues dans un translaté $B \subseteq V$ d'un sous-tore de \mathbb{G}_m^n .

Démonstration : nous commençons par montrer que $\inf_Z \{ \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \} \geq \hat{\mu}^\circ(V)$; soit donc θ un nombre réel strictement supérieur à $\inf_Z \{ \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \}$. Par définition, il existe donc une sous-variété Z de V , qui n'est pas contenue dans un translaté B d'un sous-tore de \mathbb{G}_m^n tel que $B \subseteq V$ et telle que $Z(\theta)$ est ZARISKI-dense dans Z . Supposons que $V(\theta)$ soit contenu dans une réunion finie Σ de translatés de sous-tores contenus dans V . On a alors : $Z(\theta) \subseteq \Sigma$ et donc $Z \subseteq \Sigma$ par densité. On en déduit que Z est contenu dans une composante irréductible de Σ , *i. e.* dans un translaté $B \subseteq V$ d'un sous-tore (car Z est irréductible); c'est une contradiction. En conclusion, $V(\theta)$ n'est pas contenu dans une réunion finie de translatés de sous-tores contenus dans V , d'où, par définition de $\hat{\mu}^\circ(V)$,

$$\theta \geq \hat{\mu}^\circ(V) .$$

Montrons maintenant que $\inf_Z \{ \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \} \leq \hat{\mu}^\circ(V)$. Pour cela, soit θ un réel, $\theta > \hat{\mu}^\circ(V)$; l'ensemble $V(\theta)$ n'est donc pas contenu dans une réunion finie de translatés de sous-tores contenus dans V . On en déduit l'existence d'une composante irréductible Z de la clôture de ZARISKI de $V(\theta)$ qui n'est pas contenue dans un translaté $B \subseteq V$ d'un sous-tore de \mathbb{G}_m^n . Remarquons que $V(\theta) \cap Z$ est ZARISKI-dense dans Z . Donc $\hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \leq \theta$. Ce qui donne :

$$\inf_Z \{ \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \} \leq \theta .$$

Le lemme 2.2 est donc établi. \square

3 Démonstration du théorème 1.5

Nous pouvons maintenant démontrer le théorème 1.5. Nous allons procéder par récurrence sur n . Dans le principe, nous suivons la démarche introduite pour la preuve du théorème 1.4 de [Am-Da2] : si une sous-variété Z de V a un trop petit minimum essentiel, alors, elle est contenue dans un translaté d'un sous-groupe, dont nous contrôlons le degré par le théorème 2.1. On peut alors utiliser une bonne paramétrisation de ce sous-groupe pour se ramener à une situation en dimension ambiante plus petite.

Grâce au lemme 2.2, il suffit de montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour toute sous-variété V de \mathbb{G}_m^n , et pour toute sous-variété Z de V qui n'est pas contenue dans un translaté $B \subseteq V$ d'un sous-tore, on a :

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) > c'(n)^{-1} \delta(V)^{-1} \times (\log(3\delta(V)))^{-\lambda(n-1)} ,$$

pour un certain nombre réel $c'(n) > 0$.

Si $n = 1$, le théorème est vrai (V est un point, donc un translaté d'un sous-tore contenu dans celui-ci). Supposons donc le théorème vrai pour un certain entier $n - 1 \geq 1$ et supposons par l'absurde qu'il soit faux pour n . Soit $C_0(n)$ un nombre réel assez grand (que l'on pourrait calculer effectivement à partir de la constante $c(n)$ du théorème 2.1). Il existe alors un entier $\delta \geq 1$, une sous-variété algébrique \mathbb{Q} -irréductible V de \mathbb{G}_m^n telle que $\delta(V) \leq \delta$ et une sous-variété $Z \subseteq V$, qui n'est pas contenue dans un translaté $B \subseteq V$ d'un sous-tore et telle que

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) < C_0(n)^{-1} \delta^{-1} \times (\log(3\delta))^{-\lambda(n-1)} .$$

Remarquons que $\omega(Z) \leq \delta$ (puisque $Z \subseteq V$, par définition $\omega(Z) \leq \omega(V) \leq \delta(V)$) : le théorème 2.1 nous assure donc que Z est contenue dans un certain translaté $\alpha \cdot H$ d'un sous-tore $H \subsetneq \mathbb{G}_m^n$, et que le degré de H vérifie l'inégalité :

$$(\deg(H))^{1/\text{codim}(H)} \leq c(n)\delta \times (\log(3\delta))^{\lambda(k)} . \quad (2)$$

De plus, il n'y a pas de restriction à supposer que $\alpha \in Z$ et est tel que $\hat{h}(\alpha) \leq 2\hat{\mu}^{\text{ess}}(Z)$; on a alors :

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(\alpha^{-1} \cdot Z) \leq \hat{h}(\alpha^{-1}) + \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \leq n\hat{h}(\alpha) + \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \leq 3n\hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) . \quad (3)$$

Soit Λ le sous-module de \mathbb{Z}^n des relations de H :

$$\Lambda := \left\{ \lambda \in \mathbb{Z}^n, \text{ tel que } \forall \mathbf{x} \in H, \mathbf{x}^\lambda = 1 \right\} .$$

On sait que le volume de Λ (par rapport à la métrique euclidienne usuelle) est égal au degré de H ; le théorème de MINKOWSKI nous fournit alors un élément non nul $\lambda \in \Lambda$ tel que :

$$D := \max_{1 \leq i \leq n} \{ |\lambda_i| \} \leq (\deg H)^{1/\text{codim}(H)} . \quad (4)$$

On peut supposer que $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont globalement premiers entre eux (car H est connexe); quitte à renuméroter les variables et à changer les signes, on peut également supposer $\lambda_n = D$. Le sous-tore H' d'équation

$$\mathbf{x}^\lambda = 1$$

contient donc H , il est de degré au plus nD et on dispose de la paramétrisation $\varphi : \mathbb{G}_m^{n-1} \rightarrow H'$ définie par :

$$\varphi(\mathbf{x}) := \left(x_1^{\lambda_n}, \dots, x_{n-1}^{\lambda_n}, x_1^{-\lambda_1} \dots x_{n-1}^{-\lambda_{n-1}} \right) .$$

Soit Z' une composante irréductible de $\varphi^{-1}(\boldsymbol{\alpha}^{-1} \cdot Z)$ et notons V' une composante irréductible de $\varphi^{-1}(\boldsymbol{\alpha}^{-1} \cdot V)$ contenant Z' . On a alors :

- (a) la sous-variété V' de \mathbb{G}_m^{n-1} est une composante irréductible du lieu des zéros de polynômes dont le degré satisfait l'inégalité :

$$\leq \max\{\lambda_n, |\lambda_1 + \dots + \lambda_{n-1}|\} \delta \leq nD\delta ;$$

en particulier, $\delta(V') \leq nD\delta$;

- (b) par construction, $Z' \subseteq V'$ et Z' n'est contenue dans aucun translaté d'un sous-tore inclus dans V' . En effet, si $Z' \subseteq B'$ pour un certain translaté d'un sous-tore $B' \subseteq V'$, alors on aurait⁶ $Z = \boldsymbol{\alpha} \cdot \varphi(Z') \subseteq B$ avec $B := \boldsymbol{\alpha} \cdot \varphi(B') \subseteq V$ translaté d'un sous-tore, ce qui contredit le choix de Z .

- (c) les minima essentiels de Z et Z' sont liés par l'inégalité (*confer* la relation (3)) :

$$3n\hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \geq \hat{\mu}^{\text{ess}}(\boldsymbol{\alpha}^{-1} \cdot Z) = \hat{\mu}^{\text{ess}}(\varphi(Z')) \geq \lambda_n \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z') = D\hat{\mu}^{\text{ess}}(Z') .$$

Par hypothèse de récurrence, il existe une constante $c'(n-1) > 0$ telle que

$$3nD^{-1}\hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \geq \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z') > c'(n-1)^{-1}(nD\delta)^{-1} \left(\log > (3nD\delta) \right)^{-\lambda(n-2)} ,$$

d'où, compte tenu de la majoration (4),

$$\hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) \geq c'(n-1)^{-1}(3n)^{-1}\delta^{-1} \left(\log(3n \deg(H)\delta) \right)^{-\lambda(n-2)} .$$

L'inégalité (2) majorant le degré de H , on voit pour finir quel'on peut choisir la constante $C_0(n)$ assez grande de telle sorte que :

$$3n^2 c'(n-1) \left(\log(3n \deg(B)\delta) \right)^{\lambda(n-2)} \leq C_0(n) \left(\log(3\delta) \right)^{-\lambda(n-2)} .$$

Pour un tel choix de $C_0(n)$ on a nécessairement :

$$\begin{aligned} \hat{\mu}^{\text{ess}}(Z) &\geq C_0(n)^{-1}\delta^{-1}(\log 3\delta)^{-\lambda(n-2)} \\ &\geq C_0(n)^{-1}\delta^{-1}(\log 3\delta)^{-\lambda(n-1)} . \end{aligned}$$

Contradiction. D'où le théorème 1.5. \square

⁶Rappelons que comme $Z \subseteq \boldsymbol{\alpha} \cdot H$, on a nécessairement $\boldsymbol{\alpha} \cdot \varphi(Z') = Z$.

Références

- [Am] F. AMOROSO. « *Small points on subvarieties of algebraic tori : results and methods* ». Rivista di matematica dell' Università di Parma, à paraître.
- [Am-Da1] F. AMOROSO et S. DAVID. « *Minoration de la hauteur normalisée dans un tore* ». Journal de l'Institut de Mathématiques de Jussieu, t. **2** n°3, pages 335–381, 2003.
- [Am-Da2] F. AMOROSO et S. DAVID. « *Distribution des points de petite hauteur dans les groupes multiplicatifs* ». Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, série **V**, t. **III** n°2, pages 325–348, 2003.
- [Bo-Za] E. BOMBIERI et U. ZANNIER. « *Algebraic points on subvarieties of \mathbb{G}_m^n* ». Internat. Math. Res. notices, t. **7**, pages 333–347, 1995.
- [Cha] M. CHARDIN. « *Une majoration de la fonction de Hilbert et ses conséquences pour l'interpolation algébrique* ». Bulletin de la Société Mathématique de FRANCE, t. **117**, pages 305–318, 1988. Voir aussi « *Contributions à l'algèbre commutative effective et à la théorie de l'élimination* », Thèse de doctorat, Université de Paris VI, 1990.
- [Da] S. DAVID. « *On the height of subvarieties of groups varieties* ». The Ramanujan math. Journal, à paraître.
- [Da-Ph] S. DAVID et P. PHILIPPON. « *Minorations des hauteurs normalisées des sous-variétés des tores* ». Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, série **IV**, t. **XXVIII** n°3, pages 489–543, 1999 ; « *Errata* », *ibidem*, t. **XXIX** n°3, 2000.
- [Ev-Sc] J.-H. EVERTSE et H.-P. SCHLICKKEWEI. « *A quantitative version of the Absolute Subspace Theorem* ». J. Reine Angew. Math., t. **548**, pages 21–127, 2002.
- [Re] G. RÉMOND. « *Sur les sous-variétés des tores* ». Compositio Math., t. **134** n°3, pages 337–366, 2002.
- [Sch] W. SCHMIDT. « *Heights of points on subvarieties of \mathbb{G}_m^n* ». In Number theory, Séminaire de Théorie des Nombres de PARIS 1993–1994, S. DAVID éditeur, London Math. Soc. Ser. **235**, Cambridge University Press, pages 157–187, 1996.
- [Zha1] S. ZHANG. « *Positive line bundles on arithmetic surfaces* ». Ann. of Math., t. **136**, pages 569–587, 1992.
- [Zha2] S. ZHANG. « *Positive line bundles on arithmetic varieties* ». Journal of the American Mathematical society, t. **8** n°1, pages 187–221, 1995.

Math. subject classification : 11 G 10, 11 J 81, 14 G 40.

Francesco AMOROSO,
U. M. R. 6139 (C. N. R. S.),
Nicolas Oresme
Département de Mathématiques,
Université de CAEN,
CAMPUS II, BP 5186.
F-14032 CAEN CÉDEX
adresse électronique :
amoroso@math.unicaen.fr

Sinnou DAVID
U. M. R. 7586 (C. N. R. S.)–U. F. R. 921,
Théorie des nombres
Institut de mathématiques de JUSSIEU,
Université Pierre et Marie CURIE,
4, Place JUSSIEU,
75005 PARIS,
adresse électronique :
david@math.jussieu.fr