



HAL
open science

Une note à propos du Jacobien de n fonctions holomorphes à l'origine de C^n

Michel Hickel

► **To cite this version:**

Michel Hickel. Une note à propos du Jacobien de n fonctions holomorphes à l'origine de C^n . Annales Polonici Mathematici, 2008, 94 (3), pp.245-264. hal-00238383

HAL Id: hal-00238383

<https://hal.science/hal-00238383>

Submitted on 4 Feb 2008

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Une note à propos du Jacobien de n fonctions holomorphes à l'origine de \mathbb{C}^n

M. Hickel

Abstract

Let f_1, \dots, f_n be n germs of holomorphic functions at the origin of \mathbb{C}^n , such that $f_i(0) = 0$, $1 \leq i \leq n$. We give a proof based on the J. Lipman's theory of Residues via Hochschild Homology [L] that the jacobian of f_1, \dots, f_n belongs to the ideal generated by f_1, \dots, f_n if and only if the dimension of the germ of common zeros of f_1, \dots, f_n is strictly positive. In fact, we prove much more general results which are relatives versions of this result replacing the field \mathbb{C} by convenient noetherian rings \mathbf{A} (c.f Th. 3.1 and Th. 3.3). We then show a Lojasiewicz inequality for the Jacobian analogous to the classical one by S. Lojasiewicz for the gradient.¹

1 Introduction

Soit $\mathcal{O}_n = \mathbb{C}\{z_1, \dots, z_n\}$ l'anneau des germes de fonctions holomorphes à l'origine de \mathbb{C}^n . Il est classique que si f_1, \dots, f_n sont n éléments de \mathcal{O}_n , ayant un zéro isolé à l'origine de \mathbb{C}^n , alors leur jacobien $J(f_1, \dots, f_n) = \det(\partial f_i / \partial z_j)$ n'appartient pas à l'idéal I de \mathcal{O}_n engendré par f_1, \dots, f_n . Motivé par un résultat de S. Spodzieza [S] prouvant un énoncé de E. Netto ([N] p.142) dans le cas de polynômes homogènes, on peut se demander, comme le faisait A. Ploski [P], si la réciproque de cette assertion est vraie. Dans [H1] nous répondions par l'affirmative à cette question. Ce faisant, nous ne faisons que redécouvrir dans ce contexte un résultat du à W.V. Vasconcellos [W1] dans le cas polynomial. Nous présentons ici dans un premier temps une preuve très simple de ce résultat comme une conséquence de la théorie des résidus de J. Lipman [L], et qui vise à montrer l'efficacité de celle-ci (Comparer avec les commentaires de nature historique de [W2] p.268 «Scheja-Storch Formula » et [W3] p. 129 «Tate Formula »). En fait la théorie des résidus de J. Lipman via l'homologie de Hochschild nous permet de démontrer des versions relatives de ces résultats (c.f. Th. 3.1 et 3.3) et de remplacer le corps \mathbb{C} par des anneaux noethériens \mathbf{A} convenables. Si (f_1, \dots, f_n) ont un zéro isolé à l'origine, nous montrons dans un second temps que, désignant par m le rang en

¹1991 *Mathematics Subject Classification*; Primary 13A10; Secondary 13C10, 13J07. *Key words and phrases* : Jacobian, Residues, Socle of an artinian algebra, Lojasiewicz inequalities.

0 de la matrice Jacobienne $\frac{\partial f_i}{\partial z_j}(0)$ on a : si $n - m \geq 3$ $J(f_1, \dots, f_n) \in \overline{I}^\theta$, où θ est un nombre rationnel strictement plus grand que 1 et que si $n - m = 2$ on a : $J(f_1, \dots, f_n) \in \overline{I}$ où \overline{I}^q désigne la clôture intégrale des idéaux (c.f. plus bas et [H-S], [L-T] pour des rappels concernant ces notions). On améliore ainsi un résultat de B. Teissier [T1] et on prouve une inégalité de Lojasiewicz pour le Jacobien, analogue à celle du Gradient [Lo], [B-M],[T2]. Tout d'abord l'anneau \mathcal{O}_n étant local noethérien, son complété $\hat{\mathcal{O}}_n = \mathbb{C}[[X_1, \dots, X_n]]$ est fidèlement plat sur \mathcal{O}_n et donc pour tout idéal $I \subset \mathcal{O}_n$, on a : $I \cdot \hat{\mathcal{O}}_n \cap \mathcal{O}_n = I$. Le passage au complété ne changeant pas les dimensions, il suffira de travailler dans $\mathbb{C}[[X_1, \dots, X_n]]$. On a alors :

Théorème 1.1

Soient k un corps de caractéristique zéro et $k[[X_1, \dots, X_n]]$ l'anneau des séries formelles en n variables à coefficients dans k . Pour $f_1, \dots, f_n \in k[[X_1, \dots, X_n]]$ définissant un idéal propre, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1) $\text{Dim } k[[X]]/(f_1, \dots, f_n) > 0$ (où Dim désigne la dimension de Krull de l'anneau considéré).
- 2) Le jacobien $J_X(f_1, \dots, f_n)$ est dans l'idéal $(f_1, \dots, f_n)k[[X]]$.

De plus si $\text{dim}_k \frac{k[[X_1, \dots, X_n]]}{(f_1, \dots, f_n)} < +\infty$ (comme k -espace vectoriel) i.e. $\text{Dim} \frac{k[[X_1, \dots, X_n]]}{(f_1, \dots, f_n)} = 0$, on a :

$$J_X(f_1, \dots, f_n) \cdot (X_1, \dots, X_n) \subset (f_1, \dots, f_n).$$

Autrement dit la classe de $J_X(f_1, \dots, f_n)$ dans $\frac{k[[X_1, \dots, X_n]]}{(f_1, \dots, f_n)}$ est un générateur du socle de cette algèbre Artinienne.

La dernière assertion est aussi valide lorsque k est de caractéristique positive p , et p ne divise pas $\text{dim}_k \frac{k[[X_1, \dots, X_n]]}{(f_1, \dots, f_n)}$. Cette assertion est due à S. Scheja, U. Storch [S-S]. L'implication 1) \implies 2) est due à W.V. Vasconcelos dans le cas des algèbres de polynômes [W1]. Nous présentons une preuve d'une version relative de toutes ces assertions via la théorie des résidus de J. Lipman [L] (c.f Th.3.1, Th.3.3 et Cor. 3.5) remplaçant le corps k par des anneaux noethériens convenables. Nous rappelons à la section 2 quelques éléments concernant cette théorie et prouvons les résultats à la section 3).

Nous prouvons ensuite le résultat suivant :

Théorème 1.2

Soient k un corps de caractéristique 0 et $f_1, \dots, f_n \in k[[X_1, \dots, X_n]]$ tels que $f_i(0) = 0$ et l'idéal $I = (f_1, \dots, f_n)$ est $\mathfrak{m} = (X_1, \dots, X_n)$ primaire (Ainsi $J_X(f) \notin I$). Désignons par m le rang en 0 de la matrice Jacobienne $\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(0)$:

- 1) Si $n - m = 2$, on a $J_X(f_1, \dots, f_n) \in \overline{I}$.
- 2) Si $n - m \geq 3$, il existe un nombre rationnel $\theta = p/q > 1$ tel que $J_X(f_1, \dots, f_n) \in \overline{I}^\theta$ où encore $J_X(f_1, \dots, f_n)^q \in \overline{I}^p$.
- 3) Si k est muni d'une valeur absolue non triviale $|\cdot| : k \longrightarrow [0, +\infty[$ et si les f_i sont des germes de séries convergentes alors :

- Dans le cas 1), $\exists r > 0, \exists C > 0 / \|x\| \leq r \implies |J_X(f_1, \dots, f_n)(x)| \leq C(\sum_{i=1}^n |f_i(x)|)$.
- Dans le cas 2), $\exists r > 0, \exists C > 0 / \|x\| \leq r \implies |J_X(f_1, \dots, f_n)(x)| \leq C(\sum_{i=1}^n |f_i(x)|)^\theta$, où θ est un rationnel strictement plus grand que 1.

Bien entendu, il n'y a pas de résultats similaires lorsque $n - m = 1$, car on est alors ramené au cas où $n = 1$. La conclusion de 2) n'est pas valide en général dans le cas $n - m = 2$ comme nous le verrons par des exemples. Nous rappelons quelques éléments concernant la clôture intégrale des idéaux à la section 4) et y prouvons le résultat ci-dessus.

2 Quelques rappels sur la théorie des résidus de J. Lipman [L]

On rappelle ici quelques définitions et résultats de [L] § 3, pour d'autres précisions et applications nous renvoyons le lecteur à [L], [BO], [B-H1], [B-H2]. On considère \mathbf{R} une \mathbf{A} -algèbre commutative et unitaire de morphisme structural $h : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{R}$. On considère $f = (f_1, \dots, f_n)$ une suite quasi-régulière de \mathbf{R} , I l'idéal qu'elle engendre, et $\hat{\mathbf{R}}$ le complété I -adique de \mathbf{R} . Rappelons que f est dite quasi-régulière si $f \cdot \mathbf{R} = I \cdot \mathbf{R} \neq \mathbf{R}$ et si le \mathbf{R}/I homomorphisme de $(\mathbf{R}/I)[X_1, \dots, X_n] \rightarrow gr_I(\mathbf{R}) = \bigoplus_{m \geq 0} \frac{I^m}{I^{m+1}}$ qui à un polynôme homogène $P_m(X_1, \dots, X_n)$ de degré m fait correspondre la classe de $P_m(f_1, \dots, f_n)$ dans $\frac{I^m}{I^{m+1}}$ est un isomorphisme. On suppose que $\mathbf{P} = \mathbf{R}/I$ est un \mathbf{A} -module projectif de type fini et l'on note $\sigma : \mathbf{R}/I \rightarrow \mathbf{R}$ une section \mathbf{A} linéaire de la projection canonique de $\mathbf{R} \rightarrow \frac{\mathbf{R}}{I}$. Tout élément r de \mathbf{R} admet dans $\hat{\mathbf{R}}$ une écriture unique de la forme :

$$r = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} \sigma(r_\alpha) \cdot f^\alpha, \text{ avec } r_\alpha \in \mathbf{P}$$

Par conséquent, il existe des uniques $\gamma_\alpha \in Hom_{\mathbf{A}}(\mathbf{P}, \mathbf{P})$ tels que :

$$\forall p \in \mathbf{P}, r \cdot \sigma(p) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} \sigma(\gamma_\alpha(p)) \cdot f^\alpha$$

On définit l'élément $r^\sharp \in Hom_{\mathbf{A}}(\mathbf{P}, \mathbf{P})[[f]]$ par :

$$r^\sharp = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} \gamma_\alpha f^\alpha$$

Soit ϵ_i le n -uplet dont toutes les composantes sont nulles sauf la $i^{\text{ème}}$ qui vaut 1. On considère l'élément suivant de $Hom_{\mathbf{A}}(\mathbf{P}, \mathbf{P})[[f]]$:

$$\frac{\partial}{\partial f_i}(r^\sharp) = \sum_{\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n} \alpha_i \gamma_\alpha \cdot f^{\alpha - \epsilon_i}$$

\mathbf{P} étant une \mathbf{A} -algèbre projective de type fini, on dispose d'un opérateur trace canonique $Tr_{\mathbf{P}/\mathbf{A}} \in \text{hom}_{\mathbf{A}}(\text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{P}), \mathbf{A})$ qui à tout élément de $\text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{P})$ fait correspondre sa trace (c.f. [B1] chap. II §4 p. 78-79). On a alors :

Théorème 2.1 ([L] §3 corollaire (3.7))

Soient $f = (f_1, \dots, f_n)$ une suite quasi-régulière de \mathbf{R} telle que le $\mathbf{P} = \mathbf{R}/I$ module soit un \mathbf{A} -module projectif de type fini, $\omega = r dr_1 \wedge \dots \wedge dr_n \in \wedge^q \Omega_{\mathbf{R}/\mathbf{A}}$, où $\Omega_{\mathbf{R}/\mathbf{A}}$ est le \mathbf{R} -module des différentielles de la \mathbf{A} -algèbre \mathbf{R} . Pour tout multi-indice $(m_1, \dots, m_n) \in (\mathbb{N}^*)^n$, posant :

$$r^{\#} \det \left(\frac{\partial}{\partial f_i} (r_j^{\#}) \right) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} \delta_{\alpha} \cdot f^{\alpha} \in \text{hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{P}, \mathbf{P})[[f]]$$

On a :

$$\text{Res}_{\mathbf{R}/\mathbf{A}} \left[\begin{array}{c} r dr_1 \wedge \dots \wedge dr_n \\ f_1^{m_1}, \dots, f_n^{m_n} \end{array} \right] = Tr_{\mathbf{P}/\mathbf{A}}(\delta_{m_1-1, \dots, m_n-1})$$

Ce théorème peut servir de définition, dans le cas considéré, pour le symbole résidu $\text{Res}_{\mathbf{R}/\mathbf{A}}$ de J. Lipman.

Corollaire 2.2 ([L] corollaire 3.8 p.51)

Soient $\mathbf{A}, \mathbf{R}, f = (f_1, \dots, f_n), I$ et $\mathbf{P} = \mathbf{R}/I$ comme ci-dessus alors pour tout $r \in \mathbf{R}$:

$$\text{Res}_{\mathbf{R}/\mathbf{A}} \left[\begin{array}{c} r df_1 \wedge \dots \wedge df_n \\ f_1, \dots, f_n \end{array} \right] = Tr_{\mathbf{P}/\mathbf{A}}(p_r)$$

où p_r est l'opérateur de multiplication par r dans $\mathbf{P} \longrightarrow \mathbf{P}, p \longrightarrow \bar{r} \cdot p$

\mathbf{A} étant un anneau commutatif unitaire noethérien, considérons la situation particulière où $\mathbf{R} = \mathbf{A}[X_1, \dots, X_n]$ ou bien $\mathbf{A}[[X_1, \dots, X_n]]$ ou encore le localisé en un idéal premier d'un tel anneau. Désignons toujours par f une suite quasi-régulière telle que le $\mathbf{P} = \mathbf{R}/I$ soit un \mathbf{A} -module projectif de type fini. On a alors :

Corollaire 2.3 (c.f. [BO] Chap.1 prop. 2.2.2 p. 21, prop. 2.3.1 p.29, prop. 4.1.2 p. 48)

$\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{P}, \mathbf{A})$ est un \mathbf{P} -module libre de rang 1 dont un générateur est l'homomorphisme résidu :

$$r \longrightarrow \text{Res}_{\mathbf{R}/\mathbf{A}} \left[\begin{array}{c} r dX_1 \wedge \dots \wedge dX_n \\ f_1, \dots, f_n \end{array} \right].$$

En particulier, on a la propriété de non dégénérescence suivante :

$$r \in I = (f_1, \dots, f_n) \iff \forall h \in \mathbf{R}, \text{Res}_{\mathbf{R}/\mathbf{A}} \left[\begin{array}{c} r h dX_1 \wedge \dots \wedge dX_n \\ f_1, \dots, f_n \end{array} \right] = 0$$

3 Versions relatives de 1.1

Nous pouvons à présent énoncer le résultat suivant qui est une version relative de 2) \implies 1) et de la dernière assertion de 1.1.

Théorème 3.1

Soit \mathbf{A} un anneau commutatif noethérien intègre de caractéristique $p \geq 0$. Désignons par \mathbf{R} l'anneau $\mathbf{A}[X_1, \dots, X_n]$ ou $\mathbf{A}[[X_1, \dots, X_n]]$ ou bien le localisé en un idéal premier d'un de ces deux anneaux. Soit $f = (f_1, \dots, f_n) \in \mathbf{R}$ une suite d'éléments de \mathbf{R} telle que $I = (f_1, \dots, f_n) \cdot \mathbf{R} \neq \mathbf{R}$. On suppose que :

- a) f est quasi-régulière
 - b) $\mathbf{P} = \mathbf{R}/I$ est un \mathbf{A} module projectif de type fini dont on note r le rang.
- Alors notant par $J_X(f_1, \dots, f_n) = \det\left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}\right)$ le Jacobien de (f_1, \dots, f_n) on a :

1) $J_X(f_1, \dots, f_n) \cdot \sqrt{I} \subset I$

2) Si r est premier à p (en particulier si $p = 0$) alors $J_X(f_1, \dots, f_n) \notin I$.

Les conclusions ci-dessus 1) et 2) sont aussi satisfaites sous les hypothèses alternatives suivantes. \mathbf{A} est un anneau local noethérien d'égale caractéristique p , de dimension 0 (non nécessairement intègre), et a) est satisfaite et b) est remplacée par :

- b') $\mathbf{P} = \mathbf{R}/I$ est un \mathbf{A} module libre de type fini et la longueur du \mathbf{A} -module \mathbf{P} (qui est nécessairement finie) est première à p .

Avant de prouver le théorème notons que dans le cas particulier où A est un corps k infini les hypothèses a) et b) se réduisent à $\dim_k k[X_1, \dots, X_n]/I < +\infty$ ou $\dim_k k[[X_1, \dots, X_n]]/I < +\infty$. En effet cette seule condition garantit la quasi-régularité de la suite $f = (f_1, \dots, f_n)$ (c.f. [Bo] appendice prop. 3.1 et cor. 1.9). Ceci équivaut au fait que $\dim_k k[X_1, \dots, X_n]/I = 0$ ou $\dim_k k[[X_1, \dots, X_n]]/I = 0$ et l'on retrouve les résultats de 1.1 annoncés.

Preuve :

Soit $\sigma \in \text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{P})$, $\sigma : \mathbf{P} \longrightarrow \mathbf{P}$. Puisque \mathbf{P} est un \mathbf{A} -module projectif de type fini, on peut trouver un entier n et un morphisme surjectif $u : \mathbf{A}^n \longrightarrow \mathbf{P} \longrightarrow 0$. Puisque \mathbf{P} est projectif, on peut trouver un morphisme $v : \mathbf{P} \longrightarrow \mathbf{A}^n$ tel que v soit une section de u , c'est à dire :

$$u \circ v = \text{id}_{\mathbf{P}}.$$

Considérons l'endomorphisme de \mathbf{A}^n , $l_\sigma \in \text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}^n)$ défini par :

$$l_\sigma = v \circ \sigma \circ u.$$

On a alors le lemme suivant :

Lemme 3.2

Soient $\sigma \in \text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{P})$ et $l_\sigma \in \text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}^n)$ comme ci-dessus.

- 1) Si σ est nilpotent, l_σ est nilpotent.

- 2) $Tr_{\mathbf{P}/\mathbf{A}}(\sigma) = Tr_{\mathbf{A}^n/\mathbf{A}}(l_\sigma)$
 3) Si σ est nilpotent, $Tr_{\mathbf{P}/\mathbf{A}}(\sigma) = 0$.

Preuve :

- 1) Supposons $\sigma^m = 0$ pour un entier m . Alors $l_\sigma^m = (v \circ \sigma \circ u) \circ \dots \circ (v \circ \sigma \circ u)$. Comme $u \circ v = id_{\mathbf{P}}$, on a $l_\sigma^m = v \circ \sigma^m \circ u$. D'où $l_\sigma^m = 0$, puisque $\sigma^m = 0$.
 2) Notons $\mathbf{P}^* = Hom_{\mathbf{A}}(\mathbf{P}, \mathbf{A})$. D'après [B1] et l'isomorphisme canonique :

$$\mathbf{P}^* \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{P} \longrightarrow End_{\mathbf{A}}(\mathbf{P})$$

on peut trouver des $x_i^* \in \mathbf{P}^*$, des $y_i \in \mathbf{P}$ tels que pour tout $x \in \mathbf{P}$:

$$\sigma(x) = \sum_{i=1}^m \langle x, x_i^* \rangle . y_i$$

On a ainsi $Tr_{\mathbf{P}/\mathbf{A}}(\sigma) = \sum_{i=1}^m \langle y_i, x_i^* \rangle$ ([B1] Chap II § 4 78-79). Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base canonique de \mathbf{A}^n . Posons :

$$a_i = u(e_i), \sigma(a_i) = \sum_{j=1}^m \langle a_i, x_j^* \rangle . y_j \text{ et } v(y_j) = \sum_{k=1}^n v_{j,k} . e_k$$

Ainsi :

$$l_\sigma(e_i) = v(\sigma(a_i)) = \sum_{j=1}^m \langle a_i, x_j^* \rangle . v(y_j) \quad (1)$$

$$= \sum_{j=1}^m \langle a_i, x_j^* \rangle \left(\sum_{k=1}^n v_{j,k} . e_k \right) \quad (2)$$

$$= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \langle a_i, x_j^* \rangle v_{j,k} \right) . e_k \quad (3)$$

Ainsi :

$$Tr_{\mathbf{A}^n/\mathbf{A}}(l_\sigma) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \langle a_i, x_j^* \rangle . v_{j,i} \right) \quad (4)$$

$$= \sum_{j=1}^m \left\langle \sum_{i=1}^n v_{j,i} a_i, x_j^* \right\rangle \quad (5)$$

$$= \sum_{j=1}^m \left\langle \sum_{i=1}^n v_{j,i} u(e_i), x_j^* \right\rangle \quad (6)$$

$$= \sum_{j=1}^m \left\langle u \left(\sum_{i=1}^n v_{j,i} . e_i \right), x_j^* \right\rangle \quad (7)$$

$$= \sum_{j=1}^m \langle u \circ v(y_j), x_j^* \rangle = \sum_{j=1}^m \langle y_j, x_j^* \rangle = Tr_{\mathbf{P}/\mathbf{A}}(\sigma) \quad (8)$$

3) Soient $K = \text{frac}(A)$ et $l'_\sigma : K^n \longrightarrow K^n$ obtenu à partir de l_σ par extension des scalaires. Notons \overline{K} une clôture algébrique de K et \overline{l}_σ l'extension à \overline{K}^n de l'_σ . Comme σ est nilpotent par 1), l_σ est nilpotent et par conséquent l'_σ et \overline{l}_σ sont nilpotents. Maintenant $\overline{l}_\sigma : \overline{K}^n \longrightarrow \overline{K}^n$ étant une application linéaire nilpotente toutes ses valeurs propres sont nulles et l'existence de la réduction des matrices carrées à coefficients dans \overline{K} nous assure que $\text{Tr}_{\overline{K}^n/\overline{K}}(\overline{l}_\sigma) = 0$. Mais d'après 2) $\text{Tr}_{\mathbf{P}/\mathbf{A}}(\sigma) = \text{Tr}_{\mathbf{A}^n/\mathbf{A}}(l_\sigma) = \text{Tr}_{\overline{K}^n/\overline{K}}(\overline{l}_\sigma) = 0$. \square

Nous pouvons à présent prouver 3.1. Concernant la première affirmation, soit $r \in \sqrt{I}$. Il s'agit de voir que $J_X(f).r \in I$. Pour cela, il est équivalent par 2.3 de prouver que pour tout $h \in \mathbf{R}$, on a :

$$\text{Res}_{\mathbf{R}/\mathbf{A}} \left[\begin{array}{c} rJ_X(f)hdX_1 \wedge \dots \wedge dX_n \\ f_1, \dots, f_n \end{array} \right] = 0$$

Or

$$\text{Res}_{\mathbf{R}/\mathbf{A}} \left[\begin{array}{c} rJ_X(f)hdX_1 \wedge \dots \wedge dX_n \\ f_1, \dots, f_n \end{array} \right] = \text{Res}_{\mathbf{R}/\mathbf{A}} \left[\begin{array}{c} rhdf_1 \wedge \dots \wedge df_n \\ f_1, \dots, f_n \end{array} \right]$$

Donc en vertu de 2.2 ce dernier résidu n'est autre que la trace de l'opérateur p_{hr} de multiplication par hr dans \mathbf{P} . Comme $r \in \sqrt{I}$, $rh \in \sqrt{I}$ et donc p_{rh} est un opérateur nilpotent. Le lemme 3.2 nous assure que sa trace est nulle et nous permet donc de conclure à la première affirmation de 3.1.

Concernant la seconde assertion de 3.1. Supposons que $J_X(f_1, \dots, f_n) \in I$. Alors pour tout idéal maximal \mathfrak{m} de \mathbf{A} , désignant toujours par $J_X(f)$ la classe de $J_X(f)$ dans le localisé $\mathbf{R}_\mathfrak{m}$ de \mathbf{R} en \mathfrak{m} , on aurait $J_X(f) \in I_\mathfrak{m}$. On aurait ainsi :

$$\text{Res}_{\mathbf{R}_\mathfrak{m}/\mathbf{A}_\mathfrak{m}} \left[\begin{array}{c} J_X(f)dX_1 \wedge \dots \wedge dX_n \\ f_1, \dots, f_n \end{array} \right] = \text{Res}_{\mathbf{R}_\mathfrak{m}/\mathbf{A}_\mathfrak{m}} \left[\begin{array}{c} df_1 \wedge \dots \wedge df_n \\ f_1, \dots, f_n \end{array} \right] = 0$$

D'après 2.2 ce dernier résidu n'est autre que la trace de l'opérateur identité de $\mathbf{P}_\mathfrak{m}$. Comme $\mathbf{P}_\mathfrak{m}$ est un $\mathbf{A}_\mathfrak{m}$ module libre de rang r (c.f [B2] II § 5 p.141), ce résidu vaut donc r . Il ne peut donc être nul que si la caractéristique de $\mathbf{A}_\mathfrak{m}$, c'est à dire celle de \mathbf{A} , divise r .

Nous indiquons maintenant comment modifier la preuve ci-dessus dans les hypothèses alternatives. La seule chose qui soit modifiée est le fait que l'on utilise des arguments différents pour faire les calculs de trace. Soient $\hat{\mathbf{A}}$ et $\hat{\mathbf{P}}$ les complétés $\mathfrak{m}_\mathbf{A}$ -adiques de \mathbf{A} et \mathbf{P} . Comme \mathbf{P} est supposé être un \mathbf{A} -module libre, $\hat{\mathbf{P}}$ est un $\hat{\mathbf{A}}$ libre (car le morphisme $\mathbf{A} \longrightarrow \hat{\mathbf{A}}$ est fidèlement plat). Si g est un élément de \mathbf{P} la matrice de l'opérateur de p_g de multiplication par g comme élément de $\text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{P})$ est la même que celle de l'opérateur de multiplication \hat{p}_g comme élément de $\text{End}_{\hat{\mathbf{A}}}(\hat{\mathbf{P}})$. Il suffit pour le voir de considérer un isomorphisme d'un \mathbf{A}^m sur \mathbf{P} et de tensoriser par $\hat{\mathbf{A}}$. Ainsi :

$$\text{Tr}_{\mathbf{P}/\mathbf{A}}(p_g) = \text{Tr}_{\hat{\mathbf{P}}/\hat{\mathbf{A}}}(\hat{p}_g)$$

Ensuite notons $K = \frac{\mathbf{A}}{\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}}$, le théorème de structure des anneaux locaux complets d'égale caractéristique de I. Cohen nous dit que $\hat{\mathbf{A}}$ est isomorphe à $K[[Y]]/J$, où J est un idéal (Y) primaire puisque \mathbf{A} et donc $\hat{\mathbf{A}}$ sont de dimension 0. Ainsi $\hat{\mathbf{P}}$ est une K -algèbre et un K -espace vectoriel de dimension finie, dimension qui n'est autre que la longueur du A -module Artinien \mathbf{P} . Maintenant on a (c.f. [B1] chap III § 9 p.110 (21)) :

$$\text{Tr}_{\hat{\mathbf{P}}/\hat{\mathbf{A}}}(\hat{p}_g) = \text{Tr}_{\hat{\mathbf{P}}/K}(\hat{p}_g)$$

Dans le cas où p_g est nilpotente, cette trace est donc nulle puisque \hat{p}_g est un endomorphisme nilpotent sur un K -espace vectoriel de dimension finie. Et si $g = 1$ cette trace est la classe dans K , de la longueur qui intervient dans l'énoncé ou encore celle de $\dim_K \hat{\mathbf{P}}$. Cette classe est non nulle puisque par hypothèse ce nombre est premier à la caractéristique de K . Ceci permet de conclure comme plus haut aux assertions 1) et 2) de 3.1). \square

Nous allons maintenant énoncer une version relative de 1) \implies 2) dans 1.1. Pour la notion d'anneau de Gorenstein nous renvoyons à [E] Chap. 21 p. 525 ou [B3] § 3, p. 48.

Théorème 3.3

Soit \mathbf{A} un anneau local de Gorenstein, Artinien d'égale caractéristique zéro. Posons $\mathbf{R} = \mathbf{A}[[X_1, \dots, X_n]]$ et $(f_1, \dots, f_n) \in \mathbf{R}$ tels que $(f_1, \dots, f_n) \cdot \mathbf{R} = I \cdot \mathbf{R} \neq \mathbf{R}$. Alors si \mathbf{R}/I n'est pas Artinien alors :

$$J_X(f_1, \dots, f_n) \in I$$

Preuve :

Remarquons d'abord que \mathbf{A} étant de Gorenstein, il est de Cohen-Macaulay. Il en est de même de \mathbf{R} qui est de Gorenstein et de Cohen-Macaulay. Comme la dimension de Krull de \mathbf{R} est n , il s'en suit que toute suite (g_1, \dots, g_n) qui engendre un idéal $\mathfrak{m}_{\mathbf{R}}$ primaire est régulière donc quasi-régulière puisque l'on travaille ici dans un cadre local. Par ailleurs $\mathbf{R}/(g_1, \dots, g_n) \cdot \mathbf{R}$ est un \mathbf{A} module libre de type fini. En effet, \mathbf{A} étant local Artinien il est séparé et complet pour la topologie $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$ -adique. Par le théorème de structure de I. Cohen des anneaux locaux complets d'égale caractéristique on a $\mathbf{A} \simeq k[[Y]]/\mathfrak{a}$, où \mathfrak{a} est $\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$ -primaire, $k \simeq \mathbf{A}/\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}$ et $Y = (Y_1, \dots, Y_p)$. Notons $g_1(Y, X), \dots, g_n(Y, X)$ des éléments de $k[[Y, X]]$ représentant les $g_i \in \mathbf{R} \simeq k[[Y, X]]/\mathfrak{a}$. Puisque $\mathbf{R}/(\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}, g_1, \dots, g_n) \cdot \mathbf{R}$ est Artinien, on peut affirmer que :

$$\frac{k[[X]]}{(g_1(0, X), \dots, g_n(0, X))} \simeq \frac{k[[Y, X]]}{(Y, g_1(Y, X), \dots, g_n(Y, X))} \simeq \frac{\mathbf{R}}{(\mathfrak{m}_{\mathbf{A}}, g_1, \dots, g_n)}$$

est un k -espace vectoriel de dimension finie. Il en découle que $g_1(0, X), \dots, g_n(0, X)$ est une suite régulière de $k[[X]] \simeq \mathbf{R}/\mathfrak{m}_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{R}$. Par conséquent, puisque \mathbf{R} est \mathbf{A} -plat, le critère local de platitude (c.f. [M] Th. 22.5 et Cor. p. 176-177) nous assure

que $\mathbf{R}/(g_1, \dots, g_n)\mathbf{R}$ est un \mathbf{A} -module (de type fini) plat. Puisque \mathbf{A} est local, $\mathbf{R}/(g_1, \dots, g_n)\mathbf{R}$ est un \mathbf{A} -module libre de type fini. On pourra donc appliquer 3.1 à de telles suites (g_1, \dots, g_n) .

Soit $(f) = (f_1, \dots, f_n)$ satisfaisant les hypothèses du théorème. Notons d'abord que le résultat est trivial si le nombre minimal de générateurs de I est strictement plus petit que n . En effet, dans cette éventualité, si u_1, \dots, u_k , $k < n$ est un système de générateurs de I . On a :

$$f_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j}u_j, \quad d_X f_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j}d_X u_j \quad (\text{mod } I), \quad a_{i,j} \in \mathbf{R}$$

Ainsi $J_X(f) = 0 \pmod{I}$. On peut donc supposer sans restriction que le nombre minimal de générateurs de I est n . Notons $\mathfrak{m}_{\mathbf{R}}$ l'idéal maximal de \mathbf{R} . Par le théorème d'intersection de Krull, on a :

$$I = \bigcap_{a \in \mathbb{N}} (I + \mathfrak{m}_{\mathbf{R}}^a)$$

Il suffit donc de démontrer que : $J_X(f) \in I + \mathfrak{m}_{\mathbf{R}}^a$ pour a assez grand. Fixons a et soient n_a le nombre minimal de générateurs de I_a et g_1, \dots, g_{n_a} un système minimal de générateurs de I_a . Comme $\dim(\mathbf{R}) = n$, les résultats de Northcott-Rees [N-R] sur la réduction des idéaux nous assurent que quitte à remplacer les g_i par n_a combinaisons linéaires à coefficients dans \mathbb{Q} suffisamment généraux des g_i , on peut supposer que toute sous-famille g_{i_1}, \dots, g_{i_n} est telle que l'idéal $(g_{i_1}, \dots, g_{i_n})$ est $\mathfrak{m}_{\mathbf{R}}$ -primaire. Deux éventualités peuvent se présenter.

- Soit $n_a > n$. Alors :

$$f_i = \sum_{j=1}^{n_a} a_{i,j}.g_j, \quad \text{donc } d_X f_i = \sum_{j=1}^{n_a} a_{i,j}.d_X g_j \quad (\text{mod } I_a)$$

Ainsi :

$$J_X(f) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_n} A_{(i_1, \dots, i_n)} J_X(g_{i_1}, \dots, g_{i_n}) \quad (\text{mod } I_a), \quad A_{(i_1, \dots, i_n)} \in \mathbf{R}$$

Il suffit donc de voir que chaque $J_X(g_{i_1}, \dots, g_{i_n})$ est dans I_a . Soient $\underline{i} = (i_1, \dots, i_n)$ un tel multi-indice et $\mathbf{P}_{\underline{i}} = \mathbf{R}/(g_{i_1}, \dots, g_{i_n})$. Notons $S_{\underline{i}}$ le socle de $\mathbf{P}_{\underline{i}}$ i.e. $S_{\underline{i}} = \{x \in \mathbf{P}_{\underline{i}}/\mathfrak{m}_{\underline{i}}.x = 0\}$ où $\mathfrak{m}_{\underline{i}}$ est l'idéal maximal de $\mathbf{P}_{\underline{i}}$. D'après 3.1 $\bar{J}_X(g_{i_1}, \dots, g_{i_n}) \in S_{\underline{i}}$ (car g_{i_1}, \dots, g_{i_n} est une suite régulière de \mathbf{R}). Maintenant on a les inclusions strictes :

$$0 \subset I_a.\mathbf{P}_{\underline{i}} \subset \mathbf{P}_{\underline{i}}$$

$\mathbf{P}_{\underline{i}}$ étant Artinien, tout sous-module non trivial de $\mathbf{P}_{\underline{i}}$ contient un sous-module simple. Un sous-module simple est par le lemme de Nakayama inclus dans le socle de $\mathbf{P}_{\underline{i}}$. Maintenant \mathbf{R} étant de Gorenstein et g_{i_1}, \dots, g_{i_n} une suite régulière de \mathbf{R} ,

$\mathbf{P}_{\underline{i}}$ est de Gorenstein (c.f [B3] exemple 2 p. 48) et donc son socle est simple et c'est le seul sous-module simple de $\mathbf{P}_{\underline{i}}$. On a donc :

$$\overline{J}_X(g_{i_1}, \dots, g_{i_n}) \in S_{\underline{i}} \subset I_a \cdot \mathbf{P}_{\underline{i}}$$

Ce que nous souhaitions.

-Soit $n_a = n$. Puisque I_a est $\mathfrak{m}_{\mathbf{R}}$ -primaire et \mathbf{R}/I n'est pas Artinien, on a une inclusion stricte : $I \subset I_a$. Par conséquent il existe des $a_{i,j} \in \mathbf{R}$ tels que :

$$f_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} g_j.$$

On a nécessairement $\det(a_{i,j}) \in \mathfrak{m}_{\mathbf{R}}$, sans quoi $I = I_a$. Maintenant on a :

$$J_X(f) = \det(a_{i,j}) \cdot J_X(g).$$

On conclut alors par 3.1 puisque g_1, \dots, g_n est régulière et $\det(a_{i,j}) \in \sqrt{(g_1, \dots, g_n)} = \mathfrak{m}_{\mathbf{R}}$. \square

Exemple 3.4

1) Si $\mathbf{A} = k$ un corps de caractéristique zéro, on retrouve l'implication 1) \implies 2) du théorème 1.1.

2) Soit toujours k un corps de caractéristique zéro, on peut prendre pour $\mathbf{A} = k[[Y_1, \dots, Y_p]]/(h_1, \dots, h_p)$ où (h_1, \dots, h_p) engendre un idéal (Y) -primaire. Si k est muni d'une valeur absolue non triviale, on peut prendre de la même façon $\mathbf{A} = \mathcal{O}_p/(h_1, \dots, h_p)$ où \mathcal{O}_p désigne l'anneau des germes de séries convergentes en p variables et (h_1, \dots, h_p) est un idéal primaire pour l'idéal maximal de \mathcal{O}_p .

3) Considérons toujours $S = k[[Y_1, \dots, Y_p]]$ ou sa version convergente \mathcal{O}_p dans le cas où k est muni d'une valeur absolue non triviale. Soit Δ un opérateur différentiel à coefficients constants :

$$\Delta = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}^p, |\alpha| \leq m} a_{\alpha} \frac{\partial^{\alpha}}{\partial Y^{\alpha}}$$

Alors Δ définit un morphisme $\Delta_0 \in \text{Hom}_k(S, k)$ en posant $\Delta_0(f) = \Delta(f)(0)$. Soit J l'annulateur de Δ_0 , i.e.

$$J = \{a \in S / \forall f \in S, \Delta_0(a \cdot f) = 0\}$$

Alors J est un idéal primaire et $\mathbf{A} = S/J$ est un anneau de Gorenstein Artinien d'égale caractéristique zéro et le résultat s'applique. Prenant par exemple Δ le «Laplacien» : $\Delta = \sum_{i=1}^p \frac{\partial^2}{\partial Y_i^2}$, on obtient un anneau de Gorenstein qui n'est pas intersection complète et qui n'est pas du type de l'exemple 2).

Corollaire 3.5

Soient \mathbf{A} un anneau local de Gorenstein de dimension 0 d'égale caractéristique zéro, $\mathbf{R} = \mathbf{A}[[X_1, \dots, X_n]]$ et f_1, \dots, f_n des éléments de \mathbf{R} tels que l'idéal I engendré par f_1, \dots, f_n soit un idéal propre. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1) $\dim \mathbf{R}/I > 0$
- 2) $J_X(f_1, \dots, f_n) \in I$

Preuve : On vient de prouver 1) \implies 2). 2) \implies 1) ou de manière équivalente non1) \implies non2) découle de 3.1). Puisque R est de dimension n et de Cohen-Macaulay, si (f_1, \dots, f_n) ne satisfont pas 1) alors I est primaire pour l'idéal maximal de \mathbf{R} et donc la suite (f_1, \dots, f_n) est régulière. On est donc dans les conditions alternatives de 3.1), comme nous l'avons plus haut. \square

Remarque 3.6 Même dans le cas le plus simple, c'est à dire $\mathbf{A} = \mathbb{C}$ et $\mathbf{R} = \mathcal{O}_n$ ou $\mathbb{C}[[X]]$ le résultat n'est pas immédiat à prouver par des techniques purement analytiques. Nous renvoyons à [B-Y] pour de telles tentatives.

4 Preuve de 1.2 et corollaire

Par commodité pour le lecteur, nous rappelons d'abord ici quelques notions essentielles pour lesquelles nos sources sont [H-I-O], [H-S], [L-T], [N-R], [R] et nous renvoyons à ces références pour de plus amples précisions. Nous donnons ensuite une preuve du critère métrique de dépendance intégrale de [L-T] qui n'utilise pas la désingularisation et permet son extension en caractéristique arbitraire ou au contexte de tout corps muni d'une valeur absolue non triviale. De même, nous prouvons que dans le contexte des anneaux locaux d'égale caractéristique le critère valuatif de dépendance intégrale peut être vérifié avec des arcs. Nous démontrons ensuite le théorème 1.2

Proposition et Définition 4.1 Soient \mathbf{R} un anneau commutatif unitaire et noethérien, I un idéal de \mathbf{R} .

- 1) Un élément $x \in \mathbf{R}$ est dit entier sur I si et seulement si il satisfait une relation :

$$x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k = 0, \text{ avec } a_i \in I^i, 1 \leq i \leq k.$$

L'ensemble de tous les éléments entiers sur I est un idéal \bar{I} de \mathbf{R} , appelé clôture intégrale de I .

- 2) Soit $\theta = \frac{p}{q}$ un nombre rationnel positif, on dit qu'un élément $x \in \mathbf{R}$ est dans $\overline{I^\theta}$ si et seulement si x satisfait une relation :

$$x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k = 0, \text{ avec } \frac{\text{ord}_I(a_i)}{i} \geq \theta, 1 \leq i \leq k.$$

où $\text{ord}_I(f) = \text{Sup}\{k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\} / f \in I^k\}$. Il revient au même de dire que $f^q \in \overline{I^p}$. $\overline{I^\theta}$ est un idéal de \mathbf{R} .

Lemme 4.2

Soient \mathbf{R} et I comme ci-dessus.

- 1) Pour toute partie multiplicativement fermée $S \subset \mathbf{R}$, $\overline{I} \cdot \mathbf{R}_S = \overline{I \cdot \mathbf{R}_S}$.
- 2) Si $\mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}'$ est un morphisme fidèlement plat d'anneaux noethériens alors :

$$\overline{I \cdot \mathbf{R}'} \cap \mathbf{R} = \overline{I}.$$

L'appartenance d'un élément f à \overline{I} se vérifie souvent à l'aide du critère valuatif de dépendance intégrale.

Théorème 4.3 (Critère valuatif de dépendance intégrale) ([H-I-O], [H-R], [R])
Soient \mathbf{R} un anneau noethérien, $I \subset \mathbf{R}$ un idéal, $f \in \mathbf{R}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1) $f \in \overline{I}$
- 2) Pour toute valuation discrète $v : \mathbf{R} \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, on a :

$$v(f) \geq v(I), \quad v(I) = \text{Min}(v(x), x \in I)$$

De plus si I n'est contenu dans aucun des premiers minimaux de R , il existe un ensemble fini de valuation discrète $v_l, l \in \Lambda$, de rang 1, unique à l'équivalence près des valuations et minimal pour la propriété : $f \in \overline{I}$ si et seulement si $v_l(f) \geq v_l(I), \forall l \in \Lambda$. Cet ensemble de valuation est appelé l'ensemble des valuations de Rees de I . Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des valuations de Rees de I et de I^k coïncident (c.f. [H-S] chap. 10). De plus pour tout $\theta \in \mathbb{Q}_{>0}$, $f \in \mathbf{R}$, on a $f \in \overline{I^\theta}$ si et seulement si on a :

$$v_l(f) \geq \theta \cdot v_l(I), \quad \forall l \in \Lambda$$

Les valuations de Rees peuvent être construites par le procédé suivant. (c.f. [H-S] chap 10 Ex. 10.6 p.208). C'est une «version faisceautisée» de cette construction qui est adoptée dans [L-T] dans le cadre de la géométrie analytique complexe. Notons $\Pi' : X' \longrightarrow \text{Spec}(\mathbf{R})$ l'éclatement normalisé de centre I . C'est à dire Π' est le composé de l'éclatement de centre I , $\Pi : X \longrightarrow \text{Spec}(\mathbf{R}), X = \text{Proj}(\oplus_{m \geq 0} I^m)$, et du morphisme de normalisation $N : X' \longrightarrow X$. Posons $Z = \text{Spec}(\mathbf{R}/I)$ et soit $Y' = \Pi'^{-1}(Z)$. Considérons la décomposition en composantes irréductibles de Y'_{red} i.e. :

$$Y'_{red} = \cup_{l \in \Lambda} Y'_l$$

Puisque X' est normal, il est régulier en codimension 1. Chaque Y'_l étant irréductible de codimension 1, notant \mathcal{O}_{X', Y'_l} la fibre du faisceau structural $\mathcal{O}_{X'}$ de X' au point correspondant à l'idéal premier définissant Y'_l , chaque anneau \mathcal{O}_{X', Y'_l} est un anneau régulier de dimension 1 donc un anneau de valuation discrète dont on note v_l la valuation. On a pour tout $a \in \mathcal{O}_{X', Y'_l}$:

$$v_l(a) = \text{long}(\mathcal{O}_{X', Y'_l} / a \cdot \mathcal{O}_{X', Y'_l})$$

où *long* désigne la longueur. Ou bien encore $v_l(a) = \text{Max}\{k \in \mathbb{N} / a \in \mathfrak{m}_{X',Y'_l}^k\}$, où l'on a désigné par \mathfrak{m}_{X',Y'_l} l'idéal maximal (principal) de \mathcal{O}_{X',Y'_l} . On fait alors agir les v_l sur R via le morphisme $\Pi^\# : \mathbf{R} \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{O}_{X',Y'_l}$. On a ainsi une construction des valuations de Rees. Pour plus d'informations et une présentation dans le vocabulaire de l'algèbre de Rees nous renvoyons à [H-S] chap. 10.

Proposition et Définition 4.4 (*fonction asymptotique de Samuel*) ([H-S],[S],[L-T])

Soient \mathbf{R} et I comme précédemment, on appelle fonction asymptotique de Samuel de I et on note \bar{v}_I la fonction :

$$\bar{v}_I(x) = \text{Lim}_{m \rightarrow +\infty} \frac{\text{ord}_I(x^m)}{m} = \text{Sup}_{\{m \in \mathbb{N}^*\}} \frac{\text{ord}_I(x^m)}{m}$$

qui est à valeurs dans $\mathbb{Q}^+ \cup \{+\infty\}$. On a :

$$\bar{v}_I(x) = \text{Min}\left\{\frac{v_l(x)}{v_l(I)}, \text{ où } v_l \text{ parcourt l'ensemble des valuations de Rees de } I\right\}$$

Ainsi : $x \in \bar{I}$, si et seulement si $\bar{v}_I(x) \geq 1$. De façon plus générale, si $\theta \in \mathbb{Q}_{>0}$, on a : $x \in \bar{I}^\theta$ si et seulement si $\bar{v}_I(x) \geq \theta$.

Dans [L-T], M. Lejeune et B. Teissier ont étudié la notion de clôture intégrale des idéaux en relation avec certaines inégalités de Lojasiewicz dans le cadre de la géométrie analytique complexe. Leurs preuves utilisent l'existence de désingularisation et des propriétés topologiques de \mathbb{C} . Au moins deux faits importants ressortent de [L-T]. Le premier est le critère métrique de dépendance intégrale qui permet de relier la fonction asymptotique de Samuel et certains exposants de Lojasiewicz, le second est que l'on puisse vérifier le critère valuatif uniquement à l'aide d'arcs. Nous indiquons ici comment leurs résultats se généralisent en caractéristique arbitraire et pour des corps algébriquement clos arbitraires (notamment en géométrie analytique rigide) et comment la théorie générale permet d'en donner une preuve.

L'essence du critère métrique de dépendance intégrale est le lemme suivant.

Lemme 4.5

Soit A un anneau (nécessairement intègre) muni d'une valeur absolue non triviale : $|\cdot|$, $A \longrightarrow [0, \infty[$. Alors si $a \in A$ satisfait une équation :

$$a^m + \sum_{i=1}^m a_i a^{m-i} = 0$$

Alors : $|a| \leq 2 \cdot \text{Max}|a_i|^{\frac{1}{i}}$

Preuve : Soit $K = \text{frac}A$) et \hat{K} son complété pour la topologie définie par la valeur absolue. Alors la valeur absolue $|\cdot|$ se prolonge de manière unique à

\hat{K} . De même désignons par K' une clôture algébrique de \hat{K} , alors il existe une unique extension de la valeur absolue de \hat{K} à K' (c.f [B-G-R]). On peut ainsi supposer sans perte de généralité que A est un corps algébriquement clos muni d'une valeur absolue non triviale. Le lemme est alors élémentaire. Soit en effet i_0 tel que $|a_{i_0}|^{\frac{1}{i_0}} = \text{Max}|a_i|^{\frac{1}{i}}$ et $\alpha \in k$ tel que $\alpha^{i_0} = a_{i_0}$. Alors $a' = \frac{a}{\alpha}$ satisfait une équation :

$$(a')^m + \sum_{i=1}^m b_i (a')^{m-i}, \text{ avec } \text{Max}_{1 \leq i \leq m} |b_i|^{\frac{1}{i}} \leq 1$$

Posons $r = |a'|$. Alors : $1 \leq \sum_{i=1}^m \frac{1}{r^i} < \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{r^i}$ Donc nécessairement $\frac{1}{r} \geq \frac{1}{2}$ et donc $r \leq 2$. \square

Théorème 4.6

Soit k un corps algébriquement clos, $\mathbf{R} = k[[X_1, \dots, X_n]]$ ou bien $\mathbf{R} = \mathcal{O}_n$ l'anneau des germes de séries convergentes en n variables, lorsque k est munie d'une valeur absolue non triviale $|\cdot| : k \rightarrow [0, +\infty[$. Soit $I = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ un idéal de \mathbf{R} . Alors pour $u \in \mathbf{R}$ et tout $\theta \in \mathbb{Q}_{>0}$ les propriétés suivantes sont équivalentes.

1) $u \in \overline{I}^\theta$.

2) (Critère métrique de dépendance intégrale) Si k est munie d'une valeur absolue non triviale et $\mathbf{R} = \mathcal{O}_n$:

$$\exists \varepsilon > 0, \exists c > 0 / \quad x \in k^n \text{ et } \|x\| < \varepsilon \implies (|u(x)| \leq C.(\text{Max}_{1 \leq i \leq m} |u_i(x)|)^\theta)$$

3) (k algébriquement clos quelconque, Critère valuatif par les arcs) Pour tout arc $\varphi^* : \mathbf{R} \rightarrow k[[t]]$

$$\text{ord}_t(\varphi^*(u)) \geq \theta. \text{Min}(\text{ord}_t(\varphi^*(u_i)))$$

Il existe de plus un nombre fini d'arcs φ^{l*} , $l \in \Lambda$ tels que 3) est satisfaite si et seulement si elle est satisfaite pour ces arcs φ^{l*} , $l \in \Lambda$. On a de plus :

$$\bar{v}_I(u) = \text{Min}_{l \in \Lambda} \frac{\text{ord}_t(\varphi^{l*}(u))}{\text{Min}_{1 \leq i \leq n} \{\text{ord}_t(\varphi^{l*}(u_i))\}}$$

La donnée d'un arc $\varphi^* : \mathbb{R} \rightarrow k[[t]]$, c'est à dire d'un morphisme nécessairement local de k -algèbres de \mathbf{R} dans $k[[t]]$ est équivalente à la donnée d'un élément $\varphi(t) \in (tk[[t]]) \times \dots \times (tk[[t]])$ qui agit par composition sur \mathbf{R} et nous emploierons indifféremment les deux notations. Le fait que l'on puisse vérifier le critère valuatif à l'aide d'arcs est une spécificité due au fait que l'on travaille avec des anneaux locaux noethériens qui contiennent des corps (contexte d'égale caractéristique), contexte qui est suffisant pour nous. On peut faire des énoncés similaires en géométrie analytique rigide ou bien considérer des algèbres essentiellement de type fini sur un corps algébriquement clos.

Preuve : (Schéma)

1) \implies 2) par le lemme ci-dessus. 1) \implies 3) immédiat. 2) \implies 3) car le corps

k contient des éléments arbitrairement petits pour la valeur absolue. 3) \implies 1) résulte facilement de la théorie générale et du théorème de structure (I.S. Cohen) des anneaux complets réguliers d'égales caractéristiques (En imitant [L-T]). En effet considérons toujours $\Pi' : X' \xrightarrow{N} X \xrightarrow{\Pi} \text{Spec}(R)$ l'éclatement normalisé de centre I et $Z \hookrightarrow \text{Spec}(R)$, $Z = \text{Spec}(R/I)$ et toujours $Y' = \Pi'^{-1}(Z)$ et sa décomposition en composantes irréductibles $Y'_{red} = \cup_{l \in \Lambda} Y'_l$ et soit :

$$m'_l = \text{long}(\mathcal{O}_{Y', Y'_l}) = \text{long}(\mathcal{O}_{X', Y'_l}/I \cdot \mathcal{O}_{X', Y'_l})$$

X' étant normal et donc régulier en codimension 1, chaque \mathcal{O}_{X', Y'_l} est un anneau régulier de dimension 1 et donc un anneau de valuation discrète dont on note v_l la valuation. Ces valuations sont une description des valuations de Rees comme nous l'avons mentionné plus haut. Posons $v_l(u \cdot \mathcal{O}_{X', Y'_l}) = v_l$. Notons \mathcal{P}_l le sous-faisceau d'idéaux premiers définissant Y'_l . Désignant par $\hat{}$ la complétion pour l'idéal maximal, le théorème de structure des anneaux réguliers complets locaux d'égales caractéristiques permet d'affirmer que si y'_l est un point fermé, $y'_l \in \text{Reg}(Y'_l) \cap \text{Reg}(X')$ suffisamment général, on a en désignant par $K(Y'_l)$ le corps résiduel de \mathcal{O}_{X', Y'_l} :

$$\hat{\mathcal{O}}_{X', Y'_l} \simeq K(Y'_l)[[t]] \quad (9)$$

$$I \cdot \hat{\mathcal{O}}_{X', Y'_l} \simeq (t)^{m'_l} K(Y'_l)[[t]] \quad (10)$$

$$\hat{\mathcal{O}}_{X', y'_l} \simeq k[[t, U]], \quad U = (U_2, \dots, U_n) \quad (11)$$

$$I \cdot \hat{\mathcal{O}}_{X', y'_l} \simeq (t)^{m'_l} k[[t, U]] \quad (12)$$

$$u \cdot \hat{\mathcal{O}}_{X', y'_l} \simeq (t)^{v_l} k[[t, U]] \quad (13)$$

$$\mathcal{P}_{i', y'_l} \cdot \hat{\mathcal{O}}_{X', y'_l} \simeq (t) \cdot k[[t, U]] \quad (14)$$

L'arc :

$$\varphi^{l*} : R \xrightarrow{\Pi'^{\sharp}} \hat{\mathcal{O}}_{X', y'_l} = k[[t, U]] \longrightarrow k[[t]]$$

où la dernière flèche est $t \rightarrow t$ et $U \rightarrow 0$, calcule alors $v_l(I)$ (resp. $v_l(u)$) comme $\text{Min}_{\text{ord}_t}(\varphi^{l*}(u_j))$ (resp. $\text{ord}_t(\varphi^{l*}(u))$). Ainsi si 3) est satisfaite la considération des arcs φ^{l*} , $l \in \Lambda$, nous assure que $v_l(u) \geq \theta \cdot v_l(I)$, pour les valuations de Rees et donc que $u \in \overline{I}^{\theta}$ au vu des résultats généraux rappelés ci-dessus. Il en va de même pour le calcul de la fonction asymptotique de Samuel. \square

Preuve de 1.2 :

Soit m le rang de la matrice Jacobienne $\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(0)$. Alors le théorème des fonctions implicites formel nous assure qu'il existe un k -automorphisme α^* de $k[[X_1, \dots, X_n]]$ tel que :

$$\alpha^*(f_i) = X_i, \quad 1 \leq i \leq m, \quad \alpha^*(f_{m+i}) = F_i, \quad 1 \leq i \leq n - m,$$

avec posant $X' = (X_{m+1}, \dots, X_n)$, $d_{X'} F_i(0) = 0$, $1 \leq i \leq n - m$. Posons $g_i(X') = F_i(0, X')$, $1 \leq i \leq n - m$. On a $J_X(\alpha^*(f_1), \dots, \alpha^*(f_n)) = J_{X'}(g_1, \dots, g_{n-m})$. Posons :

$$I = (X_1, \dots, X_m, F_1, \dots, F_{n-m}) = (X_1, \dots, X_m, g_1(X'), \dots, g_{n-m}(X')) \quad (15)$$

$$J = (g_1, \dots, g_{n-m}) \subset k[[X']] \quad (16)$$

Pour $\theta \geq 1$, on a $J_X(f) \in \overline{I}^\theta$ si et seulement si $J_{X'}(g) \in \overline{J}^\theta$. Ainsi quitte à substituer les g_i aux f_i , on pourra supposer sans perte de généralités que f_1, \dots, f_n sont n éléments de $k[[X_1, \dots, X_n]]$ tels que le rang de la matrice Jacobienne $\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(0)$ est nul. Il s'agit de voir que si $n = 2$, alors $J_X(f) \in \overline{I}$ et que si $n > 2$, il existe $\theta > 1$ tel que $J_X(f) \in \overline{I}^\theta$.

Pour cela on peut supposer que k est algébriquement clos. En effet si cela n'est pas le cas, soit \overline{k} une clôture algébrique de k . Le morphisme naturel $k[[X_1, \dots, X_n]] \longrightarrow \overline{k}[[X_1, \dots, X_n]]$ est fidèlement plat. Ainsi si $h \in k[[X]]$ et I est un idéal on a : $h \in \overline{I}^\theta$ si et seulement si $h \in (\overline{I \cdot \overline{k}[[X]]})^\theta$. D'autre part si k est munie d'une valeur absolue non triviale $|\cdot|$, on complète celui-ci pour la valeur absolue en un corps k' et celle-ci se prolonge de manière unique à une clôture algébrique de $\overline{k'}$ (c.f. [B.G.R]). Pour les questions ayant trait aux inégalités, il suffit de vérifier celles-ci au voisinage de 0 dans $\overline{k'^n}$. Nous supposons donc que k est algébriquement clos. D'après les résultats mentionnés plus haut, notant $I = (f_1, \dots, f_n)$, il existe un nombre fini d'arcs φ^l , $l \in \Lambda$, $\varphi^l \in (tk[[t]]) \times \dots \times (tk[[t]])$ tels que pour tout $\theta = p/q \in \mathbb{Q}_{>0}$ et tout $h \in k[[X]]$ on a : $h \in \overline{I}^\theta$ si et seulement si :

$$\forall l \in \Lambda, \text{ord}_t(h \circ \varphi^l) \geq \theta \cdot \text{Min}_{1 \leq i \leq n} \text{ord}_t(f_i \circ \varphi^l)$$

Fixons un tel arc φ (nous omettrons l'exposant l). On a alors :

$$(f_i \circ \varphi)'(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(\varphi(t)) \varphi_j'(t)$$

Par les règles de Cramer, désignant par $\Delta_{i,j}$ le mineur obtenu à partir de la matrice Jacobienne en rayant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne on a :

$$\varphi_j'(t) \cdot J_X(f)(\varphi(t)) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}(\varphi(t)) (f_i \circ \varphi)'(t)$$

Comme la caractéristique de k est zéro, on a $\text{ord}_t(\varphi_j') = \text{ord}_t(\varphi_j) - 1$ et $\text{ord}_t(f_i \circ \varphi)' = \text{ord}_t(f_i \circ \varphi) - 1$. Ainsi l'identité ci-dessus fournit :

$$\text{ord}_t(\varphi_j) + \text{ord}_t(J_X(f)(\varphi)) \geq \text{Min}_{1 \leq i \leq n} (\text{ord}_t(\Delta_{i,j}(\varphi(t))) + \text{ord}_t(f_i \circ \varphi))$$

Fixons alors j tel que $\text{ord}_t(\varphi_j) = \text{Min}_{1 \leq k \leq n} \text{ord}_t(\varphi_k) = \text{ord}_t(\varphi^*(\mathfrak{m})) = \text{ord}_t(\varphi)$ où \mathfrak{m} est l'idéal maximal de $k[[X]]$. Pour un tel indice j , on obtient par l'inégalité ci-dessus :

$$\text{ord}_t(J_X(f)(\varphi)) \geq \text{Min}_{1 \leq i \leq n} (\text{ord}_t(\Delta_{i,j}(\varphi)) - \text{ord}_t(\varphi)) + \text{Min}_{1 \leq i \leq n} (\text{ord}_t(f_i \circ \varphi))$$

Maintenant puisque le rang de la matrice jacobienne de (f_1, \dots, f_n) en 0 est nul, on a : $\Delta_{i,j} \in \mathfrak{m}$ si $n = 2$ et $\Delta_{i,j} \in \mathfrak{m}^2$ si $n \geq 3$. Par suite l'inégalité ci-dessus assure que $J_X(f) \in \bar{I}$ si $n = 2$. Si $n \geq 3$, alors puisque $\Delta_{i,j} \in \mathfrak{m}^2$ on a :

$$\text{ord}_t(\Delta_{i,j}(\varphi)) - \text{ord}_t(\varphi) \geq \text{ord}_t(\varphi)$$

Maintenant I est un idéal \mathfrak{m} -primaire, donc il existe $s \in \mathbb{N}^*$ tel que : $\mathfrak{m}^s \subset I$. D'où $s \cdot \text{ord}_t(\varphi) \geq \text{Min}_{1 \leq i \leq n} \text{ord}_t(f_i \circ \varphi)$. Ce qui permet d'obtenir :

$$\text{ord}_t(J_X(f)(\varphi)) \geq (1 + 1/s) \text{Min}_{1 \leq i \leq n} \text{ord}_t(f_i \circ \varphi)$$

Ainsi le nombre rationnel θ :

$$\theta = \text{Min}_{l \in \Lambda} \frac{\text{ord}_t(J_X(f) \circ \varphi^l)}{\text{Min}_{1 \leq i \leq n} (\text{ord}_t(f_i \circ \varphi^l))} = \overline{v_I}(J_X(f))$$

est strictement plus grand que 1. Les inégalités de Łojasiewicz de 1.2) dans le cas convergent s'obtiennent par le critère métrique de dépendance intégrale mentionné plus haut. \square

Remarque 4.7

1) Si $n - m = 2$, il n'existe pas en général de $\theta > 1$ plus grand que 1 tel que : $J_X(f_1, \dots, X_n) \in \bar{I}^\theta$. Il suffit de considérer l'exemple :

$$(f_1, \dots, f_n) = (X_1, \dots, X_{n-2}, X_{n-1}^2, X_n^2).$$

On a alors $J_X(f) \in \bar{I}$ mais pour aucun nombre $\theta > 1$, $J_X(f_1, \dots, f_n) \in \bar{I}^\theta$. En effet ici $\bar{I} = (X_1, \dots, X_{n-2}, X_{n-1}^2, X_{n-1}X_n, X_n^2)$ et $J_X(f) = 4X_{n-1}X_n$. Mais c'est à peu près le seul cas où une telle situation se produit. La même preuve que ci-dessus montre que $\overline{v_I}(J_X(f)) > 1$ dès que $\text{Min}(\text{ord}_X(f_i)) \geq 3$.

2) Bien entendu le cas de $k = \mathbb{R}$ ou \mathbb{C} est le premier qui se présente. Mais on peut considérer aussi le cas où R est un corps réel clos et prendre pour k le corps des séries de puissances à coefficients dans R ou $C = R + iR$ i.e $k = \cup_{q \in \mathbb{N}^*} R((X^{1/q}))$ ou $k = \cup_{q \in \mathbb{N}^*} C((X^{1/q}))$. De tels corps sont naturellement munis d'une valeur absolue ultramétrique non triviale $|a| = e^{-\text{ord}_X(a)}$. Les inégalités de Łojasiewicz de 1.2 sont valables pour les séries convergentes à coefficients dans de tels corps.

3) Un célèbre résultat de S. Łojasiewicz affirme que si f est un germe de série convergente en n variables réelles, $f(0) = 0$, alors il existe un nombre rationnel $\theta > 1$ tel que au voisinage de 0 dans \mathbb{R}^n , on ait $|f(x)| \leq C(\sum_{1 \leq i \leq n} |\frac{\partial f}{\partial X_i}(x)|)^\theta$. Pour des preuves très différentes les unes des autres nous renvoyons respectivement à [B-M] prop. 6.8 p.35, [T2] complément 1) et [Loj]. Ce résultat peut être étendu au cas d'un corps de caractéristique zéro muni d'une valeur absolue non triviale en procédant comme ci-dessus. Les inégalités de 1.2) qui nous ont été inspirées par [T1] sont les analogues pour le Jacobien de ces inégalités.

Signalons pour terminer le corollaire immédiat.

Corollaire 4.8

Soient k un corps algébriquement clos, de caractéristique zéro, muni d'une valeur absolue non triviale $|\cdot| : k \rightarrow [0, \infty[$ et \mathcal{O}_n l'anneau des germes de séries convergentes en n variables (z_1, \dots, z_n) .

1) Soit $f \in \mathcal{O}_n$, $f(0) = 0$. Alors f est à singularité isolée à l'origine si et seulement si son Hessien $H_Z(f)$ n'appartient pas à l'idéal jacobien de f .

2) Soit $f \in \mathcal{O}_n$, $f(0) = 0$ à singularité isolée à l'origine. Alors f est, à changement de variables près, égale à une singularité du type $z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_n^k$, $k \geq 2$, si et seulement si son idéal jacobien est intégralement clos.

Preuve :

1) est la traduction directe au cas considéré des résultats de 3). 2) Les singularités du type considéré ont bien évidemment un idéal jacobien intégralement clos. Réciproquement, soit $\mathcal{H}_Z(f)$ la matrice Hessienne de f . Soit m le rang de $\mathcal{H}_Z(f)$ en 0. Si $n - m \geq 2$ alors $H_Z(f)$ est dans la clôture intégrale de l'idéal $(\partial f / \partial z_1, \dots, \partial f / \partial z_n)$. Par conséquent si celui-ci était intégralement clos on aurait $H_Z(f) \in (\partial f / \partial z_1, \dots, \partial f / \partial z_n)$. Ceci est absurde en vertu du 1) et de l'hypothèse de singularité isolée. Donc la seule possibilité pour que l'idéal jacobien de f soit intégralement clos est que le rang m de $\mathcal{H}_Z(f)$ en zéro satisfasse $n - m < 2$. Par suite $m \geq n - 1$. Ceci implique que f est du type proposé, en vertu du lemme de Morse à paramètres (c.f. [A-G-V] p.187). \square

BIBLIOGRAPHIE

[A-G-V] V.I. ARNOLD, S.M. GUSEIN-SAIDE, A.N. VARSCHENKO, *Singularities of differentiable Maps, vol 1*, Monographs in Mathematics vol. 82, Birkhäuser 1985.

[B1] N. BOURBAKI, *Algèbre Chapitre 1 à 3*, nouvelle édition Hermann 1970.

[B2] N. BOURBAKI, *Algèbre commutative chap.1 à 7*, Hermann 1961.

[B3] N. BOURBAKI, *Algèbre commutative chap. 10*, Masson 1998.

[B-G-R] S. BOSCH, U. GERRITZEN, R. REMMERT, *Archimedean Analysis, A systematic Approach to Rigid Analytic Geometry*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 261, Springer 1984.

[B-H1] J.Y. BOYER, M. HICKEL, *Une généralisation de la loi de Transformation pour les résidus*, Bull. Soc. Math. France **125**, (1997), 315-335.

[B-H2] J.Y. BOYER, M. HICKEL, *Extension dans un cadre algébrique d'une Formule de Cauchy-Weil*, Manuscripta Mathematica **98**, (1999), 195-223.

[B-M] E. BIERSTONE, P.D. MILMAN, *Semianalytic and Subanalytic Sets*, Pub. Math. I.H.E.S. **67**, (1988), 1-42.

- [BO] J. Y. BOYER, *Comparaison de différentes approches des résidus et applications*, Thèse de l'université Bordeaux 1, Février 1999.
- [B-Y] C.A. BERENSTEIN, A. YGER, *Analytic residue theory in the non-complete intersection case*, J. Reine angew. Math. **527** (2000), 203-235.
- [E] D. EISENBUD, *Commutative algebra with a view toward algebraic geometry*, Graduate Texts in Mathematics n° 150, Springer-verlag.
- [Hi] M. HICKEL, *Une remarque à propos du Jacobien de n fonctions holomorphes à l'origine de \mathbb{C}^n* , accepté pour publication à Ann. Pol. Math. 20 Mars 2000, retiré de la publication par l'auteur en Juin 2000.
- [H-I-O] M. HERMAN, S. IKEDA, U. ORBANZ, *Equimultiplicity and blowing up, an algebraic study with an appendix by B. MOONEN*, Springer 1988.
- [H-K] R. HUEBL, E. KUNZ, *Integration of differential forms on schemes*, J. Reine Angew. Math. **410** (1990), 53-83.
- [H-S] C. HUNEKE-I. SWANSON, *Integral Closure of ideals, Rings, and Modules*, London Mathematical Society Lecture Note Series n° 336, Cambridge University Press 2006.
- [L] J. LIPMAN, *Residues and traces of differential forms via Hochschild homology*, Contemporary Mathematics, vol. 61, American Mathematical Society, Providence-Rhode-island.
- [Lo] S. LOJASIEWICZ, *Ensembles semi-analytiques*, Pub. Math. I.H.E.S. 1964.
- [L-T] M. LEJEUNE-B. TEISSIER, *Clôture intégrale des idéaux et équisingularité*, Séminaire Lejeune-Teissier, Centre de Mathématiques de l'école polytechnique 1974, Publications Université Scientifique et Médicale de Grenoble.
- [M] H. MATSUMURA, *Commutative Ring theory*, Cambridge studies in mathematics 8, 1986.
- [N] E. NETTO, *Vorlesungen über algebra*, vol. 2, Leipzig, Teubner 1900.
- [P] A. PLOSKI, *Question orale lors du colloque Effectivity problems algebraic and analytic methods*, University of Calabria, 22-28 Juin 98.
- [N.R] D.G. NORTHCOTT-D. REES, *Reduction of ideals in local rings*, Proc. Cambridge Phil. Soc., **50** 2 (1954), 145-158.
- [R] D. REES, *Lectures on the asymptotic theory of ideals*, London Mathematical lecture notes series 113, Cambridge University Press.
- [S] S. SPODZIEJA, *On some property of the jacobian of a homogeneous polynomial mapping*, Bull. Soc. Sci et Lettres de Lodz, Vol XXXIX, 5 (1989), 1-5.
- [S-S] G. SCHEJA, U. STÖRCH, *Über spurfunktionen bei vollständigen durchschnitten*, J. Reine angew. Math. **278/279** (1975), 174-190.
- [T1] B. TEISSIER, *Cycles évanescents, sections planes et conditions de Whitney*, Astérisque 7 et 8, (1973), 285-362.

- [T2] B. TEISSIER, *Sept compléments au séminaire Lejeune-Teissier*, à paraître dans Ann. Fac. Sci. Toulouse.
- [W1] W.V. VASCONCELOS, *The top of a system of equations*, Bol. Soc. Mat. Mexicana (issue dedicated to José Adem), **37** (1992), 549-556.
- [W2] W.V. VASCONCELOS, *Arithmetic of Blowup Algebra*, London Mathematical Lecture Note Series n° 195, Cambridge University Press, 1994.
- [W3] W.V. VASCONCELOS, *Computational Methods in Commutative Algebra and Algebraic Geometry*, Algorithms and computation in mathematics volume 2, Springer-Verlag 1997.

Michel HICKEL,
Université Bordeaux 1, I.M.B.
Equipe d'Analyse et Géométrie
et I.U.T. Bordeaux 1 département Informatique
33405 Talence Cedex, France
email : hickel@math.u-bordeaux1.fr