

Tabăra de pregătire a lotului național de informatică

Botoșani, 30 aprilie – 5 mai 2012



Baraj 2- Juniori

Descrierea soluției - desc

Autor: prof. Ciprian Chesca

Grup Școlar "Costin Nenițescu" Buzău

Varianta 1 (backtracking)

Pentru un număr prim p fixat, se utilizează metoda backtracking pentru a genera toate subșirurile crescătoare de exponenți care conduc prin ridicare la putere și însumare la numărul n .

În prealabil se precalculează numărul maxim al unui exponent care poate apărea într-o descompunere $n(p)$, în funcție de datele problemei ($n < 10000001$).

Spre exemplu, 2 poate apărea la maxim puterea 23 într-o descompunere $n(2)$, 3 la maxim puterea 14, etc...).

Această variantă asigură aproximativ 15% din punctaj.

Varianta 2 (backtracking + baze de numeratie)

Se observă că pentru $p=2$ descompunerea $n(2)$ reprezintă de fapt transformarea numărului n din baza 10 în baza 2. Făcând această observație și asociind cu faptul că varianta cu backtracking necesită pentru $p=2$ o înălțime a stivei maximă cât și cele mai multe valori posibile pe stivă (cu alte cuvinte pentru $p=2$ varianta cu backtracking este cea mai nefavorabilă ca timp de execuție) se alege o metodă hibridă între varianta 1 și transformarea din baza 10 în baza 2 pentru $p=2$.

Această metodă asigură aproximativ 40-50% din punctaj.

Varianta 3 (Greedy)

Pentru un număr prim p fixat se determina factorul maxim f pentru care $p^f < n$. Se memorează acest factor și apoi se reia procesul după ce am scăzut din n pe p^f . Se păstrează acele descompuneri la care toți factorii sunt distincți.

Tabăra de pregătire a lotului național de informatică

Botoșani, 30 aprilie – 5 mai 2012



Baraj 2- Juniori

Varianta 4 (Greedy)

Pentru un număr prim p fixat ecuația

$p^{x_1} + p^{x_2} + \dots + p^{x_k} = n$ poate fi rezolvată astfel :

În membrul stâng se dă factor comun p la $\min\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ iar membrul drept se descompune ca un produs de p la puterea w și un număr m . Fie $t = \min\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$

Ecuația devine : $p^t(p^{x_1-t} + p^{x_2-t} + \dots + p^{x_k-t}) = p^w m$

De aici putem concluziona că t este chiar w deoarece p este prim, (atenție că t poate fi și 0) și ecuația se transformă mai departe într-o ecuație identică, după ce din numărul m scădem 1, deoarece unul dintre termenii din paranteză are exponent 0. Este rezolvată în acest fel și ordinea crescătoare a factorilor deoarece un exponent se calculează ca suma dintre un număr natural și factorul precedent.

Această abordare este mai eficientă decât abordările anterioare din punctul de vedere a timpului de execuție și asigură 50% din punctaj.

Varianta 5 (Greedy + optimizare matematică)

Se poate demonstra matematic că nu poate exista o descompunere $n(p)$ pentru care $\sqrt{n} < p < n-1$. Cu această observație se generează numere prime $\leq \sqrt{n}$ și apoi se mai adaugă în vectorul de numere prime, dacă este cazul, $n-1$ sau n . Se continuă apoi rezolvarea utilizând ideea de la varianta 4.

Această abordare este mai eficientă decât toate abordările anterioare din punctul de vedere a timpului de execuție și asigură 100% din punctaj.