



HAL
open science

Clôture intégrale et opérations de tores algébriques de complexité un dans les variétés affines

Kevin Langlois

► **To cite this version:**

Kevin Langlois. Clôture intégrale et opérations de tores algébriques de complexité un dans les variétés affines. 2012. hal-00666843v2

HAL Id: hal-00666843

<https://hal.science/hal-00666843v2>

Preprint submitted on 25 Jun 2012 (v2), last revised 7 Nov 2013 (v3)

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Clôture intégrale et opérations de tores algébriques de complexité un dans les variétés affines

Kevin Langlois

Abstract In this paper, we are interested in multigraded affine algebras of complexity 1. One of the main results gives a description of integrally closed homogeneous ideals in terms of polyhedral divisors introduced by Altmann-Hausen. Another important result allows us to compute effectively the normalization of an affine variety with an algebraic torus action of complexity one. We describe as well the integral closure of homogeneous ideals and exhibit new examples of normal homogeneous ideals.

Introduction

In this paper, we are interested in multigraded affine algebras of complexity 1 over an algebraically closed field \mathbf{k} of characteristic zero.

Using the convex geometry developed by Altmann-Hausen we obtain some new results on classical questions of commutative algebra. One of our main theorem gives a description of integrally closed homogeneous ideals in terms of polyhedral divisors, see Theorem 4.6. Another important result allows us to compute effectively the normalization of an affine variety with an algebraic torus action of complexity one. We describe as well the integral closure of homogeneous ideals, see Theorem 2.4, Theorem 4.6 and exhibit new examples of normal homogeneous ideals, see Theorem 5.3.

The following two classical examples illustrate well our problematic. Consider the algebra of Laurent polynomials in n variables

$$L_{[n]} = L_{[n]}(\mathbf{k}) := \mathbf{k} [t_1, t_1^{-1}, t_2, t_2^{-1}, \dots, t_n, t_n^{-1}].$$

Notice that $L_{[n]}$ is the coordinate ring of the affine variety $(\mathbf{k}^*)^n$. Let A be a subalgebra generated by a finite number of monomials, and let $E \subset \mathbb{Z}^n$ be the subset of exponents corresponding to the monomials of A . It is known [Ho] that the normalisation of A is the set of linear combinations of all monomials with their exponents belonging to the rational cone $\omega \subset \mathbb{Q}^n$ generated by E . We have

$$\bar{A} = \bigoplus_{(m_1, \dots, m_n) \in \omega \cap \mathbb{Z}^n} \mathbf{k} t_1^{m_1} \dots t_n^{m_n}$$

where \bar{A} is the normalization of A . For instance, if $n = 1$ and if A is the subalgebra generated by the monomials t_1^2 and t_1^3 then the normalization of A is the polynomial ring $\mathbf{k}[t_1]$.

A similar problem arises for monomial ideals. Assume that the algebra A is normal. Let I be an ideal of A generated by monomials. The convex hull in \mathbb{Q}^n of all exponents appearing in I is a polyhedron P

contained in ω . This polyhedron P is invariant by translations of ω . The integral closure of I is equal to

$$\bar{I} = \bigoplus_{(m_1, \dots, m_n) \in P \cap \mathbb{Z}^n} \mathbf{k} t_1^{m_1} \dots t_n^{m_n}.$$

We can determine P by means of a finite system of monomials generating the ideal I . For instance, if $n = 2$, $A = \mathbb{C}[t_1, t_2]$ and if I is the ideal generated by the monomial t_1^3 and t_2^3 then

$$\bar{I} = (t_1^3, t_1^2 t_2, t_1 t_2^2, t_2^3).$$

See [LeTe], [HS], [Va] for more details concerning integral closure of ideals. Note that the study of integrally closed ideals is important in order to find the normalization of a blowing-up (see [KKMS] for toric varieties and [Br] for spherical varieties). This is important as well in order to describe (\mathbb{T} -equivariant) affine modifications (see [KZ], [Du]).

By analogy with the monomial case presented above, we address more generally the actions of algebraic tori of complexity 1. Before formulating our results, let us recall some notation.

An algebraic torus \mathbb{T} of dimension n is an algebraic group isomorphic to $(\mathbf{k}^\star)^n$. Let M be the character lattice of \mathbb{T} , and let A be an affine algebra over \mathbf{k} . Defining an algebraic action of \mathbb{T} on $X = \text{Spec } A$ is the same as defining an M -grading of A . The complexity of the affine M -graded algebra A is the codimension of a generic \mathbb{T} -orbit in X . In the toric case, the algebra A admits a natural \mathbb{Z}^n -grading given by monomials. The corresponding action of $(\mathbf{k}^\star)^n$ on X has complexity 0.

The purpose of this paper is to answer the following questions : given an affine M -graded algebra A of complexity 1 over \mathbf{k} and homogeneous elements $a_1, \dots, a_r \in A$ such that

$$A = \mathbf{k}[a_1, \dots, a_r],$$

can one describe explicitly the normalization of A in terms of the generators a_1, \dots, a_r ? Furthermore if A is normal and if I is a homogenous ideal in A , can one describe effectively the integral closure of I in terms of a given finite system of homogeneous generators of I ? There exists a connexion between these two questions. Indeed the answer to the second can be deduced from that to the first by examining the normalization of the Rees algebra $A[It]$ corresponding to I . See [Ri] for more details.

To answer the first question, it is useful to attach an appropriate combinatorial object to a given normal M -graded algebra A . For instance, in the monomial case if A is normal then the rational cone ω allows us to reconstruct A .

Recall that a \mathbb{T} -variety is a normal variety endowed with an effective algebraic \mathbb{T} -action. Toric varieties are \mathbb{T} -varieties of complexity zero. There exists several combinatorial descriptions of affine \mathbb{T} -varieties. See [De], [AH] for arbitrary complexity, [KKMS], [Ti] for complexity one and [FZ] for the case of surfaces. Note that the description of [AH] is generalized in [AHS] for non-affine \mathbb{T} -varieties. See also the survey article [AOPSV] for applications of the theory of \mathbb{T} -varieties.

In this paper, we use the point of view of [AH] and [Ti]. To simplify things we assume that $M = \mathbb{Z}^n$ and $\mathbb{T} = (\mathbf{k}^\star)^n$. An affine \mathbb{T} -variety $X = \text{Spec } A$ of complexity 1 can be described by its weight cone $\omega \subset \mathbb{Q}^n$ and by a polyhedral divisor \mathfrak{D} on a smooth algebraic curve C , whose coefficients are polyhedra in \mathbb{Q}^n . For any element $m = (m_1, \dots, m_n)$ of $\omega \cap \mathbb{Z}^n$, we have an evaluation $\mathfrak{D}(m)$ belonging to the \mathbb{Q} -linear space of rational Weil divisors on C . Given a combinatorial data $(\omega, C, \mathfrak{D})$ one can construct an M -graded algebra

$$A[C, \mathfrak{D}] := \bigoplus_{m \in \omega \cap M} H^0(C, \mathcal{O}_C([\mathfrak{D}(m)])) \chi^m,$$

where χ^m is the Laurent monomial $t_1^{m_1} \dots t_n^{m_n}$. See [AH] for definitions and specific statements. One of the main results of this paper can be stated as follows (see Theorem 2.4).

Theorem. *Let C be a smooth algebraic curve. Consider a subalgebra*

$$B = \mathbf{k}[C][f_1\chi^{s_1}, \dots, f_r\chi^{s_r}] \subset L_{[n]}(\mathbf{k}(C)) := \mathbf{k}(C)[t_1, t_1^{-1}, \dots, t_n, t_n^{-1}]$$

such that

$$\text{Frac } B = \text{Frac } L_{[n]}(\mathbf{k}(C)),$$

where $s_i \in \mathbb{Z}^n$, χ^{s_i} is the corresponding Laurent monomial, and $f_i \in \mathbf{k}(C)^*$. Then the normalization of B is the algebra $A[C, \mathfrak{D}]$ with its weight cone ω generated by s_1, \dots, s_r and with the following coefficient of the polyhedral divisor \mathfrak{D} at the point $z \in C$:

$$\Delta_z = \{ v \in \mathbb{Q}^n, \langle s_i, v \rangle \geq -\nu_z(f_i), i = 1, \dots, r \},$$

where $\nu_z(f_i)$ is the order of f_i at z .

This theorem answers the first question. It generalizes well known results for the case of affine surfaces with \mathbf{k}^* -actions [FZ, 3.9, 4.6].

The answer to the second question is given by Theorem 4.2. It is known that the set of integrally closed homogeneous ideals of the affine toric variety with weight cone ω is in bijective correspondence with the set of integral ω -polyhedra contained in ω (see section 3). We provide a similar correspondence for integrally closed homogeneous ideals on affine \mathbb{T} -variety of complexity 1 (see Theorem 4.6).

Any integrally closed homogeneous ideal I of an affine \mathbb{T} -variety $X = \text{Spec } A$ of complexity 1 can be described by means of a pair $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ where P is an integral polyhedron in \mathbb{Q}^n . This polyhedron plays the same role as the Newton polyhedron does in the monomial case. The polyhedral divisor $\tilde{\mathfrak{D}}$ corresponds to the normalization of the Rees algebra of I . We give a geometrical interpretation of the coefficients of $\tilde{\mathfrak{D}}$. Assume for instance that the weight cone of A is strongly convex, and let $\tilde{\Delta}_z$ be the coefficient of $\tilde{\mathfrak{D}}$ at a point $z \in C$. Then Theorem 4.6 provides conditions on the equations of facets of $\tilde{\Delta}_z$ of codimension 1 so that $\tilde{\mathfrak{D}}$ corresponds to the normalization of the Rees algebra $A[It]$.

Recall that I is said to be normal if for any positive integer e , the ideal I^e is integrally closed. If A is normal then this condition is equivalent to the normality of the algebra $A[It]$. We provide as well sufficient conditions on $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ in order that I were normal (see Theorem 5.3). For the case of non-elliptic affine \mathbf{k}^* -surfaces, we obtain a combinatorial proof for the normality of any integrally closed invariant ideals of such surfaces. As another application, we obtain the following new criterion of normality which generalizes Reid-Roberts-Vitulli's Theorem [RRV, 3.1] in the case of complexity 0 (see 5.5).

Theorem. *Let $n \geq 1$ be an integer and let $\mathbf{k}^{[n+1]} = \mathbf{k}[x_0, \dots, x_n]$ be the algebra of polynomials in $n + 1$ variables over \mathbf{k} . We endow $\mathbf{k}^{[n+1]}$ with the \mathbb{Z}^n -grading given by*

$$\mathbf{k}^{[n+1]} = \bigoplus_{m=(m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{N}^n} A_m, \text{ where } A_m = \mathbf{k}[x_0] x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n}.$$

For a homogeneous ideal I of $\mathbf{k}^{[n+1]}$ the following are equivalent.

- (i) The ideal I is normal;
- (ii) For any $e \in \{1, \dots, n\}$, the ideal I^e is integrally closed.

Let us give a brief summary of the contents of each section. In the first section, we recall some notions on tori actions of complexity 1 and on polyhedral divisors of Altmann-Hausen. In second section, we treat the normalization problem for multigraded algebras and show Theorem 2.4. The third section focuses on integrally closed monomial ideals. In section 4, we study the description by the pair $(P, \tilde{\mathcal{D}})$ for integrally closed homogeneous ideals of affine \mathbb{T} -varieties. Finally, in the last section, we discuss the problem of normality in a particular class.

Throughout this paper \mathbf{k} is an algebraically closed field of characteristic zero. By a variety we mean an integral separated scheme of finite type over \mathbf{k} .

Acknowledgments : The author is grateful to Mikhail Zaidenberg for his permanent encouragement and for posing the problem of section 2. We thank also Ronan Terpereau and Mateusz Michalek for useful discussions.

1 \mathbb{T} -variétés affines de complexité un et géométrie convexe

Nous rappelons ici les notions basiques sur les opérations de tores algébriques dont nous aurons besoin par la suite.

1.1. Soit N un réseau de rang n et $M = \text{Hom}(N, \mathbb{Z})$ son réseau dual. On note $N_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} N$ et $M_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} M$ les \mathbb{Q} -espaces vectoriels duaux associés. Au réseau M , on associe un tore algébrique \mathbb{T} de dimension n dont son algèbre des fonctions régulières est définie par

$$\mathbf{k}[\mathbb{T}] = \bigoplus_{m \in M} \mathbf{k} \chi^m,$$

la famille $(\chi^m)_{m \in M}$ satisfaisant les relations $\chi^m \cdot \chi^{m'} = \chi^{m+m'}$, pour tous $m, m' \in M$. Le choix d'une base de M donne un isomorphisme entre $\mathbf{k}[\mathbb{T}]$ et l'algèbre des polynômes de Laurent à n variables. Chaque fonction χ^m s'interprète comme un caractère de \mathbb{T} .

1.2. Soit X une variété affine et supposons que \mathbb{T} opère algébriquement dans X . Alors cela induit une opération de \mathbb{T} dans $A := \mathbf{k}[X]$ définie par $(t \cdot f)(x) = f(t \cdot x)$ avec $t \in \mathbb{T}$, $f \in \mathbf{k}[X]$ et $x \in X$, faisant de A un \mathbb{T} -module rationnel. Le \mathbb{T} -module A admet une décomposition $A = \bigoplus_{m \in M} A_m$ en somme directe de sous-espaces vectoriels où pour tout $m \in M$,

$$A_m = \{f \in A \mid \forall t \in \mathbb{T}, t \cdot f = \chi^m(t)f\}.$$

L'algèbre A est ainsi munie d'une M -graduation. Réciproquement, toute M -graduation de la \mathbf{k} -algèbre A est obtenue par une opération algébrique de \mathbb{T} dans $X = \text{Spec } A$. La partie

$$S := \{m \in M \mid A_m \neq \{0\}\}$$

de M contenant 0 et stable par l'addition est appelée *semi-groupe des poids* de A . Puisque A est de type fini sur \mathbf{k} , l'ensemble S engendre un cône polyédral $\omega \subset M_{\mathbb{Q}}$ dit *cône des poids* de A .

L'opération de \mathbb{T} dans X est fidèle si et seulement si S n'est pas contenu dans un sous-réseau propre de M . Dans ce cas, le cône ω est de dimension n et il existe un unique cône polyédral saillant $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$ tel que

$$\omega = \{m \in M_{\mathbb{Q}} \mid \forall v \in \sigma, m(v) \geq 0\}.$$

On dit que ω est le *cône dual* de σ . On le note σ^\vee . Une \mathbb{T} -variété est une variété normale munie d'une opération algébrique fidèle de \mathbb{T} .

1.3. Nous appelons *complexité* de l'opération de \mathbb{T} dans $X = \text{Spec } A$, le degré de transcendance de l'extension de corps $\mathbf{k}(X)^\mathbb{T}/\mathbf{k}$. La complexité s'interprète géométriquement comme la codimension d'une orbite en position générale. Lorsque l'opération est fidèle, elle est égale à $\dim X - \dim \mathbb{T}$. Elle fût introduite dans [LV] pour les opérations de groupes algébriques réductifs dans les espaces homogènes.

Les \mathbb{T} -variétés affines de complexité 0 sont les *variétés toriques affines*. Elles admettent une description bien connue en terme de cônes polyédraux saillants. Pour plus d'informations, voir [CLS], [Da], [Fu], ainsi que [Od].

Etant donné un sous-semi-groupe $E \subset M$ et un corps K_0 , nous notons

$$K_0[E] = \bigoplus_{m \in E} K_0 \chi^m.$$

l'algèbre du semi-groupe E sur le corps K_0 . Pour tout cône polyédral $\tau \subset M_\mathbb{Q}$, nous écrivons $\tau_M := \tau \cap M$.

Nous rappelons une description combinatoire des \mathbb{T} -variétés affines de complexité 1 obtenue dans [AH], [Ti]. Voir [FZ] pour la présentation de Dolgachev-Pinkham-Demazure (*D.P.D.*) des \mathbb{C}^* -surfaces affines complexes. Notons que l'approche donnée dans [Ti] provient d'une description antérieure des opérations de groupes algébriques réductifs de complexité 1 [Ti 2]. Dans [Vo], on donne un lien entre [AH] et la description classique de [KKMS].

1.4. Soit C une courbe algébrique lisse et $\sigma \subset N_\mathbb{Q}$ un cône polyédral saillant. Une partie $\Delta \subset N_\mathbb{Q}$ est un σ -polyèdre si Δ est somme de Minkowski de σ et d'un polytope $Q \subset N_\mathbb{Q}$. On note $\text{Pol}_\sigma(N_\mathbb{Q})$ le semi-groupe abélien des σ -polyèdres de loi la somme de Minkowski et d'élément neutre σ .

Pour $\Delta \in \text{Pol}_\sigma(N_\mathbb{Q})$, on définit la fonction $h_\Delta : \sigma^\vee \rightarrow \mathbb{Q}$ par $h_\Delta(m) = \min_{v \in \Delta} m(v)$, pour tout $m \in \sigma^\vee$. On dit que h_Δ est la *fonction de support* de Δ . Elle est identiquement nulle si et seulement si $\Delta = \sigma$. Pour tous $m, m' \in \sigma^\vee$, on a l'inégalité de sous-additivité

$$(1) \quad h_\Delta(m) + h_\Delta(m') \leq h_\Delta(m + m').$$

Un *diviseur σ -polyédral* sur C est une somme formelle

$$\mathfrak{D} = \sum_{z \in C} \Delta_z \cdot z$$

où chaque Δ_z appartient à $\text{Pol}_\sigma(N_\mathbb{Q})$ avec pour presque¹ tout $z \in C$, $\Delta_z = \sigma$. On note $\text{supp}(\mathfrak{D})$, dit *support* de \mathfrak{D} , l'ensemble des points $z \in C$ tels que $\Delta_z \neq \sigma$. On dit que \mathfrak{D} est *propre* lorsque pour tout $m \in \sigma_M^\vee$, l'évaluation

$$\mathfrak{D}(m) := \sum_{z \in C} h_{\Delta_z}(m) \cdot z$$

est un \mathbb{Q} -diviseur semi-ample et abondant (big) pour m appartenant à l'intérieur relatif de σ^\vee .

1. Cela signifie qu'il existe un sous-ensemble fini $F \subset C$ tel que pour tout $z \in C - F$, $\Delta_z = \sigma$.

1.5. La propriété de \mathfrak{D} est décrite en distinguant les deux cas suivants [AH, 2.12].

- (i) Lorsque C est une courbe projective lisse, le diviseur polyédral \mathfrak{D} est propre si et seulement si pour tout vecteur $m \in \sigma_M^\vee$, on a $\deg(\mathfrak{D}(m)) \geq 0$ et si $\deg(\mathfrak{D}(m)) = 0$ alors m appartient au bord de σ^\vee et un multiple de $\mathfrak{D}(m)$ est principal ;
- (ii) Lorsque C est une courbe affine lisse, aucune condition n'est imposée sur l'évaluation de \mathfrak{D} .

Notation 1.6. D'après l'inégalité (1) dans 1.4, si \mathfrak{D} est un diviseur σ -polyédral sur C alors pour tous vecteurs $m, m' \in \sigma_M^\vee$, l'application

$$H^0(C, \mathcal{O}_C([\mathfrak{D}(m)])) \times H^0(C, \mathcal{O}_C([\mathfrak{D}(m')])) \rightarrow H^0(C, \mathcal{O}_C([\mathfrak{D}(m+m')])), (f, g) \mapsto f \cdot g$$

est bien définie. Le \mathbb{T} -module

$$A[C, \mathfrak{D}] := \bigoplus_{m \in \sigma_M^\vee} H^0(C, \mathcal{O}_C([\mathfrak{D}(m)])) \chi^m,$$

est donc une algèbre M -graduée. On la notera $A[\mathfrak{D}]$ lorsque la mention de C est claire. Pour tout élément homogène $f \chi^m$ de $\mathbf{k}(C)[M]$, nous sous-entendons que $f \in k(C)^\star$ et que χ^m est un caractère du tore \mathbb{T} .

Le théorème suivant décrit les algèbres affines normales M -graduées de complexité 1 et de cône des poids σ^\vee (voir [AH], [Ti]).

- Théorème 1.7.** (i) Si \mathfrak{D} est un diviseur σ -polyédral propre sur une courbe algébrique lisse C alors l'algèbre multigradée $A = A[C, \mathfrak{D}]$ est normale, de type fini sur \mathbf{k} et sa M -gradation fait de $X = \text{Spec } A$ une \mathbb{T} -variété de complexité 1 ;
- (ii) Inversement, toute sous-algèbre multigradée $A \subset \mathbf{k}(C)[M]$ normale, de type fini sur \mathbf{k} , satisfaisant $A_0 = \mathbf{k}[C]$, de même corps des fractions que A et ayant σ^\vee pour cône des poids, est égale à $A[C, \mathfrak{D}]$ pour un unique diviseur σ -polyédral \mathfrak{D} propre sur C .

Notation 1.8. Si \mathfrak{D} est un diviseur polyédral propre sur C alors on note par $X[C, \mathfrak{D}]$ la \mathbb{T} -variété affine $\text{Spec } A[C, \mathfrak{D}]$ correspondante.

L'assertion suivante est connue [AH, §8], [Li, Theorem 1.4(3)]. Elle permet de comparer deux données combinatoires $(C, \sigma, \mathfrak{D})$ et $(C', \sigma', \mathfrak{D}')$ donnant des \mathbf{k} -algèbres M -graduées isomorphes.

Théorème 1.9. Soient C, C' des courbes algébriques lisses et $\mathfrak{D}, \mathfrak{D}'$ des diviseurs polyédraux propres respectivement sur C, C' selon des cônes polyédraux saillants $\sigma, \sigma' \subset N_{\mathbb{Q}}$. Alors $X[C, \mathfrak{D}]$ et $X[C', \mathfrak{D}']$ sont \mathbb{T} -isomorphes si et seulement si il existe un automorphisme de réseau $F : N \rightarrow N$ tel que² $F_{\mathbb{Q}}(\sigma) = \sigma'$, un isomorphisme $\phi : C \rightarrow C'$ de courbes algébriques, $v_1, \dots, v_r \in N$ et $f_1, \dots, f_r \in k(C)^\star$ des fonctions rationnelles non nulles tels que pour tout $m \in \sigma_M^\vee$,

$$\phi^*(\mathfrak{D}')(m) = F_*(\mathfrak{D})(m) + \sum_{i=1}^r m(v_i) \cdot \text{div}(f_i)$$

avec

$$\mathfrak{D} = \sum_{z \in C} \Delta_z \cdot z, \quad \mathfrak{D}' = \sum_{z' \in C'} \Delta'_{z'} \cdot z', \quad \phi^*(\mathfrak{D}') = \sum_{z' \in C'} \Delta'_{z'} \cdot \phi^{-1}(z') \quad \text{et} \quad F_*(\mathfrak{D}) = \sum_{z \in C} (F_{\mathbb{Q}}(\Delta_z) + \sigma) \cdot z.$$

2. Un automorphisme de réseau $F : N \rightarrow N$ induit un automorphisme de l'espace vectoriel $N_{\mathbb{Q}}$ que l'on note $F_{\mathbb{Q}}$.

Dans la proposition suivante, on montre que la fonction de support d'un σ -polyèdre est linéaire par morceaux.

Proposition 1.10. *Soit $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$ un cône polyédral saillant, $\Delta \in \text{Pol}_{\sigma}(N_{\mathbb{Q}})$ un polyèdre et $S \subset \Delta$ une partie non vide. Notons $V(\Delta)$ l'ensemble des sommets de Δ . Alors $\Delta = \text{Conv}(S) + \sigma$ si et seulement si pour tout $m \in \sigma^{\vee}$, $h_{\Delta}(m) = \min_{v \in S} m(v)$. En particulier, pour tout $m \in \sigma^{\vee}$, on a $h_{\Delta}(m) = \min_{v \in V(\Delta)} m(v)$.*

Démonstration. Supposons que $\Delta = \text{Conv}(S) + \sigma$. Si $v_1, \dots, v_r \in S$, $c \in \sigma$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ tels que $\sum_{i=1}^r \lambda_i = 1$, alors pour tout $m \in \sigma^{\vee}$,

$$m \left(c + \sum_{i=1}^r \lambda_i v_i \right) \geq \min_{1 \leq i \leq r} m(v_i) \geq \min_{v \in S} m(v).$$

Donc pour tout $m \in \sigma^{\vee}$, on a $h_{\Delta}(m) \geq \min_{v \in S} m(v)$ et puisque $S \subset \Delta$, il vient $h_{\Delta}(m) = \min_{v \in S} m(v)$. Réciproquement, notons $\Delta' := \text{Conv}(S) + \sigma$. Comme $S \subset \Delta'$, on a pour tout $m \in \sigma^{\vee}$,

$$h_{\Delta}(m) = \min_{v \in S} m(v) \geq h_{\Delta'}(m)$$

et puisque $\Delta' \subset \Delta$, $h_{\Delta} = h_{\Delta'}$. Donc par [AH, Proposition 1.5], $\Delta = \Delta'$. Pour la seconde affirmation, comme σ est saillant, $V(\Delta)$ est non vide. Puisque $\Delta = \text{Conv}(V(\Delta)) + \sigma$, on peut conclure. \square

La terminologie suivante est classique pour les \mathbb{C}^* -surfaces affines complexes [FZ]. Elle est introduite dans [Li] pour les \mathbb{T} -variétés affines de complexité 1.

Définition 1.11. Soit X une variété affine. Une opération algébrique de \mathbb{T} de complexité 1 dans X est dite *elliptique* si l'algèbre multigradué correspondante

$$A = \mathbf{k}[X] = \bigoplus_{m \in M} A_m \quad \text{avec} \quad A_m = \{f \in A \mid \forall t \in \mathbb{T}, t \cdot f = \chi^m(t)f\}$$

vérifie $A_0 = \mathbf{k}$. Dans ce cas, on dit que l'algèbre M -gradué A est elliptique.

Remarque 1.12. Considérons $A = A[C, \mathfrak{D}]$. Alors A est elliptique si et seulement si C est projective. L'ellipticité de A donne des contraintes géométriques sur la variété $X = \text{Spec} A$. En effet, si C est affine alors X est toroïdale [KKMS] et n'admet donc que des singularités toriques. Tandis que lorsque C est projective de genre $g \geq 1$, la variété X a au moins une singularité qui n'est pas rationnelle [LS, Propositions 5.1, 5.5].

La proposition suivante peut être vue comme une généralisation de [FZ, Lemma 1.3(a)].

Proposition 1.13. *Soit X une \mathbb{T} -variété affine de complexité 1 et notons $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$ le dual du cône des poids de l'algèbre multigradué*

$$A = \mathbf{k}[X] = \bigoplus_{m \in M} A_m \quad \text{avec} \quad A_m = \{f \in A \mid \forall t \in T, t \cdot f = \chi^m(t)f\}$$

obtenue par l'opération de \mathbb{T} . Les assertions suivantes sont vraies.

- (i) Si l'opération de \mathbb{T} n'est pas elliptique alors le semi-groupe des poids de $\mathbf{k}[X]$ est σ_M^{\vee} et pour tout $m \in \sigma_M^{\vee}$, le A_0 -module A_m est localement libre de rang 1 ;

- (ii) Si l'opération est elliptique alors $\sigma \neq \{0\}$;
- (iii) L'intersection du sous-ensemble

$$L = \{m \in \sigma_M^\vee \mid A_m \neq \{0\}\} \subset M_{\mathbb{Q}}$$

avec toute droite vectorielle rencontrant l'intérieur relatif de σ^\vee est finie.

Démonstration. Si l'opération de \mathbb{T} n'est pas elliptique alors par le théorème 1.7, on peut supposer qu'il existe une courbe algébrique affine lisse C et un diviseur σ -polyédral propre \mathfrak{D} sur C tels que pour tout $m \in \sigma_M^\vee$,

$$(2) \quad A_m = H^0(C, \mathcal{O}_C(\lfloor \mathfrak{D}(m) \rfloor)) \chi^m \quad \text{et} \quad \mathbf{k}[X] = \bigoplus_{m \in \sigma_M^\vee} A_m.$$

Comme C est affine, pour tout $m \in \sigma_M^\vee$, on a $A_m \neq \{0\}$. D'où l'assertion (i).

Si l'opération est elliptique alors on peut supposer que $\mathbf{k}[X]$ vérifie (2) avec C une courbe projective lisse de genre g . Si $\sigma = \{0\}$ alors $\sigma^\vee = M_{\mathbb{Q}}$ et il existe $m \in \sigma_M^\vee$ tel que $\deg(\mathfrak{D}(m)) > 0$. Donc l'inégalité $\mathfrak{D}(-m) + \mathfrak{D}(m) \leq \mathfrak{D}(0) = 0$ implique $\deg(\mathfrak{D}(-m)) < 0$. Ce qui contredit la propriété de \mathfrak{D} et donne l'assertion (ii).

Soit $m \in \sigma_M^\vee$ appartenant à l'intérieur relatif de σ^\vee . Alors il existe $r_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ tel que pour tout $z \in \text{supp}(\mathfrak{D})$ et tout sommet v de Δ_z , $r_0 v \in N$. Ainsi, par la proposition 1.10,

$$(3) \quad \mathfrak{D}(r_0 m) = \lfloor \mathfrak{D}(r_0 m) \rfloor.$$

Par la propriété de \mathfrak{D} , on peut supposer que

$$\deg(\mathfrak{D}(r_0 m)) = \deg(\lfloor \mathfrak{D}(r_0 m) \rfloor) > d + g - 1$$

où d est le cardinal de $\text{supp}(\mathfrak{D})$. Donc pour tout $r \in \mathbb{N}$,

$$(4) \quad \deg(\lfloor \mathfrak{D}((r_0 + r)m) \rfloor) = \deg(\lfloor \mathfrak{D}(r_0 m) \rfloor) + \deg(\lfloor \mathfrak{D}(rm) \rfloor) \geq \deg(\lfloor \mathfrak{D}(r_0 m) \rfloor) - d > g - 1.$$

Comme $\sigma \neq \{0\}$, la demi-droite $\mathbb{Q}_{\leq 0} \cdot m$ ne rencontre σ^\vee qu'en l'origine [CLS, Exercice 1.2.4]. Par le théorème de Riemann-Roch, (4) donne l'inclusion

$$\mathbb{Q} \cdot m \cap L \subset \{0, m, 2m, \dots, (r_0 - 1)m\}.$$

D'où le résultat. □

Remarque 1.14. Notons $\sigma = \mathbb{Q}_{\geq 0}^2$. L'exemple du diviseur polyédral propre

$$\mathfrak{D} = \Delta_0(0) + \Delta_1(1) + \Delta_\infty(\infty), \quad \Delta_0 = \left(\frac{1}{2}, 0\right) + \sigma, \quad \Delta_1 = \left(-\frac{1}{2}, 0\right) + \sigma, \quad \Delta_\infty = [(1, 0), (0, 1)] + \sigma$$

sur \mathbb{P}^1 montre qu'en général, il existe des demi-droites vectorielles contenues dans le bord de σ^\vee qui rencontrent L avec une infinité de points. En effet, dans cet exemple, pour tout $r \in \mathbb{N}$, on a

$$H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(\lfloor \mathfrak{D}(2r + 1, 0) \rfloor)) \chi^{(2r+1, 0)} = \{0\}.$$

2 Normalisation des algèbres affines multigraduées de complexité un

Le but de cette section est de décrire explicitement la normalisation des algèbres affines multigraduées de complexité 1.

Dans le cas de la complexité 0, toute algèbre affine M -graduée est réalisée comme sous-algèbre \mathbb{T} -stable de $\mathbf{k}[M]$. La normalisation de A est déterminée par son cône des poids [Ho]. Par analogie, toute algèbre affine M -graduée de complexité 1 est plongée dans une algèbre $\mathbf{k}(C)[M]$ où C est une courbe algébrique lisse. Nous rappelons ceci dans le paragraphe suivant.

2.1. Soit $A = \bigoplus_{m \in M} A_m$ une algèbre intègre M -graduée de type fini sur \mathbf{k} . Notons K son corps des fractions. On suppose que $\text{degtr}_{\mathbf{k}} K^{\mathbb{T}} = 1$. Sans perte de généralités, on peut supposer que la M -gradation de A est fidèle. Alors pour tout vecteur $m \in M$,

$$K_m := \{f/g \mid f \in A_{m+e}, g \in A_e, g \neq 0\} \subset K$$

est un sous-espace vectoriel de dimension 1 sur $K_0 = K^{\mathbb{T}}$. Le choix d'une base de M nous permet de construire une famille $(\chi^m)_{m \in M}$ d'éléments de K^* vérifiant pour tous $m, m' \in M$,

$$K_m = K_0 \chi^m \quad \text{et} \quad \chi^m \cdot \chi^{m'} = \chi^{m+m'}.$$

Quitte à remplacer A_0 par \bar{A}_0 , on peut supposer que A_0 est normale. Notons que l'algèbre A_0 est de type fini sur \mathbf{k} . Soit \tilde{C} la courbe complète lisse sur \mathbf{k} obtenue à partir de l'ensemble des valuations discrètes de K_0/\mathbf{k} , de sorte que $K_0 = \mathbf{k}(\tilde{C})$.

Si l'opération de \mathbb{T} dans $X = \text{Spec } A$ n'est pas elliptique alors K_0 est le corps des fractions de A_0 . En effet, si $b \in K_0$ alors b est un élément algébrique sur $\text{Frac } A_0$. Il existe donc $a \in A_0$ non nul tel que ab soit entier sur A_0 . Par normalité de A , on a $ab \in A \cap K_0 = A_0$ et donc $K_0 \subset \text{Frac } A_0$. L'inclusion réciproque est immédiate. Dans tous les cas, il existe un unique ouvert non vide $C \subset \tilde{C}$ tel que

$$A_0 = \mathbf{k}[C] \quad \text{et} \quad A \subset \bigoplus_{m \in M} K_m = \mathbf{k}(C)[M].$$

Par le théorème 1.7, l'égalité $K = \text{Frac } \mathbf{k}(C)[M]$ implique que $\bar{A} = A[C, \mathfrak{D}]$, pour un unique diviseur polyédral propre $\mathfrak{D} = \sum_{z \in C} \Delta_z \cdot z$.

Fixons un système de générateurs homogènes

$$A = \mathbf{k}[C][f_1 \chi^{m_1}, \dots, f_r \chi^{m_r}]$$

avec f_1, \dots, f_r des fonctions rationnelles non nulles sur C et m_1, \dots, m_r des éléments de M . Il s'agit de déterminer les polyèdres Δ_z en fonction de $((f_1, m_1), \dots, (f_r, m_r))$. Dans [FZ], on donne la présentation *D.P.D.* de \bar{A} pour le cas des surfaces affines complexes avec opérations paraboliques et hyperboliques de \mathbb{C}^* . Nous rappelons ces résultats dans le corollaire 2.7.

Le résultat suivant sera utilisé dans la preuve du théorème 2.4.

Lemme 2.2. Soit $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$ un cône polyédral saillant et $\Delta_1, \Delta_2 \in \text{Pol}_{\sigma}(N_{\mathbb{Q}})$ des σ -polyèdres. Alors $\Delta_1 = \Delta_2$ si et seulement si pour tout $m \in \sigma_M^{\vee}$ appartenant à l'intérieur relatif de σ^{\vee} , $h_{\Delta_1}(m) = h_{\Delta_2}(m)$.

Démonstration. Supposons que l'égalité $h_{\Delta_1}(m) = h_{\Delta_2}(m)$ est vraie pour tout $m \in M$ dans l'intérieur relatif de σ^\vee . Soit $m \in \sigma^\vee$ appartenant à l'intérieur relatif. Alors il existe $r \in \mathbb{Z}_{>0}$ tel que $rm \in \sigma_M^\vee$. Donc

$$rh_{\Delta_1}(m) = h_{\Delta_1}(rm) = h_{\Delta_2}(rm) = rh_{\Delta_2}(m),$$

et $h_{\Delta_1}, h_{\Delta_2}$ sont égales sur l'intérieur relatif de σ^\vee . Un argument de topologie donne $h_{\Delta_1} = h_{\Delta_2}$ et par [AH, Proposition 1.5], on a $\Delta_1 = \Delta_2$. La réciproque est facile. \square

Notation 2.3. Soient C une courbe algébrique lisse et $f = (f_1\chi^{m_1}, \dots, f_r\chi^{m_r})$ un r -uplet d'éléments homogènes de $\mathbf{k}(C)[M]$ tels que $\sum_{i=1}^r \mathbb{Q}m_i = M_{\mathbb{Q}}$. Posons $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$ le cône polyédral saillant dual de $\sum_{i=1}^r \mathbb{Q}_{\geq 0}m_i$ et pour tout $z \in C$, considérons $\Delta_z[f] \subset N_{\mathbb{Q}}$ le σ -polyèdre défini par les inégalités

$$m_i \geq -\nu_z(f_i), \quad i = 1, 2, \dots, r.$$

On note $\mathfrak{D}[f]$ le diviseur σ -polyédral $\sum_{z \in C} \Delta_z[f] \cdot z$.

Dans le théorème suivant, nous décrivons la normalisation de l'algèbre A donnée dans 2.1.

Théorème 2.4. *Soient C une courbe algébrique lisse et*

$$A = \mathbf{k}[C][f_1\chi^{m_1}, \dots, f_r\chi^{m_r}] \subset \mathbf{k}(C)[M]$$

une sous-algèbre \mathbb{T} -stable engendrée par des éléments homogènes $f_1\chi^{m_1}, \dots, f_r\chi^{m_r}$. Supposons que A a le même corps des fractions que $\mathbf{k}(C)[M]$ et soit \bar{A} est la normalisation de A , vu comme sous-algèbre de $\mathbf{k}(C)[M]$. Considérons $\mathfrak{D}[f]$ défini comme dans 2.3. Alors le dual σ du cône polyédral $\sum_{i=1}^r \mathbb{Q}_{\geq 0}m_i$ est saillant et $\mathfrak{D}[f]$ est l'unique diviseur σ -polyédral propre sur C vérifiant $\bar{A} = A[C, \mathfrak{D}[f]]$.

Démonstration. D'après [HS, Theorem 2.3.2], la sous-algèbre $\bar{A} \subset \mathbf{k}(C)[M]$ est M -graduée. Puisque A a même corps des fractions que $\mathbf{k}(C)[M]$, le cône σ est saillant. Par le théorème 1.7, il existe un unique diviseur σ -polyédral propre \mathfrak{D} sur C tel que $\bar{A} = A[C, \mathfrak{D}]$. Posons $B := A[C, \mathfrak{D}[f]]$. Alors pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$ et tout $z \in C$, on a l'inégalité

$$h_{\Delta_z[f]}(m_i) \geq -\nu_z(f_i),$$

de sorte que pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$,

$$\mathfrak{D}[f](m_i) = \sum_{z \in C} h_{\Delta_z[f]}(m_i) \cdot z \geq -\text{div}(f_i).$$

On obtient l'inclusion $A \subset B$. Comme B est l'intersection d'anneaux de valuations discrètes de $\text{Frac } B/\mathbf{k}$ [De, §2.7], l'algèbre B est normale. D'où $\bar{A} = A[\mathfrak{D}] \subset B$.

Montrons l'égalité $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}[f]$. Supposons que C est une courbe algébrique projective lisse de genre g . Pour tout $m' \in \sigma_M^\vee$, on a

$$(5) \quad H^0(C, \mathcal{O}_C([\mathfrak{D}(m')])) \subset H^0(C, \mathcal{O}_C([\mathfrak{D}[f](m')])).$$

Soit $m \in \sigma_M^\vee$ appartenant à l'intérieur relatif de σ^\vee . Prenons $s \in \mathbb{Z}_{>0}$ tels que $s\mathfrak{D}(m)$ et $s\mathfrak{D}[f](m)$ soient des diviseurs de Weil à coefficients entiers. Alors par (5), par le théorème de Riemann-Roch et puisque \mathfrak{D} est propre, il existe $r_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ tel que pour tout entier $r \geq r_0$,

$$h^0(C, \mathcal{O}_C(rs\mathfrak{D}[f](m))) \geq r\text{deg}(s\mathfrak{D}(m)) + 1 - g > 1.$$

D'après [Ha, IV, Lemma 1.2], pour tout entier $r \geq r_0$, $\deg(rs\mathfrak{D}[f](m)) > 0$ et donc $\mathfrak{D}[f](m)$ est semi-ample. Donc par [AH, Lemma 9.1], on a $\mathfrak{D}[f](m) \geq \mathfrak{D}(m)$. Cette inégalité est aussi vraie lorsque C est une courbe algébrique affine lisse. Revenons à l'hypothèse où C est une courbe algébrique lisse quelconque. Les inégalités

$$\mathfrak{D}(m_i) + \operatorname{div}(f_i) \geq 0, \quad i = 1, \dots, r,$$

entraînent que pour tout $z \in C$, $\Delta_z \subset \Delta_z[f]$. Donc pour tout $m \in \sigma^\vee$, $\mathfrak{D}(m) \geq \mathfrak{D}[f](m)$. Par le lemme 2.2, on conclut que $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}[f]$. \square

Exemple 2.5. Soit z une variable et soit \mathbb{T} le tore $(\mathbf{k}^*)^2$. Considérons la sous-algèbre \mathbb{T} -stable

$$A = \mathbf{k} \left[\frac{z}{z-1} \chi^{(2,0)}, \chi^{(0,1)}, z\chi^{(2,2)}, \frac{z^2}{z-1} \chi^{(3,2)} \right] \subset \mathbf{k}(z)[\mathbb{Z}^2].$$

Alors on a les égalités $A^\mathbb{T} = \mathbf{k}$ et $(\operatorname{Frac} A)^\mathbb{T} = \mathbf{k}(z)$. Le cône des poids $\sigma^\vee \subset \mathbb{Q}^2$ de A est le quadrant positif. Par le théorème 2.4, la normalisation \bar{A} de A est égale à $A[\mathbb{P}^1, \mathfrak{D}]$ où $\mathfrak{D} = \Delta_0(0) + \Delta_1(1) + \Delta_\infty(\infty)$ est le diviseur σ -polyédral propre sur \mathbb{P}^1 défini par

$$\Delta_0 = - \left(\frac{1}{2}, 0 \right) + \sigma, \quad \Delta_1 = \left(\frac{1}{2}, 0 \right) + \sigma, \quad \Delta_\infty = \left[\left(\frac{1}{2}, 0 \right), \left(0, \frac{1}{2} \right) \right] + \sigma.$$

Par exemple, le polyèdre Δ_0 est donné par les inégalités

$$2x \geq -\nu_0 \left(\frac{z}{z-1} \right) = -1, \quad y \geq -\nu_0(1) = 0, \quad 2x + 2y \geq -\nu_0(z) = -1,$$

$$3x + 2y \geq -\nu_0 \left(\frac{z^2}{z-1} \right) = -2.$$

Un calcul direct montre qu'en fait $A = A[\mathbb{P}^1, \mathfrak{D}]$. Si l'on pose

$$t_1 := \frac{z}{z-1} \chi^{(2,0)}, \quad t_2 := \chi^{(0,1)}, \quad t_3 := z\chi^{(2,2)}, \quad t_4 := \frac{z^2}{z-1} \chi^{(3,2)},$$

alors les fonctions t_1, t_2, t_3, t_4 vérifient la relation irréductible $t_4^2 - t_1^2 t_2^2 t_3 - t_1 t_3^2 = 0$. On conclut que l'hypersurface $V(x_4^2 - x_1^2 x_2^2 x_3 - x_1 x_3^2) \subset \mathbb{A}^4$ est normale.

Rappelons que pour une variété algébrique affine X , on note $\operatorname{SAut} X$ le sous-groupe des automorphismes de X engendré par la réunion des images des opérations algébriques de \mathbb{G}_a dans X . Pour plus d'informations voir [AKZ] et [AFKKZ] où la notion de variété flexible est introduite. L'exemple suivant est inspiré de [LS, Example 1.1]. Il correspond au cas $d = 2$ et $e = 3$.

Exemple 2.6. Soient $d, e \geq 2$ des entiers tels que $d + 1 = e^2$. Notons

$$\mathfrak{D}_{d,e} = \Delta_0^{d,e}(0) + \Delta_1^{d,e}(1) + \Delta_\infty^{d,e}(\infty)$$

le diviseur polyédral propre sur \mathbb{P}^1 avec

$$\Delta_0^{d,e} = [(1, 0), (1, 1)] + \sigma_{d,e}, \quad \Delta_1^{d,e} = \left(-\frac{1}{e}, 0 \right) + \sigma_{d,e}, \quad \Delta_\infty^{d,e} = \left(\frac{e}{d} - 1, 0 \right) + \sigma_{d,e},$$

où $\sigma_{d,e}$ est le cône de \mathbb{Q}^2 engendré par les vecteurs $(1,0)$ et $(1,de)$, et $X_{d,e} := X[\mathfrak{D}_{d,e}]$. Alors $X_{d,e}$ n'est pas torique. En effet, $X_{d,e}$ n'est pas \mathbb{T} -isomorphe à $X[\mathbb{P}^1, \mathfrak{D}]$ avec \mathfrak{D} un diviseur polyédral propre sur \mathbb{P}^1 porté par au plus 2 points, i.e $\text{Card Supp } \mathfrak{D} \leq 2$ (voir [AL, Corollary 1.4] et le théorème 1.9).

Montrons que le groupe $\text{SAut } X_{d,e}$ opère infiniment transitivement dans le lieu lisse de $X_{d,e}$. Pour cela considérons la sous-algèbre

$$A_{d,e} := \mathbf{k} \left[\chi^{(0,1)}, \frac{(1-z)^d}{z^{de-1}} \chi^{(de,-1)}, \frac{1-z}{z^e} \chi^{(e,0)}, \frac{(1-z)^e}{z^d} \chi^{(d,0)} \right] \subset \mathbf{k}(z)[\mathbb{Z}^2]$$

où \mathbb{T} est le tore $(\mathbf{k}^*)^2$ et z est une variable sur $\mathbf{k}(\mathbb{T})$. Posons

$$u := \chi^{(0,1)}, \quad v := \frac{(1-z)^d}{z^{de-1}} \chi^{(de,-1)}, \quad x := \frac{1-z}{z^e} \chi^{(e,0)}, \quad y := \frac{(1-z)^e}{z^d} \chi^{(d,0)}.$$

Alors les fonctions u, v, x, y vérifient la relation irréductible $uv + x^d - y^e = 0$ (E), identifiant $\text{Spec } A_{d,e}$ avec l'hypersurface $H_{d,e}$ d'équation (E) de \mathbb{A}^4 . L'origine O de \mathbb{A}^4 est l'unique point singulier de $H_{d,e}$.

D'après [Vie, Proposition 2], $H_{d,e}$ est normale en O et par [KZ, §5], [AKZ, Theorem 3.2], le groupe $\text{SAut } H_{d,e}$ opère infiniment transitivement dans $H_{d,e} - \{O\}$ comme suspension du plan affine. Par ailleurs, on a $(\text{Frac } A_{d,e})^{\mathbb{T}} = \mathbf{k}(z)$ et $\text{Frac } A_{d,e} = \text{Frac } \mathbf{k}(z)[\mathbb{Z}^2]$. Un calcul facile montre que $\mathfrak{D}[u, v, x, y] = \mathfrak{D}_{d,e}$. On conclut par le théorème 2.4.

Notons que le calcul de $\mathfrak{D}_{d,e}$ peut être obtenue à partir de $H_{d,e}$ en utilisant [AH, §11].

Le théorème 2.4 appliqué à $\mathbb{T} = \mathbf{k}^*$ donne le corollaire suivant. Les parties concernant les cas paraboliques et hyperboliques ont été établies dans [FZ, 3.9, 4.6].

Corollaire 2.7. *Soit C une courbe algébrique lisse, considérons χ une variable sur $\mathbf{k}(C)$ et soit A une sous-algèbre graduée de $\mathbf{k}(C)[\mathbb{Z}]$ ayant le même corps des fractions que $\mathbf{k}(C)[\mathbb{Z}]$. Alors les assertions suivantes sont vraies.*

(i) (cas elliptique et parabolique) *Si*

$$A = \mathbf{k}[C][f_1 \chi^{m_1}, \dots, f_r \chi^{m_r}] \subset \mathbf{k}(C)[\mathbb{Z}],$$

avec $f_i \in \mathbf{k}(C)^*$ et $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{Z}_{>0}$, alors la présentation de Dolgachev-Pinkham-Demazure (D.P.D.) de $\bar{A} = A_{C,D}$ est donnée par le \mathbb{Q} -diviseur sur C

$$D = - \min_{1 \leq i \leq r} \frac{\text{div}(f_i)}{m_i};$$

(ii) (cas hyperbolique) *Si $C = \text{Spec } A_0$ est une courbe affine lisse,*

$$A = \mathbf{k}[C][f_1 \chi^{-m_1}, \dots, f_r \chi^{-m_r}, g_1 \chi^{n_1}, \dots, g_s \chi^{n_s}] \subset \mathbf{k}(C)[\mathbb{Z}],$$

avec $n_1, \dots, n_s, m_1, \dots, m_r \in \mathbb{Z}_{>0}$, alors la présentation D.P.D. de $\bar{A} = A_0[D_-, D_+]$ est donnée par les \mathbb{Q} -diviseurs

$$D_- = - \min_{1 \leq i \leq r} \frac{\text{div}(f_i)}{m_i} \quad \text{et} \quad D_+ = - \min_{1 \leq i \leq s} \frac{\text{div}(g_i)}{n_i}.$$

Démonstration. Nous donnons la preuve pour le cas de (i). L'assertion (ii) se traite de la même façon. D'après le théorème 2.4, on peut écrire $\bar{A} = A[C, \mathfrak{D}]$ avec $\mathfrak{D} = \sum_{z \in C} \Delta_z \cdot z$ où pour $z \in C$,

$$\Delta_z = \{v \in \mathbb{Q}, m_i \cdot v \geq -\nu(f_i), 1 \leq i \leq r\}.$$

Puisque $D = \mathfrak{D}(1)$, nous obtenons le résultat. □

3 Idéaux intégralement clos et polyèdres entiers

Dans cette section, nous rappelons une description des idéaux monomiaux intégralement clos en terme de polyèdres entiers. Nous commençons par quelques notions générales.

3.1. Puisque nous restons dans un contexte géométrique, la lettre A désigne une algèbre intègre de type fini sur \mathbf{k} . Soit $I \subset A$ un idéal. Un élément $a \in A$ est dit *entier* (ou satisfaisant une relation de dépendance intégrale) sur I s'il existe $r \in \mathbb{Z}_{>0}$ et des éléments

$$\lambda_1 \in I, \lambda_2 \in I^2, \dots, \lambda_r \in I^r \quad \text{tels que} \quad a^r + \sum_{i=1}^r \lambda_i a^{r-i} = 0.$$

L'idéal I est dit *intégralement clos* (ou complet) si tout entier de A sur I appartient à I . On dit que I est *normal* si pour tout entier $i \geq 1$, l'idéal I^i est intégralement clos.

Le sous-ensemble $\bar{I} \subset A$, appelé *clôture intégrale* (ou fermeture intégrale) de I dans A , est l'ensemble des éléments entiers sur I . C'est le plus petit idéal intégralement clos de A contenant I [HS, Corollary 1.3.1]. La démonstration de ce fait utilise les réductions d'idéaux (voir [NR]). Pour plus d'informations sur les idéaux intégralement clos, voir par exemple [LeTe], [HS], [Va]. Considérons l'algèbre de Rees

$$B = A[It] = A \oplus \bigoplus_{i \geq 1} I^i t^i$$

correspondante à un idéal I de A . Alors la normalisation de B est

$$(6) \quad \bar{B} = \bar{A} \oplus \bigoplus_{i \geq 1} \bar{A} \bar{I}^i t^i$$

où \bar{A} est la normalisation de A (voir [Ri]). La normalisation de B est égale à celle de $\bar{A}[\bar{A}It]$ [HS, Proposition 5.2.4]. Si A est normale alors $A[It]$ est normale si et seulement si I est normal.

Supposons maintenant que A est M -graduée normale. Un idéal I de A est dit *homogène* si I est non nul et si I est engendré par des éléments homogènes de A . Chaque idéal homogène de A est un sous- \mathbb{T} -module rationnel [Br, §1.1] et admet donc une décomposition en somme directe de sous-espaces propres. D'après [HS, Corollary 5.2.3], si I est homogène alors \bar{I} est homogène.

En l'absence de références, nous donnons la preuve du lemme suivant.

Lemme 3.2. *Soit A une algèbre normale de type fini sur \mathbf{k} et soit I un idéal de A . Alors la fermeture intégrale de $A[It]$ dans son corps des fractions est égale à celle de $A[\bar{I}t]$. En particulier, pour tout $i \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\bar{I}^i = \bar{I}^i$.*

Démonstration. Pour tout $i \in \mathbb{Z}_{>0}$, on a $I^i \subset \bar{I}^i$, soit $A[It] \subset A[\bar{I}t]$. D'où $\overline{A[It]} \subset \overline{A[\bar{I}t]}$. Par (6) et puisque $A = \bar{A}$ est normale, $\bar{I}t$ est inclus dans $\overline{A[\bar{I}t]}$, donc $A[\bar{I}t] \subset \overline{A[\bar{I}t]}$ et finalement $\overline{A[\bar{I}t]} \subset \overline{A[It]}$. La deuxième affirmation est une conséquence de (6) et de l'égalité $\overline{A[It]} = \overline{A[\bar{I}t]}$. \square

3.3. Fixons un cône polyédral saillant $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$. Considérons une partie $F \subset M_{\mathbb{Q}}$ telle que $F \cap \sigma^{\vee} \neq \emptyset$. On note $\text{Pol}_{\sigma^{\vee}}(F)$ l'ensemble des polyèdres de la forme $P = Q + \sigma^{\vee}$ avec Q un polytope dont les sommets appartiennent à F . Un σ^{\vee} -polyèdre entier est un élément de $\text{Pol}_{\sigma^{\vee}}(M)$.

Si $P \in \text{Pol}_{\sigma^\vee}(M)$ alors pour tout entier $e \geq 1$, on pose $eP := P + \dots + P$ la somme de Minkowski de e exemplaires de P . Le polyèdre eP est l'image de P par l'homothétie de centre 0 et de rapport e . Si $e = 0$ alors on pose $eP = \sigma^\vee$. On dit que P est *normal* si pour tout entier $e \geq 1$,

$$(eP) \cap M = \{m_1 + \dots + m_e \mid m_1, \dots, m_e \in P \cap M\}.$$

Un sous-semi-groupe $E \subset M$ est dit *saturé* si pour $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ et pour $m \in M$ tels que $dm \in E$, on a $m \in E$. Cela est équivalent à ce que E soit l'intersection de $\text{Cone}(E)$ et du réseau M .

Lemme 3.4. *Pour un cône polyédral saillant $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$ et un polyèdre entier $P \in \text{Pol}_{\sigma^\vee}(M)$, on note*

$$S = S_P := \{(m, e) \in M \times \mathbb{N} \mid m \in (eP) \cap M\}.$$

Alors S est un sous-semi-groupe saturé de $M \times \mathbb{Z}$. De plus, pour tout $e \geq 1$, l'enveloppe convexe de

$$E_{[e,P]} := \{m_1 + \dots + m_e \mid m_1, \dots, m_e \in P \cap M\}$$

dans $M_{\mathbb{Q}}$ est égale à eP .

Démonstration. Soit $s \in \mathbb{Z}_{>0}$ et $(m, e) \in M \times \mathbb{Z}_{>0}$ tels que $s(m, e) \in S$. Alors $sm \in (seP) \cap M$. Donc il existe $m_{ij} \in P$ avec $1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq e$ tels que $sm = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^e m_{ij}$, de sorte que

$$m = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^e m_{1j} + \dots + \frac{1}{s} \sum_{j=1}^e m_{sj} \in (eP) \cap M.$$

D'où $(m, e) \in S$. Puisque σ_M^\vee est un sous-semi-groupe saturé, S l'est également. Cela montre la première assertion.

On montre la seconde par récurrence sur $e \geq 1$. Comme $P \in \text{Pol}_{\sigma^\vee}(M)$, il existe un polytope Q dont l'ensemble de ses sommets $V(Q)$ est contenu dans M et tel que $P = Q + \sigma^\vee$. On a pour tout $m \in \sigma_M^\vee$,

$$m + Q = \text{Conv}(m + V(Q)) \subset \text{Conv}(P \cap M) \text{ soit } \sigma_M^\vee + Q \subset \text{Conv}(P \cap M).$$

Donc pour tout $m' \in Q$,

$$m' + \sigma^\vee = \text{Conv}(m' + \sigma_M^\vee) \subset \text{Conv}(\sigma_M^\vee + Q) \subset \text{Conv}(P \cap M).$$

D'où $P = \text{Conv}(P \cap M)$. Ce qui donne le cas $e = 1$.

Supposons le résultat établi pour un entier $e \geq 1$ fixé. Alors pour tout $m \in P \cap M$,

$$m + eP = \text{Conv}(m + E_{[e,P]}) \subset \text{Conv}(E_{[e+1,P]}),$$

par le cas $e = 1$. Pour tout $m' \in eP$, on a les égalités

$$m' + P = \text{Conv}(m' + P \cap M) \subset \text{Conv}(E_{[e+1,P]}).$$

Il s'ensuit que $(e+1)P = \text{Conv}(E_{[e+1,P]})$. D'où le résultat. \square

Rappelons que tout idéal homogène intégralement clos d'une variété torique affine est caractérisé par l'enveloppe convexe de l'ensemble de ses poids. Voir [Vit, 3.1] pour le cas de l'algèbre des polynômes à plusieurs variables. Le résultat suivant est connu (voir [CLS, Proposition 11.3.4] pour le cas où σ^\vee est saillant). Par commodité, nous donnons une courte preuve. Cela nous sera utile pour la suite. Pour tout entier e , nous noterons $M_e = M \times \{e\}$.

Théorème 3.5. Soit $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$ un cône polyédral saillant. Alors l'application

$$P \mapsto I[P] = \bigoplus_{m \in P \cap M} \mathbf{k}\chi^m$$

est une bijection entre $\text{Pol}_{\sigma^{\vee}}(\sigma_M^{\vee})$ et l'ensemble des idéaux homogènes intégralement clos de $A := \mathbf{k}[\sigma_M^{\vee}]$. Plus précisément, si $I = (\chi^{m_1}, \dots, \chi^{m_r})$ est un idéal homogène de A alors sa fermeture \bar{I} est $I[P]$ où

$$(7) \quad P = \text{Conv}(m_1, \dots, m_r) + \sigma^{\vee}.$$

Le cône des poids $\tilde{\omega}$ de $A[It]$ est l'unique cône vérifiant $\tilde{\omega} \cap M_e = (eP) \cap M$, pour tout $e \in \mathbb{N}$. De plus, si $P \in \text{Pol}_{\sigma^{\vee}}(\sigma_M^{\vee})$ alors P est normal si et seulement si $I[P]$ est normal.

Démonstration. Soit $P \in \text{Pol}_{\sigma^{\vee}}(\sigma_M^{\vee})$. Par définition, la partie $I[P]$ est un idéal. Nous allons montrer que $I[P]$ est intégralement clos. Considérons α un élément homogène de $J := \overline{I[P]}$. Alors il existe $a_1 \in J, \dots, a_d \in J^d$ tels que

$$\alpha^d = a_1 \alpha^{d-1} + \dots + a_{d-1} \alpha + a_d,$$

avec a_d non nul. Puisque α^d est homogène, le second membre de l'équation ci-dessus l'est également. On peut donc supposer que $\alpha^d = a_d = c_d \chi^{m_d}$ avec $c_d \in \mathbf{k}^*$ et $m_d \in (dP) \cap M$. Le poids correspondant à α est $m_d/d \in P \cap M$. D'où $\alpha \in I[P]$. Ce qui donne $I[P] = \overline{I[P]}$. Ainsi, l'application $\varphi : P \mapsto I[P]$ est bien définie.

Montrons que φ est injective. Supposons que $I[P_1] = I[P_2]$, pour des polyèdres $P_1, P_2 \in \text{Pol}_{\sigma^{\vee}}(\sigma_M^{\vee})$. Alors on a $P_1 \cap M = P_2 \cap M$. Donc par le lemme 3.4, il vient

$$P_1 = \text{Conv}(P_1 \cap M) = \text{Conv}(P_2 \cap M) = P_2.$$

Cela donne l'injectivité de φ .

Soit $I \subset A$ un idéal engendré par $\chi^{m_1}, \dots, \chi^{m_r}$. Considérons P comme dans (7). Montrons l'égalité $\bar{I} = I[P]$. Puisque $I \subset I[P]$ et comme $I[P]$ est intégralement clos, on a $\bar{I} \subset I[P]$. Soit $\chi^m \in I[P]$. Alors $m \in P \cap M$. Donc il existe $c_1, \dots, c_r \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ de somme égale à 1 et $c \in \sigma^{\vee}$ tels que

$$m = \sum_{i=1}^r c_i m_i + c.$$

Soit $d' \in \mathbb{Z}_{>0}$ tel que $d'c_i \in M$ pour chaque i et tel que $dc \in \sigma_M^{\vee}$. Alors $\chi^{d'm} \in I^{d'}$ et donc $\chi^m \in \bar{I}$. D'où $\bar{I} = I[P]$ et la surjectivité de φ .

Déterminons le cône des poids $\tilde{\omega}$ de $A[It]$. D'après le lemme 3.2, on peut supposer que $I = I[P]$. Soit $e \in \mathbb{Z}_{>0}$. Alors on a

$$I[P]^e = \bigoplus_{m \in E[e, P]} \mathbf{k}\chi^m.$$

Notons $\overline{I[P]^e} = I[P_e]$, pour un polyèdre $P_e \in \text{Pol}_{\sigma^{\vee}}(\sigma_M^{\vee})$. Par le lemme 3.4, on a d'une part,

$$eP = \text{Conv}(E[e, P]) \subset P_e.$$

D'autre part, $I[P]^e \subset I[eP]$ et donc $I[P_e] \subset I[eP]$. D'où $eP = P_e$. D'après l'égalité (6) de 3.1, $\tilde{\omega}$ est le cône des poids de

$$\overline{A[It]} = A \oplus \bigoplus_{e \in \mathbb{Z}_{>0}} I[eP]t^e.$$

D'où $\tilde{\omega} \cap M_e = (eP) \cap M$, pour tout entier $e \geq 0$. Les autres assertions suivent aisément. \square

Le théorème suivant est une conséquence d'un résultat sur la normalité des polytopes entiers [BGN, Theorem 1.1.3].

Théorème 3.6. *Soit $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$ un cône polyédral saillant, notons $n = \dim N_{\mathbb{Q}}$ et considérons $P \in \text{Pol}_{\sigma^{\vee}}(M)$. Alors pour tout entier $e \geq n - 1$, le polyèdre eP est normal. En particulier, tout idéal stable intégralement clos d'une surface torique est normal.*

Démonstration. Soit \mathcal{E} une subdivision de cônes polyédraux saillants de σ^{\vee} de dimension n . Écrivons $P = Q + \sigma^{\vee}$ avec Q un polytope entier. Soit $m \in (eP) \cap M$. Alors il existe $\tau \in \mathcal{E}$ tel que $m \in (eQ + \tau) \cap M$. D'après [CLS, Proposition 7.19], on a $m \in E_{[e, Q + \tau]}$ (voir 3.4). Donc $m \in E_{[e, P]}$ et eP est normal. Le reste provient du théorème 3.5. \square

Remarque 3.7. Notons que dans le cas où $\mathbf{k}[\sigma_M^{\vee}] = \mathbf{k}[x_1, \dots, x_n]$ est l'algèbre des polynômes, un idéal monomial $I \subset \mathbf{k}[x_1, \dots, x_n]$ est normal si et seulement si pour tout $i = 1, \dots, n - 1$, l'idéal I^i est intégralement clos [RRV, 3.1]. Nous verrons une généralisation de ce résultat dans la section 5.

D'après [ZS, Appendix 5], [HS, §1.1.4, §14.4.4], tout idéal intégralement clos d'une surface affine lisse est normal. Cependant cela ne s'applique pas aux variétés toriques affines de dimension 3. En effet, d'après [HS, Exercice 1.14], si $\sigma \subset \mathbb{Q}^3$ est l'octant positif et si

$$P := \text{Conv}((2, 0, 0), (0, 3, 0), (0, 0, 7)) + \sigma^{\vee}$$

alors $I[P]$ n'est pas normal.

4 Idéaux intégralement clos et \mathbb{T} -variétés affines de complexité un

Dans cette section, C désigne une courbe algébrique lisse, le sous-ensemble $\sigma \subset N_{\mathbb{Q}}$ est un cône polyédral saillant et $\mathfrak{D} = \sum_{z \in C} \Delta_z \cdot z$ est un diviseur σ -polyédral propre. Posons $A := A[C, \mathfrak{D}]$. Nous allons étudier les idéaux homogènes intégralement clos de A . Nous commençons par décrire le cône des poids de l'algèbre de Rees de A selon un idéal homogène. Rappelons que pour un entier e , M_e désigne $M \times \{e\}$.

Lemme 4.1. *Soit $I \subset A$ un idéal engendré par des éléments homogènes $f_1 \chi^{m_1}, \dots, f_r \chi^{m_r}$. Notons*

$$P = \text{Conv}(m_1, \dots, m_r) + \sigma^{\vee}.$$

Alors le cône des poids $\tilde{\omega}$ de l'algèbre $(M \times \mathbb{Z})$ -graduée $A[It]$ vérifie $\tilde{\omega} \cap M_e = (eP) \cap M$, pour tout $e \in \mathbb{N}$.

Démonstration. Soit E l'ensemble des poids de I . La partie $J := \bigoplus_{m \in E} \mathbf{k} \chi^m$ est un idéal de $A' := \mathbf{k}[S]$. Par le lemme 3.2, on a

$$\overline{A'[Jt]} = \overline{B[\overline{JB}t]} \text{ avec } B := \mathbf{k}[\sigma_M^{\vee}].$$

Les éléments $\chi^{m_1}, \dots, \chi^{m_r}$ engendrent l'idéal JB . Puisque $\tilde{\omega}$ est le cône des poids de $\overline{A'[Jt]}$, le reste provient du théorème 3.5. \square

L'assertion suivante permet de calculer explicitement la fermeture intégrale des idéaux homogènes de l'algèbre A .

Théorème 4.2. Soit I un idéal de $A = A[C, \mathfrak{D}]$ engendré par des éléments homogènes $f_1\chi^{m_1}, \dots, f_r\chi^{m_r}$. Alors on a

$$A = \bigoplus_{m \in \sigma_M^\vee} H^0(C, \mathcal{O}_C([\tilde{\mathfrak{D}}(m, 0)]))\chi^m$$

et pour tout entier $e \geq 1$,

$$\bar{I}^e = \bigoplus_{m \in (eP) \cap M} H^0(C, \mathcal{O}_C([\tilde{\mathfrak{D}}(m, e)]))\chi^m$$

où $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ vérifie les conditions suivantes.

- (i) P est le polyèdre $\text{Conv}(m_1, \dots, m_r) + \sigma^\vee$;
- (ii) $\tilde{\mathfrak{D}}$ est le diviseur polyédral sur C dont ses coefficients sont définis par

$$\tilde{\Delta}_z = \bigcap_{i=1}^r \{ (v, p) \in N_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}, m_i(v) + p \geq -\nu_z(f_i) \} \cap (\Delta_z \times \mathbb{Q}),$$

pour tout $z \in C$.

Démonstration. On applique le théorème 2.4 à l'algèbre $A[It]$ en utilisant les éléments $f_i\chi^{m_i}$ et des générateurs homogènes de A . Le diviseur polyédral correspondant $\tilde{\mathfrak{D}}$ vérifie (ii). On conclut par le lemme 4.1. \square

Exemple 4.3. Reprenons l'exemple 2.5. On considère l'idéal homogène

$$I = (t_2, t_3, t_4) \subset A = k[t_1, t_2, t_3, t_4] \cong \frac{k[x_1, x_2, x_3, x_4]}{(x_4^2 - x_1^2 x_2^2 x_3 - x_1 x_3^2)}.$$

Soit $\tilde{\omega} \subset \mathbb{Q}^3$ le cône vérifiant $\tilde{\omega} \cap \mathbb{Z}_e^2 = (0, e) + \mathbb{Q}_{\geq 0}^2$, pour tout entier $e \geq 0$. Soit $\tilde{\mathfrak{D}}$ le diviseur $\tilde{\omega}^\vee$ -polyédral sur \mathbb{P}^1 construit par les générateurs t_2, t_3, t_4 . Les coefficients non triviaux de $\tilde{\mathfrak{D}}$ sont

$$\tilde{\Delta}_0 = -\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right) + \tilde{\omega}^\vee, \quad \tilde{\Delta}_1 = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right) + \tilde{\omega}^\vee, \quad \tilde{\Delta}_\infty = \text{Conv}\left((0, 1, -1), \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), \left(0, \frac{1}{2}, 0\right)\right) + \tilde{\omega}^\vee.$$

Fixons un polyèdre $P \in \text{Pol}_{\sigma^\vee}(\sigma_M^\vee)$. Considérons un cône $\tilde{\omega} \subset M_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}$ satisfaisant la relation

$$\tilde{\omega} \cap M_e = (eP) \cap M,$$

pour tout $e \in \mathbb{N}$. Dans les deux prochains lemmes, nous étudions des diviseurs $\tilde{\omega}^\vee$ -polyédraux dont les pièces graduées correspondantes à M_e forment un idéal de A .

Lemme 4.4. Soit $\tilde{\mathfrak{D}} = \sum_{z \in C} \tilde{\Delta}_z \cdot z$ un diviseur $\tilde{\omega}^\vee$ -polyédral propre. Alors les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) Pour tout $z \in C$, le polyèdre Δ_z est la projection orthogonale de $\tilde{\Delta}_z$ parallèlement à $\mathbb{Q}(0_M, 1)$ et si (v, p) est un sommet de $\tilde{\Delta}_z$ alors $p \leq 0$;

(ii) Pour tout entier $e \geq 0$,

$$I_{[e]} := \bigoplus_{m \in (eP) \cap M} H^0(C, \mathcal{O}_C([\tilde{\mathfrak{D}}(m, e)])) \chi^m$$

est un idéal de A et $I_{[0]} = A$.

Démonstration. Soit $z \in C$. Notons Δ'_z la projection orthogonale de $\tilde{\Delta}_z$ parallèlement à l'axe $\mathbb{Q}(0_M, 1)$. Montrons l'implication (i) \Rightarrow (ii) Puisque pour $m \in \sigma^\vee$, $h_{\tilde{\Delta}_z}(m, 0) = h_{\Delta'_z}(m)$, on a l'égalité $I_{[0]} = A$. La proposition 1.10 implique que pour tout $e \in \mathbb{N}$, $I_{[e]} \subset A$. D'où l'assertion (ii).

Réciproquement, la propriété de \mathfrak{D} et l'égalité $A = I_{[0]}$ montre que $\Delta_z = \Delta'_z$. Soit (v, p) un sommet de $\tilde{\Delta}_z$. Il reste à montrer que $p \leq 0$. La partie

$$\lambda := \left\{ (m, e) \in M_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}, h_{\tilde{\Delta}_z}(m, e) = m(v) + ep \right\}$$

est un cône d'intérieur non vide [AH, §1]. Donc l'ensemble $\lambda_{M \times \mathbb{Z}} = \lambda \cap (M \times \mathbb{Z})$ contient un élément (m', e') vérifiant $e' \geq 1$. Soit $v' \in \Delta_z$ tels que

$$m'(v') = h_{\Delta_z}(m').$$

Par propriété de $\tilde{\mathfrak{D}}$ et [AH, Lemma 9.1], il s'ensuit que

$$m'(v) + e'p = h_{\tilde{\Delta}_z}(m', e') \leq h_{\Delta_z}(m') = m'(v').$$

Comme v appartient à Δ_z , on a $m'(v') \geq m'(v)$ et donc $p \leq 0$. D'où le résultat. \square

Lemme 4.5. Soit $\tilde{\mathfrak{D}}$ un diviseur $\tilde{\omega}^\vee$ -polyédral sur C . Supposons que $\tilde{\mathfrak{D}}$ vérifie la condition (ii) du lemme 4.4. Alors pour tout $e \in \mathbb{N}$, $I_{[e]}$ est un idéal homogène intégralement clos.

Démonstration. Soit $e \in \mathbb{N}$. Il suffit de montrer que tout élément homogène de $\bar{I}_{[e]}$ appartient à $I_{[e]}$. Soit $a \in \bar{I}_{[e]}$ un élément homogène. L'élément $a\chi^{(0,e)}$ appartient à la normalisation de $A[C, \tilde{\mathfrak{D}}]$. Puisque $A[C, \tilde{\mathfrak{D}}]$ est normal [De, §2.7], nous avons $a \in I_{[e]}$. \square

Le théorème suivant décrit les idéaux homogènes intégralement clos pour la complexité 1. Soit S le semi-groupe des poids de A . Dans ce théorème, nous considérons des couples $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ vérifiant les conditions suivantes.

- (i) P est un polyèdre de $\text{Pol}_{\sigma^\vee}(S)$;
- (ii) $\tilde{\mathfrak{D}} = \sum_{z \in C} \tilde{\Delta}_z \cdot z$ est un diviseur $\tilde{\omega}^\vee$ -polyédral où $\tilde{\omega} \subset M_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}$ vérifie

$$\tilde{\omega} \cap M_e = (eP) \cap M,$$

pour tout entier $e \geq 0$;

- (iii) Pour tout $z \in C$, Δ_z est la projection orthogonale de $\tilde{\Delta}_z$ parallèlement à $\mathbb{Q}(0_M, 1)$ et tout sommet $(v, p) \in \tilde{\Delta}_z$ satisfait $p \leq 0$;
- (iv) Pour tout $z \in C$, $\tilde{\Delta}_z$ est l'intersection dans $\Delta_z \times \mathbb{Q}$ d'un nombre fini de demi-espaces

$$\Delta_{m,e} := \{ (v, p) \in N_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}, m(v) + p \geq e \}$$

avec $e \in \mathbb{Z}$ et $m \in P \cap M$ tel que $h_{\tilde{\Delta}_z}(m, 1) = -\nu_z(f)$, pour $f\chi^{(m,1)} \in A[\tilde{\mathfrak{D}}]$ homogène.

Théorème 4.6. Soit $\mathfrak{D} = \sum_{z \in C} \Delta_z \cdot z$ un diviseur σ -polyédral propre et soit $A = A[C, \mathfrak{D}]$. Alors il existe une bijection entre l'ensemble des idéaux homogènes intégralement clos de A et l'ensemble des couples $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ vérifiant (i) – (iv). Cette correspondance est donnée par

$$(8) \quad (P, \tilde{\mathfrak{D}}) \mapsto I = \bigoplus_{m \in P \cap M} H^0(C, \mathcal{O}_C([\tilde{\mathfrak{D}}(m, 1)])) \chi^m.$$

Démonstration. Soit $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ un couple vérifiant les conditions (i) – (iv). Montrons que $\tilde{\mathfrak{D}}$ est propre. Soient z_1, \dots, z_s les points du support de $\tilde{\mathfrak{D}}$. D'après (iv), on a pour $j = 1, \dots, s$,

$$\tilde{\Delta}_{z_j} = (\Delta_z \times \mathbb{Q}) \cap \bigcap_{i=1}^{r_j} \Delta_{m_{ij}, e_{ij}}$$

avec $e_{ij} \in \mathbb{Z}$ et $m_{ij} \in P \cap M$ tel qu'il existe $f_{ij} \chi^{(m_{ij}, 1)} \in A[C, \tilde{\mathfrak{D}}]$ homogène satisfaisant $\nu_{z_j}(f_{ij}) = h_{\tilde{\Delta}_{z_j}}(m_{ij}, 1)$. Considérons l'algèbre B engendrée par A et par les éléments

$$(9) \quad f_{ij} \chi^{(m_{ij}, 1)}, \quad 1 \leq j \leq s, \quad 1 \leq i \leq r_j.$$

Par le théorème 4.2, l'anneau $A[C, \tilde{\mathfrak{D}}]$ est la normalisation de B . Ce qui donne la propriété de $\tilde{\mathfrak{D}}$.

Les lemmes 4.4 et 4.5 montrent que l'application (8) est bien définie. Ainsi, $A[C, \tilde{\mathfrak{D}}] = \overline{A[It]}$ où $t = \chi^{(0, 1)}$. Par l'égalité (6) de 3.1, on déduit l'injectivité.

Montrons la surjectivité. Soit I un idéal intégralement clos de A engendré par des éléments homogènes $f_1 \chi^{m_1}, \dots, f_r \chi^{m_r}$. Considérons le couple $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ obtenu à partir du théorème 4.2. Des lemmes 4.1, 4.4 et 4.5, on obtient (i), (ii), (iii). Montrons (iv). Pour un point $z \in C$, écrivons

$$\tilde{\Delta}_z = (\Delta_z \times \mathbb{Q}) \cap \bigcap_{i=1}^r \Delta_{m_i, e_i}$$

avec pour tout i , $e_i := -\nu_z(f_i)$. Soit E un sous-ensemble minimal de $\{1, \dots, r\}$ tel que

$$\tilde{\Delta}_z = (\Delta_z \times \mathbb{Q}) \cap \bigcap_{i \in E} \Delta_{m_i, e_i}.$$

Fixons un élément $i' \in E$. Montrons que

$$(10) \quad \{(v, p) \in N_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}, m_{i'}(v) + p = e_{i'}\} \cap \tilde{\Delta}_z \neq \emptyset.$$

Supposons que cette intersection est vide. Considérons la topologie usuelle sur $N_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}$. Le sous-ensemble U des éléments $(v, p) \in N_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}$ tels que $m_{i'}(v) + p > e_{i'}$ est un ouvert. Notons

$$\Delta = (\Delta_z \times \mathbb{Q}) \cap \bigcap_{i \in E - \{i'\}} \Delta_{m_i, e_i}.$$

Puisque $\tilde{\Delta}_z = \Delta \cap U$ est une partie non vide, ouverte et fermée dans Δ , on a $\tilde{\Delta}_z = \Delta$. Cela contredit la minimalité de E . On conclut que (10) est vraie. Donc $h_{\tilde{\Delta}_z}(m_{i'}, 1) = e_{i'} = -\nu_z(f_{i'})$. D'où la condition (iv). \square

Dans le cas où C est affine, la description précédente se simplifie.

Corollaire 4.7. *Supposons que C est affine. Alors il existe une bijection entre l'ensemble des idéaux homogènes intégralement clos de A et l'ensemble des couples $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ vérifiant (ii), (iii) du théorème 4.6 et les conditions suivantes.*

- (i)' P est un polyèdre de $\text{Pol}_{\sigma^\vee}(\sigma_M^\vee)$;
- (iv)' Pour tout $z \in C$, le polyèdre $\tilde{\Delta}_z$ est l'intersection dans $\Delta_z \times \mathbb{Q}$ d'un nombre fini de demi-espaces

$$\Delta_{m,e} := \{ (v, p) \in N_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}, m(v) + p \geq e \}$$

avec $e \in \mathbb{Z}$ et $m \in P \cap M$.

La correspondance est donnée par l'application (8) de 4.6.

Démonstration. L'équivalence (i) \Leftrightarrow (i)' est immédiate.

Soit $D = \sum_{z \in C} a_z \cdot z$ un diviseur de Weil sur C à coefficients entiers. Montrons que pour tout $y \in C$, il existe $f \in V := H^0(C, \mathcal{O}_C(D))$ non nul tel que $a_y = -\nu_y(f)$. Cela établira $(v) \Leftrightarrow (v)'$. Soit f_1, \dots, f_r des générateurs non nuls du $\mathbf{k}[C]$ -module V . Il s'ensuit que

$$\mathbf{k}[C][f_1 t, \dots, f_r t] = \bigoplus_{i \in \mathbb{N}} H^0(C, \mathcal{O}_C(iD)) t^i,$$

pour une variable t sur $\mathbf{k}(C)$. Par le corollaire 2.7, on a $D = -\min_{1 \leq i \leq r} \text{div } f_i$. D'où le résultat. \square

Remarque 4.8. Soient $g_2, g_3 \in \mathbf{k}$ tels que $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$. Considérons la courbe elliptique $C \subset \mathbb{P}^2$ d'équation de Weierstrass $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$, O son point à l'infini et A l'algèbre graduée

$$\bigoplus_{m \in \mathbb{N}} H^0(C, \mathcal{O}_C(m \cdot O)) \chi^m.$$

Soit $\tilde{\omega} \subset \mathbb{Q}^2$ le cône

$$\mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 0) + \mathbb{Q}_{\geq 0}(1, 1),$$

$P = \mathbb{Q}_{\geq 1}$ et $\tilde{\mathfrak{D}} := \tilde{\Delta} \cdot O$ le diviseur polyédral sur C avec $\tilde{\Delta} = (1, 0) + \tilde{\omega}^\vee$. Alors $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ vérifie les conditions (i), (ii), (iii) et (iv)' de 4.6 et 4.7. Cependant la condition (iv) n'est pas satisfaite. L'algèbre $A[C, \tilde{\mathfrak{D}}]$ est donc distincte de la normalisation de $A[It]$ où I est l'idéal provenant de (8) et $t := \chi^{(0,1)}$.

5 Exemples d'idéaux homogènes normaux

Dans cette section, nous considérons l'algèbre $A = A[C, \mathfrak{D}]$ comme dans 4. Supposons que C est affine et fixons un idéal homogène intégralement clos $I \subset A$. Nous allons donner des conditions sur le couple $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ associé (voir 4.6) pour que I soit normal. Comme d'habitude, nous notons $\tilde{\Delta}_z$ le coefficient de $\tilde{\mathfrak{D}}$ au point $z \in C$.

Notation 5.1. Pour tout $z \in C$, nous considérons le sous-ensemble

$$\tilde{P}_z := \text{Conv} \left(\left\{ (m, i) \in (P \cap M) \times \mathbb{Z}, h_{\tilde{\Delta}_z}(m, 1) \geq -i \right\} \right).$$

On vérifie aisément que \tilde{P}_z est un polyèdre entier de $M_{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q}$. Par ailleurs, pour un ouvert non vide $U \subset C$, $\tilde{\mathfrak{D}}|_U := \sum_{z \in U} \tilde{\Delta}_z \cdot z$ est le diviseur polyédral sur U obtenu par restriction de $\tilde{\mathfrak{D}}$.

L'assertion suivante est inspirée de la description de $X[C, \tilde{\mathfrak{D}}]$ comme variété toroïdale (voir [LS, §2.6], [KKMS, Chapter 2, 4]).

Lemme 5.2. *Soit $z \in C$. Supposons que C est affine et que $\mathfrak{D}, \tilde{\mathfrak{D}}$ ont au plus le point z dans leurs supports. Si le polyèdre \tilde{P}_z est normal alors l'idéal I est normal.*

Démonstration. Fixons $e \in \mathbb{Z}_{>0}$. Déterminons un sous-ensemble générateur de $\overline{I^e}$. Pour tout vecteur $(m, i) \in M \times \mathbb{Z}$, posons

$$B_{(m,i)} := H^0(C, \mathcal{O}_C(-i \cdot z))\chi^m.$$

Si $m \in (eP) \cap M$ alors on a l'égalité

$$H^0(C, \mathcal{O}_C([\tilde{\mathfrak{D}}(m, e)]))\chi^m = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}, i \geq -h_{z,e}(m)} B_{(m,i)}$$

où $h_{z,e}(m) := h_{\tilde{\Delta}_z}(m, e)$. Donc l'idéal $\overline{I^e}$ est engendré par

$$\bigcup_{(m,i) \in (e\tilde{P}_z) \cap (M \times \mathbb{Z})} B_{(m,i)}.$$

Montrons que pour tout $(m, i) \in (e\tilde{P}_z) \cap (M \times \mathbb{Z})$, la partie $B_{(m,i)}$ est incluse dans I^e . Fixons un tel couple (m, i) . Par normalité de \tilde{P}_z , il existe

$$(m_1, i_1), \dots, (m_e, i_e) \in \tilde{P}_z \cap (M \times \mathbb{Z}) \text{ tels que } \sum_{j=1}^e (m_j, i_j) = (m, i).$$

Pour chaque $j = 1, \dots, e$, $B_{(m_j, i_j)}$ est contenu dans I . Puisque la multiplication

$$B_{(m_1, i_1)} \otimes \dots \otimes B_{(m_e, i_e)} \rightarrow B_{(m, i)}$$

est surjective, on a $B_{(m,i)} \subset I^e$. D'où le résultat. \square

Le théorème suivant se déduit du lemme précédent par localisation. Il peut être vu comme un analogue de l'assertion 3.6.

Théorème 5.3. *Supposons que C est affine. Soit $I \subset A = A[C, \mathfrak{D}]$ un idéal homogène intégralement clos et $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ le couple correspondant. Si pour tout point z appartenant au support de $\tilde{\mathfrak{D}}$, le polyèdre \tilde{P}_z est normal alors l'idéal I est normal. Pour tout entier $e \geq n := \dim N_{\mathbb{Q}}$, l'idéal $\overline{I^e}$ est normal. En particulier, tout idéal stable intégralement clos d'une \mathbf{k}^* -surface affine non elliptique est normal.*

Démonstration. Notons z_1, \dots, z_r les points distincts du support de $\tilde{\mathfrak{D}}$. Par le théorème des restes chinois, l'application

$$\pi : \mathbf{k}[C] \rightarrow \mathbf{k}^r, \quad f \mapsto (f(z_1), \dots, f(z_r))$$

est surjective. Soit (e_1, \dots, e_r) la base canonique de \mathbf{k}^r et pour $i = 1, \dots, r$, prenons f_i un élément de $\pi^{-1}(\{e_i\})$. Pour une fonction régulière $f \in \mathbf{k}[C]$, nous notons $C_f = C - V(f)$ son lieu de non annulation. Soient $f_{r+1}, f_{r+2}, \dots, f_s \in \mathbf{k}[C]$ tels que

$$U := C - \{z_1, \dots, z_r\} = \bigcup_{i=r+1}^s C_{f_i}.$$

Alors on a l'égalité

$$C = \bigcup_{i=1}^s C_{f_i}.$$

Considérons $z_{r+1}, z_{r+2}, \dots, z_s \in U$ des points tels que $f_i(z_i) \neq 0$ pour $i = r+1, \dots, s$. Fixons un entier $i \in \mathbb{N}$ tel que $1 \leq i \leq s$. Puisque \tilde{P}_{z_i} est un polyèdre entier normal, par le lemme 5.2, l'idéal

$$I_{f_i} := \bigoplus_{m \in P \cap M} H^0(C_{f_i}, \mathcal{O}_C([\tilde{\mathcal{D}}(m, 1)])) \chi^m = I \otimes_{\mathbf{k}[C]} \mathbf{k}[C_{f_i}] \subset A \otimes_{\mathbf{k}[C]} \mathbf{k}[C_{f_i}]$$

correspondant au couple $(P, \tilde{\mathcal{D}}|_{C_{f_i}})$ est normal. Donc nous avons

$$(11) \quad A[C_{f_i}, \tilde{\mathcal{D}}|_{C_{f_i}}] = \overline{(A \otimes_{\mathbf{k}[C]} \mathbf{k}[C_{f_i}])[I_{f_i}t]} = (A \otimes_{\mathbf{k}[C]} \mathbf{k}[C_{f_i}])[I_{f_i}t] = A[It] \otimes_{\mathbf{k}[C]} \mathbf{k}[C_{f_i}].$$

Écrivons

$$A[It] = \bigoplus_{(m,e) \in \tilde{\sigma}_{M \times \mathbb{Z}}^\vee} I_{(m,e)} \chi^{mte}$$

avec $I_{(m,e)} \subset \mathbf{k}(C)$, pour tout (m,e) . Alors par (11), le semi-groupe des poids de $A[It]$ est $\tilde{\sigma}_{M \times \mathbb{Z}}^\vee$. Cela implique que chaque $I_{(m,e)}$ est un idéal fractionnaire de $\mathbf{k}[C]$. Donc pour tout vecteur $(m,e) \in \tilde{\sigma}_{M \times \mathbb{Z}}^\vee$, il existe un diviseur de Weil entier $D_{(m,e)}$ sur C tel que

$$I_{(m,e)} = H^0(C, \mathcal{O}_C(D_{(m,e)})).$$

Comme

$$A[It] \otimes_{\mathbf{k}[C]} \mathbf{k}[C_{f_i}] = \bigoplus_{(m,e) \in \tilde{\sigma}_{M \times \mathbb{Z}}^\vee} H^0(C_{f_i}, \mathcal{O}_C(D_{(m,e)})) \chi^{mte},$$

on a d'une part,

$$\bigcap_{i=1}^s A[It] \otimes_{\mathbf{k}[C]} \mathbf{k}[C_{f_i}] = A[It]$$

et d'autre part,

$$\bigcap_{i=1}^s A[C_{f_i}, \tilde{\mathcal{D}}|_{C_{f_i}}] = A[C, \tilde{\mathcal{D}}],$$

on conclut par (11) que $A[It] = A[C, \tilde{\mathcal{D}}]$. Cela donne la normalité de I . Le reste de la preuve est une conséquence directe du théorème 3.6. \square

La prochaine assertion est une traduction combinatoire de [RRV, Proposition 3.1] via la correspondance du théorème 3.5.

Lemme 5.4. *Soit $n \in \mathbb{N}$ un entier, notons $\sigma^\vee = \mathbb{Q}_{\geq 0}^{n+1}$ et soit P un σ^\vee -polyèdre entier contenu dans σ^\vee . Alors les assertions suivantes sont équivalentes.*

- (i) *Le polyèdre est normal;*
- (ii) *Pour tout $s \in \{1, \dots, n\}$, on a l'égalité $(sP) \cap \mathbb{Z}^{n+1} = E_{[s,P]}$ (voir 3.2).*

Comme application du théorème 5.3, nous obtenons une caractérisation de la normalité pour une classe d'idéaux de l'algèbre des polynômes.

Corollaire 5.5. *Soit $n \in \mathbb{Z}_{>0}$. Considérons l'algèbre des polynômes $\mathbf{k}^{[n+1]} = \mathbf{k}[x_0, x_1, \dots, x_n]$ à $n + 1$ variables munie de la \mathbb{Z}^n -graduation*

$$\mathbf{k}^{[n+1]} = \bigoplus_{(m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{N}^n} \mathbf{k}[x_0] x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n}$$

et soit I un idéal homogène de A . Alors les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) L'idéal I est normal;
- (ii) Pour tout $e \in \{1, \dots, n\}$, l'idéal I^e est intégralement clos.

Démonstration. Posons $C := \mathbb{A}^1 = \text{Spec } \mathbf{k}[x_0]$, $\sigma := \mathbb{Q}_{\geq 0}^n$ et $M := \mathbb{Z}^n$. Considérons le diviseur σ -polyédral \mathfrak{D} sur la courbe C dont l'évaluation est identiquement nulle. Alors on a $\mathbf{k}^{[n+1]} = A = A[C, \mathfrak{D}]$.

Montrons l'implication (ii) \Rightarrow (i). Soit $(P, \tilde{\mathfrak{D}})$ le couple correspondant à l'idéal I . Notons z_1, \dots, z_r les points distincts du support de $\tilde{\mathfrak{D}}$. Pour $i = 1, \dots, r$, considérons le polynôme

$$f_i(x_0) = \prod_{j \neq i} (x_0 - z_j).$$

Alors pour tout i , nous avons

$$I_{f_i} := I \otimes_{\mathbf{k}[C]} \mathbf{k}[C_{f_i}] = \bigoplus_{(m, e) \in \tilde{P}_{z_i} \cap (M \times \mathbb{Z})} \mathbf{k} \left[\frac{1}{f_i} \right] (x_0 - z_i)^e \chi^m$$

où pour $m = (m_1, \dots, m_n)$, $\chi^m := x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n}$. Fixons $s \in \{1, \dots, n\}$. Alors on a d'une part,

$$I_{f_i}^s = \bigoplus_{(m, e) \in E_{[s, \tilde{P}_{z_i}]}} \mathbf{k} \left[\frac{1}{f_i} \right] (x_0 - z_i)^e \chi^m$$

et d'autre part,

$$\overline{I_{f_i}^s} = \bigoplus_{m \in (sP) \cap M} H^0(C_{f_i}, \mathcal{O}([\tilde{\mathfrak{D}}(m, e)])) \chi^m = \bigoplus_{(m, e) \in (s\tilde{P}_{z_i}) \cap (M \times \mathbb{Z})} \mathbf{k} \left[\frac{1}{f_i} \right] (x_0 - z_i)^e \chi^m,$$

comparer avec [HS, Proposition 1.1.4]. Puisque I^s est intégralement clos, l'idéal $I_{f_i}^s \subset A_{f_i}$ l'est encore. Ce qui donne par les égalités précédentes,

$$(s\tilde{P}_{z_i}) \cap (M \times \mathbb{Z}) = E_{[s, \tilde{P}_{z_i}]}.$$

En appliquant le lemme 5.4, on déduit que \tilde{P}_{z_i} est normal. Par le théorème 5.3, on obtient que I est normal. D'où l'implication (ii) \Rightarrow (i). La réciproque est aisée. \square

Références

- [AH] K. Altmann, J. Hausen. *Polyhedral divisors and algebraic torus actions*. Math. Ann. **334**. (2006). 557-607.
- [AHS] K. Altmann, J. Hausen, H. Süß. *Gluing affine torus actions via divisorial fans*. Transform. Groups. **13**. (2008). 215-242.
- [AOPSV] K. Altmann, N. Owen Ilten, L. Petersen, H. Süß, R. Volmert. *The geometry of T-varieties*. arxiv : 1102.5760. (2011). 42p.
- [AFKKZ] I. Arzhantsev, H. Flenner, S. Kaliman, F. Kutzschebauch, M. Zaidenberg. *Flexible varieties and automorphism groups*. arxiv : 10011.5375. (2001). 41p.
- [AKZ] I.V. Arzhantsev, K. Kuyumzhiyan, M. Zaidenberg. *Flag varieties, toric varieties, and suspensions : three instances of infinite transitivity*. Sb. Mat. (à paraître) ; arxiv : 1003.3164. (2010). 25p.
- [AL] I.V. Arzhantsev, A. Liendo. *Polyhedral divisors and SL_2 -actions on affine T-varieties*. arxiv : 1105.4494. (2011). 26p.
- [Br] M. Brion. *Sur la géométrie des variétés sphériques*. Comment. Math. Helv. **66**. (1991). 237-262.
- [BGN] W. Bruns, J. Gubeladze, T. Ngô Việt. *Normal polytopes, triangulations, and Koszul algebras*. J. Reine Angew. Math. **485**. (1997). 123-160.
- [CLS] D. Cox, J. Little, H. Schenck. *Toric Varieties*. Graduate Studies in Mathematics. AMS. **124**. (2011).
- [Da] V.I. Danilov. *The Geometry of Toric Varieties*. Russian Math. Surveys. **33**. (1978). 97-154.
- [De] M. Demazure. *Anneaux gradués normaux*. Trav. Cours 37. (1988). 35-68.
- [Du] A. Dubouloz. *Quelques remarques sur la notion de modification affine*. arxiv : 0503142. (2005). 5p.
- [FZ] H. Flenner, M. Zaidenberg. *Normal affine surfaces with \mathbb{C}^* -actions* Osaka J.Math. **40**. (2003). 981-1009.
- [Fu] W. Fulton. *Introduction to toric varieties*. Princeton University Press. **131**. (1993).
- [Ha] R. Hartshorne. *Algebraic Geometry*. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag. **52**. (1977).
- [Ho] M. Hochster. *Rings of invariants of tori, Cohen-Macaulay rings generated by monomials and Polytopes*. Ann. of Math. **96**. (1972). 318-337.
- [HS] C. Huneke, I. Swanson. *Integral Closure of Ideals, Rings and Modules*. Polycopié : <http://people.reed.edu/~iswanson/book/>.
- [KZ] S. Kaliman, M. Zaidenberg. *Affine modifications and affine hypersurfaces with a very transitive automorphism group*. Transform. Groups. **4**. (1999). 53-95.
- [KKMS] G. Kempf, F. Knudsen, D. Mumford, and B. Saint-Donat. *Toroidal embeddings. I*. Lecture Notes in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin. **339**. (1973).
- [LeTe] M. Lejeune-Jalabert, B. Teissier. *Clôture intégrale des idéaux et equisingularité*. Séminaire Lejeune-Teissier, Centre de Mathématiques École Polytechnique. (1974).
- [Li] A. Liendo. *Affine T-varieties of complexity one and locally nilpotent derivations*. Transform. Groups. **15**. (2010). 389-425.
- [LS] A. Liendo, H. Süß. *Normal Singularities with Torus Actions*. arxiv : 1005.2462. (2010). 23p.
- [LV] D. Luna, T. Vust. *Plongements d'espaces homogènes*. Comment. Math. Helv. **58**. (1983). 186-245.
- [NR] D.G. Northcott, D. Rees. *Reductions of ideals in local rings*. Proc. Cambridge. Philos. Soc. **50**. (1954). 145-158.
- [Od] T. Oda. *Convex Bodies and Algebraic Geometry. An Introduction to the Theory of Toric Varieties*. Springer-Verlag, Berlin. **131**. (1985).
- [RRV] L. Reid, L. G. Roberts, M. A. Vitulli. *Some results on normal homogeneous ideals*. Comm. in Alg. **31**. (2003). 4485-4506.
- [Ri] P. Ribenboim. *Anneaux de Rees intégralement clos*. J.Reine Angew. Math. **204**. (1960). 99-107.

- [Ti] D. Timashev. *Torus actions of complexity one*. In : Toric topology. Contemp. Math. AMS. **60**. (2008). 349-364.
- [Ti 2] D. Timashev. *Classification of G -manifolds of complexity 1*. Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat. **61**. (1997). 127-162.
- [Vie] E. Viehweg. *Rational singularities of higher dimensional schemes*. Proc. Amer. Soc. **63**. (1977). 6-8.
- [Vit] M. A. Vitulli. *Some normal monomial ideals*. Contemp. Math. **324**. (2003). 205-217.
- [Va] W. Vasconcelos. *Integral closure : Rees algebras, multiplicities, algorithms*. Springer. Monographs in Mathematics. XII. (2005). 519p.
- [Vo] R. Vollmert. *Toroidal embeddings and polyhedral divisors*. arxiv : 0707.0917. (2007). 5p.
- [ZS] O. Zariski, P. Samuel. *Commutative Algebra*. Van Nostrand, Princeton. Vol. II. (1960).

Adresse :

Université Grenoble I, Institut Fourier,
UMR 5582 CNRS-UJF, BP 74,
38402 St. Martin d'Hères cédex, France.

Courriel :

Kevin.Langlois@ujf-grenoble.fr.