



Une démonstration du théorème de Catalan-Mihailescu et généralisation à la conjecture de Pilai

Jamel Ghannouchi

► To cite this version:

Jamel Ghannouchi. Une démonstration du théorème de Catalan-Mihailescu et généralisation à la conjecture de Pilai. 2012. hal-00695280v14

HAL Id: hal-00695280

<https://hal.science/hal-00695280v14>

Preprint submitted on 2 Jul 2012 (v14), last revised 31 Jan 2013 (v22)

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Une démonstration du théorème de Catalan-Mihailescu et généralisation à la conjecture de Pillai

Jamel Ghanouchi

jamel.ghanouchi@topnet.tn

Résumé

(MSC=11D04) Plus d'un siècle après sa formulation par le mathématicien Belge Eugene Catalan, Preda Mihailescu a résolu le problème demeure jusque-là ouvert. Mais, est-ce tout ? On est en droit de se poser la question parce que la solution de Mihailescu utilise abondamment le calcul sur machines. Quoique l'on pense sur l'aide apportée par les machines au travail humain, la question qui se pose reste celle de l'existence d'une preuve totalement algébrique. En fait, nous proposons dans ce travail une telle démonstration qui en plus simplifie largement la question et la met sur une autre orbite, celle des théorèmes les plus fameux de la théorie des nombres. Notre preuve est élémentaire et répond à une quête inscrite sciemment dans nos travaux de recherche. Car le problème de Catalan, même s'il est résolument moderne, plonge ses racines dans le moyen-âge d'il y a mille ans. C'est à cette époque-là en effet que l'énigme est née avec Levy Ben Gershom. Si le présent travail s'avère concluant, on pourra en effet dire que l'énigme aurait pu être résolue dès le XII^{ème} siècle. Telle est la gageure et le but de ce mémoire : présenter une solution assez élémentaire pour qu'elle eut pu être trouvée il y a environ mille ans. Car cette énigme, au-delà de son intérêt mathématique intrinsèque est l'une des plus anciennes et des plus captivantes de l'humanité. Cependant, aussi intéressant que soit ce résultat, il ne suffit pas car nous avons généralisé l'approche aux équations de Pillai et démontré qu'elles ont un nombre fini de solutions. (Keywords : Equations diophantiennes ; équation de Pillai ; équation de Catalan ; Résolution Algébrique)

Abstract

(MSC=11D04) More than one century after its formulation by the Belgian mathematician Eugene Catalan, Preda Mihailescu has solved the open problem. But, is it all ? Mihailescu's solution utilizes computation on machines, we propose here not really a proof as it is intended classically, but a resolution of an equation like the resolution of the polynomial equations of third and fourth degrees. This solution is totally algebraic and does not utilize, of course, computers or any kind of calculation. Then, we generalize the proof to Pillai conjecture.

(Keywords : Diophantine equations ; Catalan equation ; Pillai conjecture ; Algebraic resolution)

L'approche

L'équation de Catalan est $Y^p = X^q + 1$ et se formule par y a-t-il deux puissances pures consécutives ? Posons donc avec p, q, X, Y tous des entiers strictement supérieurs à 1.

$$c = \frac{X^p - 1}{Y^{\frac{p}{2}}}, \quad c' = \frac{7 - X^p}{Y^{\frac{p}{2}}}$$

Et

$$(c + c')Y^{\frac{p}{2}} = X^p - 1 + 7 - X^p = 6 \Rightarrow Y^{\frac{p}{2}} = \frac{6}{c + c'}$$

Soit

$$X^p = cY^{\frac{p}{2}} + 1 = \frac{6c}{c + c'} + 1 = \frac{7c + c'}{c + c'}$$

Donc

$$X^q = Y^p - 1 = \frac{36 - (c + c')^2}{(c + c')^2}$$

Mais aussi

$$(c + c')Y^{\frac{p}{2}} = 6 > 0$$

Ainsi $c + c' > 0$. Et aussi

$$cY^{\frac{p}{2}} = X^p - 1 > 0$$

Soit $c > 0$. Or $X^p \geq 4$, donc

$$cY^{\frac{p}{2}} = X^p - 1 \geq 7 - X^p = c'Y^{\frac{p}{2}}$$

Et $c \geq c'$

$$7 - X^p = 7 - \frac{7c + c'}{c + c'} = \frac{6c'}{c + c'}$$

Si

$$c' > 0$$

Alors $X^p < 7$ et nous aurions $X^p = 4$, nous supposons donc $c' < 0$, avec

$$(c + c')Y^{\frac{p}{2}} = 6 > 0$$

$$(c + c')X^p = 7c + c' > 0$$

avec $c + c' > 0$. Et

$$Y^{\frac{p}{2}} = \frac{6}{c + c'} \geq 3 \Rightarrow c + c' \leq 2$$

Résultats importants Retenons que

$$1) c' < 0$$

$$2) 0 < c + c' < 2$$

$$3) 0 < 7c + c'$$

Et nous allons étudier deux cas $I) c^2 > 1$

$$II) c^2 \leq 1$$

$c^2 > 1$ Nous avons

$$X^q - X^{2p} = \frac{36 - (c + c')^2 - (7c + c')^2}{(c + c')^2} < \frac{(6 - 6c)(6 + 6c) - (c + c')^2}{(c + c')^2} < 0$$

Donc

$$q \leq 2p - 1$$

Et

$$c^2 X^q - X^{2p} = \frac{36c^2 - c^2(c + c')^2 - (7c + c')^2}{(c + c')^2} = \frac{-(c + c')(13c + c') - c^2(c + c')^2}{(c + c')^2} < 0$$

Et

$$\begin{aligned} 2c^2 X^q - X^{2p} &= \frac{72c^2 - 2c^2(c + c')^2 - (7c + c')^2}{(c + c')^2} \\ &> \frac{64c^2 - (7c + c')^2}{(c + c')^2} = \frac{(c - c')(15c + c')}{(c + c')^2} > 0 \end{aligned}$$

Donc

$$2c^2 > X^{2p-q} \geq X$$

On en déduit

$$2c^2 > X$$

Maintenant supposons $c^2 < X$ alors

$$2X > 2c^2 > X^{2p-q} \Rightarrow 1 \geq \frac{2}{X} > X^{2p-q-2}$$

Et comme q n'est pas pair $q + 1 = 2p$ donc soit $c^2 > X$ et prenons la récurrence $c^2 > 2^{m-1}X$ Alors soit m tel que $c^2 < 2^m X$ et

$$2^{m+1}X > 2c^2 > X^{2p-q} > 2^m X > c^2$$

Ou encore

$$2^{m+1} > X^{2p-q-1} > 2^m$$

Si X est pair, cela signifie que $X = 2$ et $2p - q - 1 = m$ Alors

$$c^2 < 2^m X = 2^{2p-q} < 2c^2 < 2^{m+1} = 2^{2p-q}$$

Donc

$$2c^2 = 2^{2p-q}$$

Et

$$2^{2p-q-1} = c^2 = \frac{2^{2p} - 2^{p+1} + 1}{2^q + 1}$$

Si $2p - q - 1 \neq 0$ alors

$$2^{2p-q-1}(2^q + 1) = 2^{2p} - 2^{p+1} + 1$$

nous avons d'un côté un nombre pair, de l'autre un impair, ce n'est possible que pour $2p = q + 1$, alors $c^2 = 1$ Et

$$c^2 - 1 = 2^{2p} - 2^{p+1} - 2^q = 0 \Rightarrow 2^{p-1} - 1 - 2^{q-p-1} = 0 \Rightarrow q = p + 1 = 3$$

Et l'équation de Catalan devient

$$Y^2 = 2^3 + 1 \Rightarrow Y = \pm 3$$

$c^2 \leq 1$ Nous avons

$$2X^q - X^{2p} = \frac{72 - 2(c + c')^2 - (7c + c')^2}{(c + c')^2} > \frac{64 - 49c^2}{(c + c')^2} > 0$$

Donc

$$q \geq 2p - 1$$

Et

$$c^2 X^q - X^{2p} = \frac{36c^2 - c^2(c + c')^2 - (7c + c')^2}{(c + c')^2} = \frac{-(c + c')(13c + c') - c^2(c + c')^2}{(c + c')^2} < 0$$

Et

$$\begin{aligned} 2c^2 X^q - X^{2p} &= \frac{72c^2 - 2c^2(c + c')^2 - (7c + c')^2}{(c + c')^2} \\ &> \frac{64c^2 - (7c + c')^2}{(c + c')^2} = \frac{(c - c')(15c + c')}{(c + c')^2} > 0 \end{aligned}$$

Mais ici aussi

$$X^{-1} \leq X^{q-2p} < \frac{1}{c^2}$$

Donc si

$$\begin{aligned} \frac{1}{2c^2} &< \frac{1}{X} \\ X^{q-2p} &< \frac{2}{X} \end{aligned}$$

Et comme q n'est pas pair, cela signifie $q + 1 = 2p$ donc $\frac{1}{2c^2} > \frac{1}{X}$ soit m tel que

$$\frac{1}{2c^2} < \frac{1}{2^m X}$$

Alors

$$\frac{1}{2c^2} < \frac{1}{2^m X} < X^{q+1-2p} < \frac{1}{c^2} < \frac{1}{2^{m-1} X}$$

Donc

$$2^{-m} < X^{q+2-2p} < 2^{1-m}$$

Donc $X = 2$ et $2p - q - 1 = m$ ou

$$2^{q+1-2p} < \frac{1}{c^2} < \frac{1}{2^{m-1}X} = \frac{1}{2^{2p-q-1}}$$

Donc

$$\frac{1}{c^2} = 2^{q+1-2p} = \frac{2^q + 1}{2^{2p} - 2^{p+1} + 1}$$

C'est possible si $q + 1 = 2p$ alors

$$2^{2p-1} - 1 = 2^{q-p-1} \Rightarrow q = p + 1 = 3$$

L'équation devient

$$Y^2 = 2^3 + 1 \Rightarrow Y = \pm 3$$

Généralisation à l'équation de Pillai

L'équation de Pillai est $Y^p = X^q + a$ et se formule par : y a-t-il un nombre fini de couples de puissances pures séparées par un nombre entier a ? Nous allons définir les nombres de Pillai : ce sont des nombres que nous notons comme suit b_a qui dépendent de a et qui se comportent tout à fait comme b pour $a = 1$. Ainsi, nous écrirons $1_a + 7_a = 8_a$ et $7_a - 1_a = 6_a$: notre but est de suivre pas à pas l'approche adoptée pour l'équation de Catalan pour laquelle $a = 1$. Nous avons bien entendu $1_a = a_1$ et $0_a = 0$. L'équation devient donc $Y^p = X^q + 1_a$. Posons donc avec p, q, X, Y tous des entiers strictement supérieurs à 1_a .

$$c = \frac{X^p - 1_a}{Y^{\frac{p}{2}}}, \quad c' = \frac{7_a - X^p}{Y^{\frac{p}{2}}}$$

Et

$$(c + c')Y^{\frac{p}{2}} = X^p - 1_a + 7_a - X^p = 6_a \Rightarrow Y^{\frac{p}{2}} = \frac{6_a}{c + c'}$$

Soit

$$X^p = cY^{\frac{p}{2}} + 1_a = \frac{6_ac}{c + c'} + 1_a = \frac{7_ac + 1_ac'}{c + c'}$$

Donc

$$X^q = Y^p - 1_a = \frac{36_a 1_a - 1_a(c + c')^2}{(c + c')^2}$$

Mais aussi

$$(c + c')Y^{\frac{p}{2}} = 6_a > 0$$

Ainsi $c + c' > 0$. Et aussi

$$cY^{\frac{p}{2}} = X^p - 1_a > 0$$

Soit $c > 0$. Or $X^p \geq 4_a$, donc

$$cY^{\frac{p}{2}} = X^p - 1_a \geq 7_a - X^p = c'Y^{\frac{p}{2}}$$

Et $c \geq c'$

$$7_a - X^p = 7_a - \frac{7_ac + 1_ac'}{c + c'} = \frac{6_ac'}{c + c'}$$

Si

$$c' > 0$$

Alors $X^p < 7_a$ et nous aurions un nombre fini de solutions, nous supposons donc $c' < 0$, avec

$$(c + c')Y^{\frac{p}{2}} = 6_a > 0$$

$$(c + c')X^p = 7_ac + 1_ac' > 0$$

avec $c + c' > 0$. Et

$$Y^{\frac{p}{2}} = \frac{6_a}{c + c'} \geq 3_a \Rightarrow c + c' \leq 2 < 2_a$$

Résultats importants Retenons que

1) $c' < 0$

2) $0 < c + c' < 2_a$

3) $0 < 7_ac + 1_ac'$

Et nous allons étudier deux cas I) $c^2 > 1_a$

II) $c^2 \leq 1_a$

$c^2 > 1_a$ Nous avons

$$1_a X^q - X^{2p} = \frac{36_a 1_a 1_a - 1_a(c + c')^2 - (7_ac + 1_ac')^2}{(c + c')^2} < \frac{36_a 1_a(1_a - c^2) - 1_a(c + c')^2}{(c + c')^2} < 0$$

Donc $X^{q-2p} < \frac{1}{1_a} < 1$ et

$$q \leq 2p - 1$$

Et

$$c^2 X^q - X^{2p} = \frac{36_a 1_a c^2 - c^2(c + c')^2 - (7_ac + 1_ac')^2}{(c + c')^2} = \frac{-1_a 1_a(c + c')(13c + c') - c^2(c + c')^2}{(c + c')^2} < 0$$

Et

$$\begin{aligned} 2c^2 X^q - X^{2p} &= \frac{72_a 1_a c^2 - 2c^2(c + c')^2 - (7_ac + 1_ac')^2}{(c + c')^2} \\ &> \frac{64_a 1_a c^2 - (7_ac + 1_ac')^2}{(c + c')^2} = \frac{1_a 1_a(c - c')(15c + c')}{(c + c')^2} > 0 \end{aligned}$$

Donc

$$2c^2 > X^{2p-q} \geq X$$

On en déduit

$$2c^2 > X$$

Maintenant supposons $c^2 < X$

$$2X > c^2 > X^{2p-q} \Rightarrow 1 \geq \frac{2}{X} > X^{2p-q-2}$$

Et comme q n'est pas pair $q + 1 = 2p$ donc soit $c^2 > X$ et prenons la récurrence $c^2 > 2^{m-1}X$ avec m tel que $c^2 < 2^m X < X^{2p-q}$ et

$$2^{m+1}X > c^2 > X^{2p-q} > 2^m X > c^2$$

Ou encore

$$2^{m+1} > X^{2p-q-1} > 2^m$$

Si X est pair, cela signifie que $X = 2$ et $2p - q - 1 = m$ Alors

$$c^2 < 2^m X = 2^{2p-q} < 2c^2 < 2^{m+1} = 2^{2p-q}$$

Donc

$$2c^2 = 2^{2p-q}$$

Et

$$2^{2p-q-1} = c^2 = \frac{2^{2p} - 1_a 2^{p+1} + 1_a 1_a}{2^q + 1_a}$$

Alors

$$2^{2p-q-1}(2^q + 1_a) = 2^{2p} - 1_a 2^{p+1} + 1_a 1_a$$

nous avons d'un côté un nombre pair, de l'autre un impair, ce n'est possible que pour $2p = q + 1$, et il y a un nombre fini de solutions !

$c^2 \leq 1$ Nous avons

$$2_a X^q - X^{2p} = \frac{72_a 1_a 1_a - 2_a (c + c')^2 - (7_a c + 1_a c')^2}{(c + c')^2} > \frac{64_a 1_a 1_a - 49_a 1_a c^2}{(c + c')^2} > 0$$

Donc

$$q \geq 2p - 1$$

Et

$$c^2 X^q - X^{2p} = \frac{36_a 1_a c^2 - c^2 (c + c')^2 - (7_a c + 1_a c')^2}{(c + c')^2} = \frac{-1_a 1_a (c + c')(13c + c') - c^2 (c + c')^2}{(c + c')^2} < 0$$

Et

$$\begin{aligned} 2c^2 X^q - X^{2p} &= \frac{72_a 1_a c^2 - 2c^2 (c + c')^2 - (7_a c + 1_a c')^2}{(c + c')^2} \\ &> \frac{64_a 1_a c^2 - (7_a c + 1_a c')^2}{(c + c')^2} = \frac{1_a 1_a (c - c')(15c + c')}{(c + c')^2} > 0 \end{aligned}$$

Mais ici aussi

$$X^{-1} \leq X^{q-2p} < \frac{1}{c^2}$$

Donc si

$$\begin{aligned} \frac{1}{2c^2} &< \frac{1}{X} \\ X^{q-2p} &< \frac{2}{X} \end{aligned}$$

Et comme q n'est pas pair, cela signifie $q + 1 = 2p$ donc $\frac{1}{2c^2} > \frac{1}{X}$ soit m tel que

$$\frac{1}{2c^2} < \frac{1}{2^m X} < X^{q+1-2p}$$

Alors

$$\frac{1}{2c^2} < \frac{1}{2^m X} < X^{q+1-2p} < \frac{1}{c^2} < \frac{1}{2^{m-1} X}$$

Donc

$$2^{-m} < X^{q+2-2p} < 2^{1-m}$$

Donc $X = 2$ et $2p - q - 1 = m$ ou

$$2^{q+1-2p} < \frac{1}{c^2} < \frac{1}{2^{m-1} X} = \frac{1}{2^{2p-q-1}}$$

Donc

$$\frac{1}{c^2} = 2^{q+1-2p} = \frac{2^q + 1_a}{2^{2p} - 1_a 2^{p+1} + 1_a 1_a}$$

C'est possible si $q + 1 = 2p$ et il y a un nombre fini de solutions ! Dans tous les cas, l'équation de Pillai, à l'instar de celle de Catalan qui n'en a qu'une seule, a un nombre fini de solutions !

Conclusion

L'équation de Catalan est ainsi résolue, et une solution aussi originale que élémentaire est possible ! Nous l'avons d'ailleurs généralisée à l'équation de Pillai et prouvé qu'elle a un nombre fini de solutions ! Il semble que de nombreux problèmes de théorie des nombres peuvent d'ailleurs être ainsi résolus ! Nous espérons avoir montré la voie !

Références

- [1] P. MIHAILESCU A class number free criterion for catalan's conjecture, *Journal of Number theory* , **99** (2003).