



Entrelacements de semi-groupes provenant de paires de Gelfand

Philippe Biane

► To cite this version:

Philippe Biane. Entrelacements de semi-groupes provenant de paires de Gelfand. ESAIM: Probability and Statistics, 2011, 15 (-), pp.S2-S10. 10.1051/ps/2010025 . hal-00846321

HAL Id: hal-00846321

<https://hal.science/hal-00846321>

Submitted on 18 Jul 2013

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Entrelacements de semi-groupes provenant de paires de Gelfand.

Philippe Biane

ABSTRACT. On donne des exemples d'entrelacements entre semi-groupes Markoviens obtenus au moyen de considérations de théorie des groupes sur les paires de Gelfand.

1. Introduction

La notion d'entrelacement de noyaux Markoviens, ou de semi-groupes de tels noyaux, a fait l'objet de plusieurs travaux de Marc Yor et ses collaborateurs [6], [12]. Elle s'est révélée très utile dans plusieurs problèmes concernant les processus stochastiques, on pourra voir par exemple [8], [13] et [14] pour plusieurs développements récents. Deux noyaux Markoviens $P(x, dy)$ et $Q(u, dv)$ sur deux espaces X et Y sont dits entrelacés par un noyau $\Lambda(v, dx)$ sur $Y \times X$, si on a

$$\Lambda P = Q \Lambda.$$

Deux semi-groupes de noyaux Markoviens sont entrelacés si cette relation a lieu, avec le même Λ , pour tous les temps. L'exemple le plus connu d'entrelacement est sans doute celui du mouvement Brownien et du processus de Bessel de dimension 3, qui joue un rôle important dans le théorème de Pitman. Le but de cet article est de donner quelques nouveaux exemples intéressants d'entrelacements de processus, obtenus par des considérations de théorie des groupes que j'ai déjà évoquées auparavant [3]. Afin de motiver ces considérations je vais tout d'abord décrire dans ce langage le cas bien connu des processus de Bessel. On peut obtenir un entrelacement entre deux semi-groupes par couplage, en réalisant les deux processus de Markov que l'on cherche à entrelacer comme projections d'un processus de Markov sur un espace plus gros. On considère ainsi un mouvement Brownien de dimension d . Si on regarde une de ses coordonnées, on obtient un mouvement Brownien unidimensionnel, tandis que si l'on observe sa norme, on obtient un processus de Bessel (de dimension d). On peut définir deux applications naturelles. La première associe à une fonction sur $\mathbf{R}$ une fonction sur $\mathbf{R}^d$: à f définie sur $\mathbf{R}$ correspond la fonction $f(x_1)$ qui ne dépend que de la première coordonnée. La seconde prend une fonction sur $\mathbf{R}^d$ et calcule sa moyenne sous l'action du groupe des rotations de $\mathbf{R}^d$. On obtient ainsi une fonction radiale, que l'on considère comme fonction sur $\mathbf{R}_+$. La composée de ces deux applications transforme donc une fonction sur $\mathbf{R}$ en une fonction sur $\mathbf{R}_+$ et elle est donnée par un noyau Markovien Λ , qui entrelace

les semi-groupes du mouvement Brownien et du processus de Bessel, soit en notant P_t le semi-groupe du mouvement Brownien et R_t^d celui processus de Bessel de dimension d ,

$$\Lambda P_t = R_t^d \Lambda.$$

En fait le noyau Markovien se calcule très facilement, il s'agit du noyau

$$\Lambda(r, dx) = \frac{1}{r^{d-1} v_{d-1}} (r^2 - x^2)^{(d-3)/2} dx \quad 0 \leq x \leq r$$

v_{d-1} étant le volume de la sphère unité dans $\mathbf{R}^d$; cette mesure de probabilités est la loi de la première coordonnée d'un point tiré au hasard sur une sphère de rayon r , avec la loi uniforme.

Plus généralement, supposons que P_t et Q_t sont des semi-groupes sur des espaces X et Y et que l'on dispose d'un couplage, c'est à dire un processus Z sur un espace Z , de semi-groupe S_t , qui admet les deux processus que l'on cherche à entrelacer comme marginales. Autrement dit, il existe des applications

$$u : Z \rightarrow X, \quad v : Z \rightarrow Y$$

telles que $u(Z_t)$ soit un processus de Markov de semi-groupe P_t et $v(Z_t)$ un processus de Markov de semi-groupe Q_t . Si on désigne encore par u et v les applications qui à une fonction sur X (ou Y) associent la fonction $f \circ u$ (ou $f \circ v$) sur Z , on a alors les relations

$$(1.1) \quad u \circ P_t = S_t \circ u \quad v \circ Q_t = S_t \circ v$$

On ne peut en général en tirer plus. Le point crucial dans la construction de l'entrelacement entre Bessel et Brownien est qu'il existe un groupe compact K (le groupe des rotations dans le cas du Bessel) agissant sur l'espace Z , sous l'action duquel le semi-groupe est invariant. Notons I_K l'application

$$f \mapsto \int_K f \circ k \, dk$$

de moyennisation par rapport à l'action de K , où dk désigne la mesure de Haar sur K . Une fonction invariante par l'action de K sur Z s'identifie avec une fonction sur l'espace des orbites Z/K . Si $Y \sim Z/K$ et si

$$(1.2) \quad I_K \circ S_t = Q_t \circ I_K$$

alors on déduit de (1.1) et (1.2) que le noyau $\Lambda = u \circ I_K$ entrelace les semi-groupes P_t et Q_t

$$\Lambda P_t = Q_t \Lambda.$$

Dans [3] j'ai proposé une version non commutative de cette construction, c'est-à-dire la construction d'un "couplage non commutatif" entre deux semi-groupes sur des espaces adéquats, qui permet d'obtenir des entrelacements remarquables. Je vais la rappeler dans la partie suivante, puis donner les exemples.

2. Une construction de théorie des groupes.

Soit G un groupe localement compact et K un sous-groupe compact, le groupe K agit par translations à droite et à gauche sur l'ensemble des mesures signées finies sur G . On note $M(G)$ l'ensemble des mesures boréliennes finies, signées, sur

G . C'est une algèbre pour le produit de convolution. On note $M^K(G)$ l'ensemble des mesures sur G qui sont biinvariantes par K , autrement dit, qui vérifient

$$\mu = \delta_{k_1} * \mu * \delta_{k_2}$$

pour tous $k_1, k_2 \in K$, δ_k étant la masse de Dirac en k et $*$ le produit de convolution. C'est une sous-algèbre de $M(G)$, et on dit que (G, K) est un couple de Gelfand si elle est commutative. L'étude des couples de Gelfand est un chapitre important de l'analyse harmonique et de la théorie des représentations, voir par exemple [9] pour un exposé introductif.

On considère maintenant un semi-groupe multiplicatif de fonctions de type positif sur G . Je donnerai des exemples en temps discret et en temps continu. En temps discret un tel semi-groupe est donné par les puissances positives d'une fonction de type positif φ sur G , biinvariante par K et telle que $\varphi(e) = 1$. En temps continu, on prend ψ une fonction sur G , continue, conditionnellement de type négatif, biinvariante par K , telle que $\psi(0) = 0$. Elle engendre un semi-groupe multiplicatif $\exp(t\psi); t \geq 0$ formé de fonctions de type positif. Un tel semi-groupe, en temps discret ou continu, agissant par multiplication sur $M(G)$, induit un semi-groupe d'applications complètement positives Z_t de $M(G)$ dans lui-même. La notion d'application complètement positive vient de la théorie des algèbres d'opérateurs, il s'agit d'un analogue non commutatif de la notion de noyau Markovien, mais il n'y a pas besoin de savoir précisément ce que signifie ce terme pour comprendre la suite. La seule chose que nous utiliserons est le fait que si une sous-algèbre commutative est invariante par le semi-groupe, alors la restriction de ce semi-groupe est donnée par des noyaux Markoviens. Le semi-groupe Z_t est l'analogue du semi-groupe sur le "gros" espace Z de l'introduction, l'espace Z lui-même n'existe pas, ou plutôt il existe en tant qu'"espace non commutatif". On va maintenant décrire les espaces X et Y de l'introduction. Considérons tout d'abord un sous-groupe commutatif fermé T de G . Les mesures portées par T forment une sous-algèbre commutative de $M(G)$, isomorphe à $M(T)$. Cette algèbre peut se compléter en une C^* -algèbre commutative qui, d'après le théorème de Gelfand-Naimark, admet un spectre, i.e. est isomorphe à l'algèbre des fonctions continues et nulles à l'infini sur un espace topologique localement compact $sp(T)$. En fait ici, par la théorie de Fourier, $sp(T)$ n'est autre que $\hat{T}$, le groupe dual de T . La restriction de la fonction $\exp(t\psi)$ (ou de φ^n en temps discret) à T est la transformée de Fourier d'une mesure de probabilités sur $\hat{T}$, et ces mesures de probabilités, pour $t \geq 0$ forment un semi-groupe de convolution sur $\hat{T}$, que nous noterons P_t . Ici l'indice t est discret ou continu, suivant le cas. Le processus correspondant est donc une marche aléatoire sur le dual de T . L'espace $\hat{T}$ est ici notre espace X , il reste à exhiber l'espace Y . Comme (G, K) est une paire de Gelfand, la sous-algèbre $M^K(G)$ est commutative. Sa complétion est de nouveau isomorphe à l'algèbre des fonctions continues et nulles à l'infini sur un espace topologique localement compact Ω , le spectre de la paire de Gelfand. En fait Ω s'identifie avec l'ensemble des fonctions sphériques de type positif de la paire (G, K) , c'est-à-dire les fonctions de type positif φ sur G qui sont biinvariantes par K et qui définissent des caractères de l'algèbre $M^K(G)$ par la formule $\mu \rightarrow \mu(\varphi)$. C'est l'ensemble Ω qui sera l'espace Y . Comme la fonction ψ est biinvariante par K , la multiplication par $\exp(t\psi)$ envoie $M^K(G)$ sur elle-même, et préserve la positivité (au sens des opérateurs), elle correspond donc à un noyau Markovien sur le spectre

de la paire de Gelfand. Ce noyau Markovien $Q_t(\omega, d\xi)$ est caractérisé par l'égalité

$$\exp(t\psi)\varphi_\omega = \int_{\Omega} \varphi_\xi Q_t(\omega, d\xi)$$

qui exprime la décomposition de la fonction de type positif $\exp(t\psi)\varphi_\omega$ en combinaison convexe de fonction sphériques.

On dispose d'une projection de $M(G)$ sur $M^K(G)$, qui est donnée par la moyenne de l'action de K , soit

$$I_K : M(G) \rightarrow M^K(G); \quad \mu \mapsto \int_{K \times K} \delta_{k_1} * \mu * \delta_{k_2} dk_1 dk_2.$$

L'opérateur I_K , restreint à l'algèbre commutative $M(T)$, définit un noyau $\Lambda(t, d\omega)$ sur $\hat{T} \times \Omega$, qui entrelace les deux semi-groupes P_t et Q_t .

J'ai décrit dans [3] comment cette construction, appliquée au groupe d'Heisenberg, donne un entrelacement entre le processus de Yule et le processus de Bessel. Je vais considérer dans la suite de cet article d'autres classes de groupes.

3. Exemples

3.1. Paires de Gelfand et actions doublement transitives. Soit G un groupe localement compact, agissant sur un espace métrique X , par isométries, de façon doublement transitive, c'est-à-dire que si $x, y, x', y' \in X$ vérifient $d(x, y) = d(x', y')$, alors il existe $g \in G$ tel que $gx = x'$ et $gy = y'$. On suppose que le sous-groupe K laissant fixe un point de G est compact, alors la paire (G, K) est une paire de Gelfand, cf [9], IV.II. Nous allons dans la suite considérer trois types d'exemples de tels groupes. Tout d'abord dans la section suivante nous envisagerons les groupes compacts, et en particulier le groupe $SU(2)$, puis des groupes agissant sur les arbres, que j'ai déjà traités en partie dans [4], et enfin des espaces hyperboliques.

3.2. Groupes compacts. Soit K un groupe compact. Dans le groupe $G = K \times K$, considérons le sous-groupe diagonal (k, k) , $k \in K$ isomorphe à K . Le couple (G, K) est une paire de Gelfand. Soit μ une mesure sur K , biinvariante par l'action de K , alors la projection de cette mesure sur la première composante de $K \times K$ est une mesure centrale sur K , c'est à dire une mesure invariante par conjugaison. Ainsi, l'algèbre $M^K(G)$ est naturellement isomorphe à l'algèbre de convolution des mesures centrales sur K , et la théorie des fonctions sphériques de la paire de Gelfand $K \times K$ est identique à celle des caractères du groupe K .

J'ai déjà étudié des chaînes de Markov construites de cette façon dans [1], [2], [5]. Je vais rappeler ici l'exemple le plus simple, celui du groupe $K = SU(2)$ des matrices unitaires 2×2 de déterminant 1. Le sous-groupe des matrices diagonales est isomorphe au groupe des nombres complexes de module 1, et son dual à $\mathbf{Z}$. Les fonctions sphériques de la paires de Gelfand associée sont en bijection avec les caractères irréductibles de $SU(2)$. Ces caractères sont indexés par les entiers strictement positifs, et le caractère associé à l'entier n est la fonction centrale sur $SU(2)$ telle que

$$\varphi_n(g) = \frac{\sin n\theta}{n \sin \theta}; \quad g = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

On considère maintenant la fonction centrale $\varphi_2(g) = \frac{1}{2}Tr(g)$, c'est le caractère normalisé de la représentation irréductible de dimension 2 de $SU(2)$. Cette fonction engendre un semi-groupe multiplicatif φ_2^n . Le sous-groupe diagonal de $SU(2)$ est

isomorphe au un cercle unité de $\mathbf{C}$ et son dual à $\mathbf{Z}$. Il est facile de constater que la restriction de φ à ce groupe est la transformée de Fourier de la loi de Bernoulli symétrique sur $\mathbf{Z}$. Il s'ensuit que la restriction du semi-groupe associé à l'algèbre du sous-groupe diagonal est le semi-groupe de transition de la marche aléatoire simple sur $\mathbf{Z}$. Ses probabilités de transition sont donc

$$(3.1) \quad p(n, n+1) = p(n, n-1) = \frac{1}{2}$$

La restriction du semi-groupe à $M^K(G)$ donne un semi-groupe Markovien sur les entiers qui peut se calculer en utilisant les formules de Clebsch-Gordan. On a en effet

$$\varphi_n \varphi_2 = \frac{n-1}{2n} \varphi_{n-1} + \frac{n+1}{2n} \varphi_{n+1}$$

il s'ensuit que le semi-groupe de probabilités de transition est donné par

$$(3.2) \quad q(n, n+1) = \frac{n+1}{2n} \quad q(n, n-1) = \frac{n-1}{2n}$$

Les deux semi-groupes (3.1), (3.2) interviennent dans la démonstration du théorème de Pitman. Le noyau d'entrelacement entre ces semi-groupes est facile à obtenir à partir des considérations précédentes. L'entier positif n dans (3.2) paramètre une représentation irréductible de $SU(2)$, tandis que l'entier de (3.1) correspond à un caractère du sous-groupe diagonal. Le noyau d'entrelacement choisit un caractère uniformément parmi ceux qui interviennent dans la décomposition de la représentation de dimension n par le sous-groupe diagonal. Ainsi ce noyau est donné par

$$\Lambda(x, dy) = \sum_{k=0}^x \delta_{x-2k}(dy)$$

x étant un entier positif et y un entier relatif.

3.3. Groupes d'automorphismes d'arbres. Soit q un entier (supérieur ou égal à 2). Soit T_q un arbre homogène tel que le degré de chaque sommet soit $q+1$. C'est un espace métrique pour la distance naturelle donnée par la longueur d'un chemin minimal entre deux sommets. Soit G le groupe des automorphismes de T_q , muni de la topologie de la convergence simple sur l'arbre, c'est un groupe localement compact, qui agit de façon doublement transitive sur l'arbre, et si e est un sommet de T_q , le sous-groupe K de G des automorphismes fixant e est un sous-groupe compact. D'après la section précédente, (G, K) est donc une paire de Gelfand (voir [7]). Si ϕ est une fonction sur G , biinvariante par K , alors $\phi(g)$ ne dépend que de la distance $d(e, g(e))$ dans l'arbre. On peut calculer les fonctions sphériques de type positif de la paire (G, K) . Elles sont indexées par les nombres réels $x \in [-(q^{1/2} + q^{-1/2}), q^{1/2} + q^{-1/2}]$, et sont données par la formule

$$\varphi_x(g) = \frac{1}{q^{\frac{n}{2}}(q+1)} \left(q \frac{\lambda^{n+1} - \lambda^{-n-1}}{\lambda - \lambda^{-1}} - \frac{\lambda^{n-1} - \lambda^{-n+1}}{\lambda - \lambda^{-1}} \right) := q^{-n/2} \sqrt{\frac{q}{q+1}} P_n(x)$$

avec $n = d(e, g(e))$ et $x = \lambda + \lambda^{-1}$. Les formules étant symétriques en λ et λ^{-1} , on choisira λ de module inférieur à 1.

On peut remarquer que $P_n(x)$ est un polynôme en x qui vérifie une relation de récurrence à trois termes en n .

$$xP_n(x) = P_{n+1}(x) + P_{n-1}(x).$$

Les P_n forment en fait une suite de polynômes orthogonaux pour la mesure

$$m_q(dx) = \frac{q(q+1)}{4\pi} \frac{\sqrt{4-x^2}}{(q+1)^2 - qx^2} dx$$

sur l'intervalle $[-2, +2]$.

L'intervalle $[-(q^{1/2} + q^{-1/2}), q^{1/2} + q^{-1/2}]$ se décompose en $[-2, 2]$, qui correspond à ce qu'on appelle la série principale, et en $[-(q^{1/2} + q^{-1/2}), -2] \cup [2, q^{1/2} + q^{-1/2}]$, qui forme la série complémentaire. Lorsque x parcourt la série principale λ parcourt le cercle de rayon 1, tandis que pour x dans la série complémentaire, λ parcourt $] -1, -q^{-1/2}] \cup [q^{-1/2}, 1[$ sur l'axe réel.

Il existe sur G une fonction conditionnellement de type négatif privilégiée, qui est la fonction $\psi(g) = d(e, g(e))$. Elle induit un semi-groupe de transformations complètement positives sur $M(G)$, que nous noterons S_t . Nous allons calculer sa restriction à deux algèbres commutatives bien choisies.

Soit $\tau \in G$ un élément tel que $d(e, \tau^n(e)) = |n|$ pour tout $n \in \mathbf{Z}$. Un tel élément est facile à construire, cf [4]. On note T le groupe engendré par τ , c'est un groupe libre à un générateur, isomorphe à $\mathbf{Z}$. Identifions donc T avec $\mathbf{Z}$, alors le dual $\hat{T}$ de T est le cercle unité de $\mathbf{C}$, et τ s'identifie avec la fonction $\omega \mapsto \omega : \hat{T} \rightarrow \mathbf{C}$. La restriction du semi-groupe S_t à $M(T)$ est donnée par la formule

$$\delta_{\tau^n} \rightarrow e^{-|n|t} \delta_{\tau^n}$$

soit en terme de fonctions sur le cercle unité

$$\omega^n \rightarrow e^{-|n|t} \omega^n$$

elle correspond donc au noyau de Poisson

$$Q_t(\xi, d\omega) = \frac{1 - e^{-2t}}{|\xi^{-1}\omega - e^{-t}|^2} d\omega$$

et le processus associé est le processus de Cauchy sur le cercle unité.

Examinons maintenant la restriction de S_t à l'algèbre $M^K(G)$. On obtient un semi-groupe Markovien sur l'intervalle $[-(q^{1/2} + q^{-1/2}), q^{1/2} + q^{-1/2}]$, dont on peut calculer les probabilités de transition grâce à l'expression explicite des fonctions sphériques. En effet, si on note $P_t(x, dy)$ ce noyau de probabilités, on aura

$$e^{-t\psi} \varphi_x = \int_{-(q^{1/2} + q^{-1/2})}^{q^{1/2} + q^{-1/2}} \varphi_y P_t(x, dy)$$

ce qui caractérise complètement la mesure de probabilités $P_t(x, dy)$. Le calcul peut s'effectuer selon la méthode suggérée dans [4]. On trouve alors l'expression suivante du semi-groupe. Soit x dans la série complémentaire, $[-(q^{1/2} + q^{-1/2}), -2] \cup [2, q^{1/2} + q^{-1/2}]$ correspondant à $\lambda \in [q^{-1/2}, 1]$. Si $\lambda e^t < 1$ on note $x(t)$ le point correspondant à λe^t soit $x(t) = \lambda e^t + \lambda^{-1} e^{-t}$. Alors

$$P_t(x, dy) = a_t \delta_{x(t)} + q_t(x, y) m(dy)$$

où

$$a_t = \frac{(\lambda e^t - \lambda^{-1} e^{-t})(\lambda - q\lambda^{-1})}{(\lambda e^t - q\lambda^{-1} e^{-t})(\lambda + \lambda^{-1})}$$

et

$$q_t(x, y) = \frac{q\lambda - \lambda^{-1}}{q+1} \left[\frac{q+1 - y\lambda e^{-t}}{1 - y\lambda e^{-t} + \lambda^2 e^{-2t}} - \frac{\lambda - q\lambda^{-1}}{\lambda e^t - q\lambda^{-1} e^{-t}} \frac{q+1 - y\lambda e^t}{1 - y\lambda e^t + \lambda^2 e^{2t}} \right]$$

Si $\lambda e^t \geq 1$ ou si x est dans la série principale, alors seule existe la partie continue du semi-groupe et on a

$$P_t(x, dy) = q_t(x, y)m_q(dy)$$

avec

$$q_t(x, y) = \frac{1}{q+1} \left[(q\lambda - \lambda^{-1}) \frac{q+1-y\lambda e^{-t}}{1-y\lambda e^{-t}+\lambda^2 e^{-2t}} - (q\lambda^{-1} - \lambda) \frac{q+1-y\lambda^{-1} e^{-t}}{1-y\lambda^{-1} e^{-t}+\lambda^{-2} e^{-2t}} \right]$$

Le processus gouverné par ce semi-groupe a le comportement suivant: s'il part d'un point de la série complémentaire, alors il suit une translation uniforme (dans la variable $\log \lambda$) avant de sauter à l'intérieur de la série principale. Le taux de saut est donné par la dérivée de la fonction $-a_t$. Une fois à l'intérieur de la série principale, il y reste et y effectue un processus de semi-groupe $q_t(x, y)m_q(dy)$.

Venons en maintenant à l'entrelacement entre ces processus. Pour le calculer, considérons un élément $\sigma \in G$ tel que $d(e, \sigma(e)) = n$. Pour un entier $n \geq 0$, posons

$$\mu_n = \int \int_{K \times K} \delta_{k_1} * \delta_\sigma * \delta_{k_2} dk_1 dk_2.$$

Cette mesure est indépendante de σ , elle ne dépend que de n . Les mesures μ_n ; $n \geq 1$ et $\mu_0 = \delta_e$ engendrent l'algèbre $M^K(G)$ et vérifient la relation

$$(q+1)\mu_n * \mu_1 = \mu_{n-1} + q\mu_{n+1}; n \geq 1$$

qui exprime le fait géométrique simple que chaque sommet de l'arbre (hormis e) possède $q+1$ voisins dont q sont plus éloignés de e que lui, et un seul se trouve sur le plus court chemin menant à e . Il en résulte que les μ_n s'expriment sous forme de polynôme en μ_1 (pour la convolution) plus exactement,

$$\mu_n = q^{n/2} P_n\left(\frac{q+1}{q^{1/2}} \mu_1\right)$$

Cette égalité permet d'identifier l'algèbre $M^K(G)$ avec l'algèbre engendrée par μ_1 , et l'ensemble Ω correspond au spectre de l'élément $\frac{q+1}{q^{1/2}} \mu_1$. Ces considérations permettent de trouver le noyau d'entrelacement, et finalement le calcul donne le noyau

$$\Lambda(x, d\omega) = \frac{q+1+q^{-1/2}\omega(q-x)}{1-q^{-1/2}x\omega+q^{-1}\omega^2} d\omega.$$

3.4. Groupes d'automorphismes d'espaces hyperboliques. Nous allons maintenant considérer un exemple qui possède beaucoup de points communs avec celui des groupes d'automorphismes d'arbres, il s'agira des espaces hyperboliques. Nous nous bornerons ici au cas du quotient $SL_2(C)/SU(2)$ qui est un espace hyperbolique de dimension 3, mais les autres cas mériteraient qu'on s'y intéresse.

La décomposition polaire des matrices complexes 2×2 permet d'identifier l'espace hyperbolique $SL_2(C)/SU(2)$ avec l'ensemble des matrices complexes hermitiennes 2×2 , définies positives, de déterminant 1. Le groupe $SL_2(C)$ agit sur cet espace par automorphismes, suivant la formule $p \mapsto gpg^*$, ($g \in SL_2(C)$), le groupe d'isotropie de l'identité étant le sous-groupe $SU(2)$. L'action de $SL_2(C)$ est doublement transitive, et le couple $(SL_2(C), SU(2))$ est un couple de Gelfand. Le spectre de ce couple de Gelfand est bien connu, et s'identifie de manière naturelle à une partie du plan complexe, voir [9]. Il consiste en une partie principale, indexée

par la droite complexe imaginaire pure $i\mathbf{R}$, et une partie supplémentaire, indexée par l'intervalle $[-1, 1]$. Une fonction sphérique est complètement déterminée par sa restriction à l'ensemble des matrices de la forme

$$g(x) = \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ 0 & e^{-x} \end{pmatrix}$$

avec $x \geq 0$. Si $\omega \in i\mathbf{R} \cup [-1, 1]$ la fonction sphérique correspondante est donnée

$$\phi_\omega(g(x)) = \frac{\sinh(\omega x)}{\omega \sinh(x)}$$

avec

$$\phi_0(g(x)) = \frac{x}{\sinh(x)}$$

Nous allons considérer une fonction conditionnellement de type négatif remarquable sur $SL_2(C)$, biinvariante par $SU(2)$. Il s'agit, suivant la terminologie de [10], d'une forme quadratique généralisée. Cette fonction joue un rôle crucial dans la formule de Lévy-Khinchine sur l'espace hyperbolique. De telles fonctions peuvent s'obtenir pour tous les espaces hyperboliques de rang 1, et l'étude des processus stochastiques associés serait certainement intéressante. Pour construire cette fonction, on considère les fonctions conditionnellement de type négatif $1 - \varphi_\omega$, et on prend la limite

$$\psi = \lim_{\omega \rightarrow 1} \frac{1 - \varphi_\omega}{1 - \omega}.$$

Le calcul donne

$$\psi(g(x)) = 1 - x \coth(x)$$

Le semi-groupe de fonctions de type positif engendré par ψ peut se restreindre, comme précédemment, à deux sous-algèbres commutatives, d'une part les mesures portées par un sous-groupe commutatif, ici on prendra le sous-groupe des matrices diagonales de la forme $\begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$ avec $t \in \mathbf{R}$, d'autre part la sous-algèbre $M^K(G)$.

La restriction au sous-groupe diagonal donne un processus de Lévy X_t d'exposant de Lévy $1 - x \coth x$, tel que

$$E[\exp(ixX_t)] = \exp(t(1 - x \coth x))$$

La restriction à l'algèbre $M^K(G)$ donne un processus à valeurs dans $\Omega = i\mathbf{R} \cup [-1, 1]$ et son semi-groupe de transition est déterminé par la formule

$$\varphi_\omega \exp(t\psi) = \int_{\Omega} \varphi_\xi P_t(\omega, d\xi)$$

Trouver une formule explicite pour $P_t(\omega, d\xi)$ impliquerait de donner la transformée de Fourier de la fonction $x \mapsto \exp t(1 - x \coth x)$, ce qui ne semble pas possible en terme de fonctions spéciales connues. Toutefois on peut décrire sommairement le comportement du processus ayant ces probabilités de transition. En effet, on voit que si ω est dans la série complémentaire, alors le comportement à l'infini de la fonction sphérique φ_ω est $\varphi_\omega(x) \sim \frac{1}{\omega} e^{(|\omega|-1)x}$. Si ω est dans la série principale, alors $\varphi_\omega(x) = 0(e^{-x})$. On en déduit que si ω est dans la série complémentaire et si $t < 1 - |\omega|$, alors la décomposition en fonctions sphériques de la fonction $\varphi_\omega \exp(t\psi)$ admet une composante sur $\varphi_{\omega \pm t}$ (ici $\pm$ est le signe de ω). Plus précisément, la fonction $\varphi_\omega \exp(t\psi) - \frac{|\omega|-t}{\omega} \varphi_{\omega \pm t}$ est $O(e^{-x})$ à l'infini, donc se décompose purement sur la série principale. Le processus admet donc un comportement semblable à celui

de la section précédente: s'il commence dans la série complémentaire, alors il suit un mouvement de translation uniforme avant de sauter dans la série principale. Une fois arrivé dans la série principale, il y reste et y décrit un processus de saut. On peut maintenant déduire des considérations générales du début l'existence d'un noyau d'entrelacement entre ce processus et le processus de Lévy dont l'exposant de Lévy est $1 - x \coth x$. Toutefois l'absence de formule explicite pour la transformée de Fourier de $\exp(t(x \coth x - 1))$ ne permet pas d'en donner une expression exacte.

Pour terminer je voudrais signaler une relation mystérieuse (pour moi) entre ce processus et le mouvement Brownien sur le groupe d'Heisenberg. L'intersection des séries principale et complémentaire de l'ensemble Ω correspond à la fonction sphérique $\varphi_0(g(x)) = \frac{x}{\sinh(x)}$. Si nous partons de ce point, la loi du processus à l'instant t est déterminée par la décomposition de la fonction de type positif

$$(3.3) \quad \frac{x}{\sinh(x)} \exp(t(1 - x \coth x))$$

en fonctions sphériques. Il se trouve que cette même fonction (3.3) apparaît dans le calcul du noyau de la chaleur correspondant au Laplacien hypoelliptique sur le groupe d'Heisenberg, c'est la formule de l'aire de Paul Lévy, cf [11]. Il serait intéressant d'avoir une explication de cette coïncidence.

References

- [1] Biane, Philippe Quantum random walk on the dual of $SU(n)$. Probab. Theory Related Fields 89 (1991), no. 1, 117–129.
- [2] Biane, Philippe Minuscule weights and random walks on lattices. Quantum probability & related topics, 51–65, QP-PQ, VII, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1992.
- [3] Biane, Philippe Intertwining of Markov semi-groups, some examples. Séminaire de Probabilités, XXIX, 30–36, Lecture Notes in Math., 1613, Springer, Berlin, 1995.
- [4] Biane, Philippe Quantum Markov processes and group representations. Quantum probability communications, 53–72, QP-PQ, X, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1998.
- [5] Biane, Philippe Le théorème de Pitman, le groupe quantique $SU_q(2)$, et une question de P. A. Meyer. In memoriam Paul-André Meyer: Séminaire de Probabilités XXXIX, 61–75, Lecture Notes in Math., 1874, Springer, Berlin, 2006.
- [6] Carmona, Philippe; Petit, Frédérique; Yor, Marc Beta-gamma random variables and intertwining relations between certain Markov processes. Rev. Mat. Iberoamericana 14 (1998), no. 2, 311–367.
- [7] Choucroun, Francis M. Analyse harmonique des groupes d'automorphismes d'arbres de Bruhat-Tits. Mém. Soc. Math. France (N.S.) No. 58 (1994)
- [8] Dubédat, Julien Reflected planar Brownian motions, intertwining relations and crossing probabilities. Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 40 (2004), no. 5, 539–552.
- [9] Faraut, Jacques; Un cours sur les Paires de Gelfand, Cours du CIMPA, 1980.
- [10] Faraut, Jacques; Harzallah, Khelifa Distances hilbertiennes invariantes sur un espace homogène. Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 24 (1974), no. 3, xiv, 171–217.
- [11] Gaveau, Bernard Principe de moindre action, propagation de la chaleur et estimées sous-elliptiques sur certains groupes nilpotents. Acta Math. 139 (1977), no. 1-2, 95–153.
- [12] Hirsch, F.; Yor, M. Fractional intertwining between two Markov semi-groups. Potential Anal. 31 (2009), no. 2, 133–146.
- [13] Matsumoto, Hiroyuki; Yor, Marc An analogue of Pitman's $2M - X$ theorem for exponential Wiener functionals. I. A time-inversion approach. Nagoya Math. J. 159 (2000), 125–166.
- [14] Neil O'Connell, Directed polymers and the quantum Toda lattice arXiv:0910.0069

CNRS, FRANCE

E-mail address: Philippe.Biane@univ-mlv.fr