



HAL
open science

**PERFORMANCES DE REPRODUCTION ET
D'ÉLEVAGE DES BREBIS ROMANOV FINNOISES
ET CROISÉES : PREMIER BILAN DES RÉSULTATS
OBTENUS EN FRANCE DANS LES TROUPEAUX
EXPÉRIMENTAUX DE L'INRA ET DANS
QUELQUES TROUPEAUX D'ÉTUDE**

G. Ricordeau, L. Tchamitchian, J. Thimonier, J. C. Flamant, M. Theriez

► **To cite this version:**

G. Ricordeau, L. Tchamitchian, J. Thimonier, J. C. Flamant, M. Theriez. PERFORMANCES DE REPRODUCTION ET D'ÉLEVAGE DES BREBIS ROMANOV FINNOISES ET CROISÉES : PREMIER BILAN DES RÉSULTATS OBTENUS EN FRANCE DANS LES TROUPEAUX EXPÉRIMENTAUX DE L'INRA ET DANS QUELQUES TROUPEAUX D'ÉTUDE. *Annales de génétique et de sélection animale*, 1977, 9 (1), pp.123-123. hal-00892824

HAL Id: hal-00892824

<https://hal.science/hal-00892824v1>

Submitted on 11 May 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Health

The average score for health given by 15 places was 2.50. In about half of the places there were problems with pneumonia, while other health problems were specific for different places.

Growth and carcass traits

The average birth weight is about 2.4 kg, but it depends greatly on litter size. The average 150-day weight of recorded lambs in Finland is 30 kg and daily gain ca. 180 g. Litter size affects greatly the gain during the first 6 weeks. The average litter weight at 150 days is 71 kg, but litters of 4 or 5 lambs are more than three times as heavy as singles. Carcass yield of lambs is competitive with other breeds, but carcass quality 5-10 % poorer. Fat is located mainly in body cavities instead of being subcutaneous.

Wool traits

Fleece weights are inferior to most other breeds, being about 2 kg as greasy and 1.5 kg as clean. The wool is rather fine, 25-28 μ . Medullation is rare. The wool is semilustrous, soft and silky.

PERFORMANCES DE REPRODUCTION

ET D'ÉLEVAGE DES BREBIS ROMANOV FINNOISES ET CROISÉES :

PREMIER BILAN DES RÉSULTATS OBTENUS EN FRANCE DANS

LES TROUPEAUX EXPÉRIMENTAUX DE L'INRA ET DANS QUELQUES TROUPEAUX D'ÉTUDE

G. RICORDEAU (1), L. TCHAMITCHIAN (1), J. THIMONIER (2), J. C. FLAMANT (1), M. THERIEZ (3)
(1) I.N.R.A., Castanet-Tolosan, France; (2) I.N.R.A., Monnaie, France; (3) I.N.R.A.,
Beaumont, France.

En France, la première véritable expérimentation de croisement a commencé en 1963, au Domaine I.N.R.A. de Bourges, avec l'utilisation de béliers *Cotentin*, *Border Leicester* et *Romanov* (RO) sur des brebis *Berrichonnes du Cher* (BC) et la production de croisées 2 et 3 races. La productivité supérieure des croisées RO ainsi que la bonne adaptation des brebis RO à l'élevage en bergerie, ont orienté l'expérimentation vers l'étude plus analytique des performances des brebis parentales BC et RO qui possèdent des aptitudes complémentaires, et de leurs produits de croisement (F1 et F2 et les 2 croisements de retour). Cette étude résume les principaux résultats obtenus par les différentes équipes de recherche de l'I.N.R.A. sur la fertilité, la prolificité et ses composantes — taux d'ovulation et pertes embryonnaires — l'aptitude au désaisonnement (*), les critères endocrinologiques, les aptitudes laitières des mères, la viabilité et les qualités de carcasses des agneaux, ainsi que la productivité de 4 schémas d'utilisation des races prolifiques en croisement. La race *Finnoise* a été introduite en 1966, en fermes. Elle donne des résultats comparables à la RO en ce qui concerne la précocité et la durée de la saison sexuelle, mais ses performances d'élevage — prolificité et aptitude maternelle des mères, viabilité des agneaux — sont inférieures.

THE FERTILITY OF PROLIFIC BREEDS

(FINNSHEEP, ROMANOV SHEEP, EAST FRIESIAN MILKSHEEP)

AND THEIR CROSSES WITH MUTTON MERINO

V. JAKUBEC and J. KRIZEK. — *Research Institute for Animal Production Prague 10, Utrineves, CSSR.*

Reproduction was studied in various types of crossbreds between the *Mutton Merino* breed (MM) and prolific breeds (*Romanov sheep-R*, *Finnsheep-F*, and *East Friesian Milkshoop-EF*) in the years 1973-1975. From the reproduction traits the following were analysed: fertility, prolificacy, and causes of lamb mortality within 5 and 60 days. Heat to one year of age was established in the $MM \times F$ and $MM \times EF$ crossbreds nearly in 90%. Within the same age, estrus was found in 50% of $MM \times R$, and 37% of MM . Out of the ewes mated to one year of age 80% of $MM \times R$ became pregnant, $MM \times EF$ and $MM \times F$ ranging from 63 to 67%, and 40% of MM . Variance analysis established only significant or highly significant influence

* (Fertilité à contre saison ou en rythme accéléré de reproduction).