



Comparaison de différents modèles d'ajustement des courbes d'excrétion fécale des marqueurs du transit

T Najar, Daniel Sauvart, C Poncet, Sylvie Giger-Reverdin

► To cite this version:

T Najar, Daniel Sauvart, C Poncet, Sylvie Giger-Reverdin. Comparaison de différents modèles d'ajustement des courbes d'excrétion fécale des marqueurs du transit. *Reproduction Nutrition Development*, 1990, 30 (Suppl2), pp.179s-180s. hal-00899338

HAL Id: hal-00899338

<https://hal.science/hal-00899338>

Submitted on 11 May 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Comparaison de différents modèles d'ajustement des courbes d'excrétion fécale des marqueurs du transit

T Najar¹, D Sauviant¹, C Poncet², S Giger-Reverdin¹

¹ Station de Nutrition et d'Alimentation (INRA) de l'INA-PG, 16, rue C-Bernard,
 75231 Paris Cedex 05; ² Station de Nutrition des Herbivores, INRA, Theix, 63122 Ceyrat, France

Summary — *Seventy nine fecal excretion curves of rare earth were adjusted with 3 published models (Grovmum and Williams, 1973; Dhanoa et al, 1985; Siddons et al, 1983). The models provided statistically similar estimations of particulate turnover in the first compartment and mean retention time. However, some important individual differences between parameter values could be observed from one model to another.*

Introduction — Différents modèles ont été proposés pour ajuster les courbes d'excrétion fécale des marqueurs du transit digestif et en déduire des estimations des temps de séjour moyen (*TSM*) des aliments dans le tube digestif et dans ses compartiments. Les résultats obtenus par 3 de ces modèles ont été comparés à ceux calculés par la méthode de référence des moments.

Matériel et Méthodes — Un ensemble de 79 courbes d'excrétion fécale ont été obtenues sur des chèvres produisant de 0 à 5,8 kg de lait/j et ingérant des rations dont les 2 ou 3 constituants (foin de luzerne, pulpe de betteraves ensilée, aliment concentré) ont été marqués séparément avec des terres rares (respectivement Yb, Dy, Eu), selon la technique de Poncet *et al* (1987). Les cinétiques d'évolution des concentrations fécales des marqueurs ont été ajustées par le modèle à 2 compartiments (GW) de Grovmum et Williams (1973), par le modèle multicompartimental (MD) de Dhanoa *et al* (1985) et par sa transformation logarithmique (MS) proposée par Siddons *et al* (1983) pour permettre l'estimation des paramètres par régression linéaire. La variante du modèle GW à 3 compartiments a également été étudiée, elle n'est pas prise en

compte dans la comparaison car ses paramètres supplémentaires ne lui confèrent pas d'avantage. Le *TSM* a également été calculé par la méthode des moments (*TSM_M*). *Y_t* représentant la concentration fécale du marqueur à un instant *t*, les formes analytiques des modèles sont:

$$GW : Y_t = A_1 \cdot e^{-K_1(t-TT)} - A_2 \cdot e^{-K_2(t-TT)}$$

$$MS : \ln Y_t : \ln (A_1 - A_2) \cdot e^{-K_2(t-TT)} \cdot K_1 t$$

$$MD : Y_t = A_1 \cdot e^{-K_1 t} + A_2 \cdot e^{-K_2 t}$$

Les comparaisons portent sur les *TSM*, et les taux de renouvellement *K₁* et *K₂*. Le temps de première apparition du marqueur (*TT*) correspond à la valeur observée qui est donc la même pour les 3 modèles.

Résultats et Discussion — Le tableau I rapporte les valeurs moyennes et les écarts types des paramètres des 3 modèles, la moyenne de *TT* est de 19,4 h et son écart type (*ET*) de 3,3 h. Le *TSM_M* est de 49,0 (*ET* = 5,0 h), les valeurs de *TSM* obtenues par les 3 modèles ne sont pas significativement différentes et lui sont positivement liées : *TSM_{GW}* = 0,85 *TSM_M* + 7,76 (*R* = 0,76, *ETR* = 5,1 h); *TSM_{MS}* =

Tableau I. Caractéristiques des paramètres obtenus avec les différents modèles ^a.

Modèle	K_1 (h^{-1})	K_2 (h^{-1})	TSM (h)	ETR ($\mu g/g$ MS)
GW	0,056 (0,013)	0,133 (0,086)	49,71 (6,88)	1,33 (1,28)
MS	0,049 (0,0011)	0,211 (0,124)	47,40 (5,30)	1,23 (1,13)
MD	0,049 (0,0013)	0,205 (0,143)	47,64 (5,32)	0,91 (0,59)

^a Ecart type de la série des 79 mesures entre parenthèses.

$0,86 TSM_M + 6,68$ ($R = 0,78$, $ETR = 3,4$ h); $TSM_{MD} = 0,77 TSM_M + 11,45$ ($R = 0,70$, $ETR = 5,7$ h). Dans ces relations les coefficients de pente ne sont pas significativement différents de 1. Les valeurs des ET résiduels (ETR) sont relativement élevées en particulier pour les modèles GW et MD; ce fait révèle des possibilités de différences importantes entre les estimations des TSM.

Les taux de renouvellement K_1 dans le compartiment 1 des modèles ne diffèrent pas et sont positivement corrélés ($P < 0,01$): R (GW, MS) = 0,62; R (GW, MD) = 0,77; R (MS, MD) = 0,75; il en est de même des taux de renouvellement K_2 du 2^e compartiment: R (GW, MS) : 0,62; R (GW, MD) = 0,41; R (MS, MD) = 0,76. Par contre, les estimations de ces coefficients K_2 sont largement différentes entre le modèle GW et les modèles MS et MD. En

fait, ce coefficient K_2 traduit la phase croissante de la courbe d'excrétion et n'est pas formalisé de la même manière entre le modèle GW, d'une part, et MS ou MD, d'autre part. Les valeurs de ces différents coefficients de corrélation révèlent également certains écarts importants entre les estimations de K_1 et K_2 selon le modèle considéré. Le modèle MD ajuste en moyenne significativement mieux les courbes d'excrétion des marqueurs que le modèle MS et surtout GW (tableau I) alors que Lallès *et al* (1989) n'avaient pas observé de différence sur des veaux entre les modèles GW et MD. Les courbes de concentration fécale du marqueur du foin sont, par rapport à celles de la pulpe et du concentré, moins bien ajustées par les modèles MD ($ETR = 0,99$ vs 0,84), MS ($ETR = 1,33$ vs 1,16) et surtout GW ($ETR = 1,58$ vs 1,17).

En conclusion, les différents modèles aboutissent à des estimations moyennes identiques des temps de séjour moyens des particules dans le tube digestif et des taux de renouvellement dans le premier compartiment qui est souvent identifié au réticulo-rumen. Cependant, des différences individuelles non négligeables de valeur d'estimation de ces paramètres peuvent être observées selon la méthode utilisée.

- Dhanao M, Siddons RC, France J, Gale D (1985) *Br J Nutr* 53, 663-671
 Grovum WL, Williams VJ (1973) *Br J Nutr* 30, 313-329
 Lallès JP, Delval E, Poncet C (1990) *Reprod Nutr Dev suppl* 2, 223s-224s
 Poncet C, Gomez L, Michalet-Doreau B, Geay Y (1987) *Reprod Nutr Dev* 27, 219-220
 Siddons RC, Beever DE, Paradine J (1983) *Grass Res Inst Annu Rep* p 15