



HAL
open science

Autour du concept d'échantillon extrapolable

Léo Gerville-Réache

► **To cite this version:**

| Léo Gerville-Réache. Autour du concept d'échantillon extrapolable. 2014. ⟨hal-00922445v2⟩

HAL Id: hal-00922445

<https://hal.science/hal-00922445v2>

Preprint submitted on 30 Dec 2014

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

AUTOUR DU CONCEPT D'ECHANTILLON EXTRAPOLABLE

Léo Gerville-Réache¹

¹Université de Bordeaux, CNRS, UMR 5251, France, leo.gerville-reache@u-bordeaux.fr

Résumé : La théorie des sondages se concentre sur l'estimation statistique de quantités dans une population finie à partir de la sélection et de l'observation d'une partie de cette population. Tillé (2001) propose la définition suivante : « *On appelle sondage, toute étude partielle d'une population donnée en vue de son extrapolation à la totalité de celle-ci* ». Qu'entend-on par extrapolation ? Comment nommer, sélectionner et observer cette partie de la population qui permet cette extrapolation ? Partant de quelques citations marquantes sur ces questions, cette communication tente de poser précisément le problème et les enseignements qui en découlent.

Mots-clés. Plan de sondage, représentativité, extrapolation, estimateur sans biais linéairement invariants.

Abstract. Sampling theory focuses on the statistical estimation of finite population quantities from the selection and observation of a subset of this population. Tillé (2001) proposes the following definition: "We call survey, any partial study of a population for extrapolation to the whole of it." What is extrapolation? How to name, select and watch this part of the population that makes this extrapolation possible? From a few notable citations on these issues, this paper attempts to ask precisely the problem and solutions that follow.

Keywords. Sampling, representativeness, extrapolation, unbiased estimator linearly invariant.

1 Introduction

Dans la littérature statistique, le mot extrapolable, associé à celui d'échantillon et bien moins fréquent que celui de représentatif. Pour certains auteurs, le concept de représentativité est pourtant intimement lié à celui d'extrapolation statistique.

Pour J. Neyman, en 1934, « *Si nous nous intéressons à un caractère collectif X d'une population π et utilisons des méthodes d'échantillonnage et d'estimation nous permettant d'attribuer à chaque échantillon Σ possible un intervalle de confiance $X1(\Sigma)$, $X2(\Sigma)$ tel que la fréquence d'erreur dans l'affirmation que $X1(\Sigma) \leq X \leq X2(\Sigma)$ ne dépasse pas la limite $1 - \epsilon$ déterminée à l'avance, quelles que soient les propriétés de la population, j'appelle cette méthode d'échantillonnage représentative.* » Selon Neyman, c'est bien la possibilité d'extrapoler à la population, avec une précision calculable, les résultats de l'échantillon qui confère à la méthode d'échantillonnage son caractère représentatif.

Pour H. Chernoff (1960) : « *On dira qu'un échantillon est représentatif d'une population si la distribution des données est précisément celle d'un échantillon pris au hasard avec remplacement dans la population* ». Selon Chernoff, un échantillon représentatif est un échantillon aléatoire simple. Il est clair que cette définition est plus restrictive que celle de Neyman. Elle permet néanmoins, comme Neyman le sous entend, l'extrapolation.

Pour Philippe Dutarte (2005) « *Voilà une expression qui, si elle n'est pas précisée, peut signifier à peu près n'importe quoi. Un échantillon constitué selon la méthode des quotas est évidemment «représentatif» des critères correspondants aux quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région, taille de la commune...) selon lesquels il a été fabriqué. Mais on n'a aucun moyen de savoir jusqu'à quel point il est «représentatif» de ce pour quoi il a été prélevé, c'est-à-dire le sujet du sondage, l'opinion, le pourcentage que l'on cherche à évaluer. L'expression «représentatif de la*

population française », que l'on lit souvent dans la presse, prête évidemment à confusion. On a l'impression que l'échantillon est « représentatif » de tout ce que l'on veut. En statistique, on désigne plutôt par « échantillon représentatif », un échantillon où le hasard permet d'éviter les biais inconnus et d'appliquer le calcul des probabilités. La méthode optimale pour obtenir un échantillon « représentatif » est celle du sondage aléatoire stratifié optimal. ». Selon Dutarte, le terme représentatif est ambigu. La représentativité de certaines caractéristiques n'engendre pas nécessairement la représentativité des variables d'intérêt. Il conclut néanmoins par une définition qui sous entend la possibilité d'extrapolation via l'absence de biais et le calcul des probabilités.

Pour finir ce court échantillon de citations, qui n'est qu'une infime partie de la littérature, Tillé (2001) écrit, « *Le concept de représentativité est aujourd'hui à ce point galvaudé qu'il est désormais porteur de nombreuses ambivalences. Cette notion, d'ordre essentiellement intuitif, est non seulement sommaire mais encore fautive et, à bien des égards, invalidée par la théorie.* ». Selon Tillé, le terme a conduit à tellement d'approximations et d'erreurs qu'il ne peut plus faire partie du vocabulaire de la théorie des sondages. Ce point de vue est légitime mais, en l'absence de définition statistique, celui-ci est abandonné aux utilisateurs peu scrupuleux. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un tel problème se pose aux statisticiens : définir statistiquement un terme du langage courant dont tout le monde (ou presque), statisticien ou non, a une idée plus ou moins précise. Prenons le terme « significatif ». Dans le langage courant, le Larousse propose : « *qui exprime quelque chose nettement, sans ambiguïté* ». La communauté statistique s'est appropriée le terme et lui a donné une définition statistique que l'on peut résumer ainsi « *En statistiques, un résultat est dit statistiquement significatif lorsqu'il est improbable qu'il puisse être obtenu par un simple hasard* ».

Même si, comme le montre l'ouvrage collectif publié par l'INED (Voir Selz 2013), la question de la représentativité en statistique est toujours d'actualité, nous nous concentrons ici sur le concept d'échantillon extrapolable qui est, selon Tillé (2001), au cœur de la théorie des sondages : « *On appelle sondage, toute étude partielle d'une population donnée en vue de son extrapolation à la totalité de celle-ci* ».

2 Estimateur linéairement invariant en théorie des sondages

Nous cherchons à définir le concept d'échantillon extrapolable. Cette extrapolation passe nécessairement par les propriétés statistiques des estimateurs qui seront construits à partir du plan d'échantillonnage.

Les notations et définitions de cette partie suivent celles de Tillé (2001). Soit U , une population de N unités : $U = \{1, \dots, k, \dots, N\}$. Soit $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_k, \dots, y_N)'$, les valeurs réelles prises par la variable d'intérêt y par les unités de U . Soit $\mathbf{Y} = (\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_i, \dots, \mathbf{y}_I)$, l'ensemble des valeurs prises par l'ensemble des variables (d'intérêt ou pas) des unités de U .

Définition 1 : Un échantillon non-ordonné sans remise s est un n -uplet non-ordonné sans remise d'unité de U . s est un sous-ensemble (au sens ensembliste) de U . On note $\mathcal{S} = \{s \mid s \subset U\} \setminus \emptyset$.

Définition 2 : Un plan de sondage (non ordonné) sans remise $p(\cdot)$ est une loi de probabilité sur \mathcal{S} telle que :

$$p(s) \geq 0 \text{ pour tout } s \in \mathcal{S} \text{ et } \sum_{s \in \mathcal{S}} p(s) = 1.$$

On note S , la variable aléatoire prenant les valeurs $s \in \mathcal{S}$ avec probabilité $p(s) \geq 0$.

Définition 3 : Un plan de sondage est de taille fixe n si

$$\mathcal{S} = \{s \subset U \mid \#s = n\}$$

Définition 4 : La probabilité d'inclusion π_k est la probabilité pour une unité d'appartenir à l'échantillon. Ces probabilités découlent du plan de sondage :

$$\pi_k = \sum_{s \ni k} p(s), \text{ pour tout } k \in U$$

Dans la suite, on supposera que $\pi_k > 0$ pour tout $k \in U$.

Définition 5 : La probabilité d'inclusion π_{kl} est la probabilité pour un couple d'unités d'appartenir à l'échantillon. Ces probabilités découlent du plan de sondage :

$$\pi_{kl} = \sum_{s \ni k, s \ni l} p(s), \text{ pour tout } k, l \in U, k \neq l$$

Définition 6 : Un estimateur d'une moyenne est dit linéaire s'il peut s'écrire sous la forme

$$\hat{y}_L = w_0(S) + \sum_{k \in S} w_k(S) y_k$$

Définition 7 : Un estimateur d'une moyenne est dit linéaire homogène s'il peut s'écrire sous la forme

$$\hat{y}_{LH} = \sum_{k \in S} w_k(S) y_k$$

Définition 8 : Un estimateur d'une moyenne est dit linéairement invariant si pour tout changement d'origine et d'unité du vecteur $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_k, \dots, y_N)'$ en $\mathbf{y}^* = (a + by_1, \dots, a + by_k, \dots, a + by_N)'$ alors,

$$\hat{y}_{LH}^* = a + b\hat{y}_{LH}$$

Dans la suite on se place dans le cadre des plans de sondages sans remise de taille fixe (selon les définitions 2 et 3).

3 Echantillon extrapolable : proposition de définition et propriétés

Avant de proposer une définition, il est nécessaire de s'accorder un point de départ. Nous devons convenir qu'un échantillon aléatoire simple, (issu d'un plan de sondage où chaque échantillon a la même probabilité de sélection) est un échantillon extrapolable. En effet, il est difficile d'accepter la théorie des sondages, et de ne pas supposer qu'à minima, un échantillon aléatoire simple n'est pas extrapolable.

On se doit alors de remarquer que la propriété essentielle d'un plan simple est que la fonction de répartition théorique de la variable d'intérêt dans l'échantillon est égale à sa fonction de répartition empirique dans la population. Cette propriété est le fils conducteur de la définition qui suit.

Echantillon extrapolable : Un échantillon s est extrapolable à la population U si et seulement si, il est issu d'un plan d'échantillonnage permettant de construire une deuxième phase au dit plan (produisant un échantillon d'une seule unité, noté S') tel que, quelque soit la variable d'intérêt y , on a :

$$P(y(S') = y_0) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{\{y_k = y_0\}}, \quad \forall y_0 \in (y_1, \dots, y_k, \dots, y_N),$$

où $y(S')$ est la variable aléatoire générée par le plan de sondage en deux phases (i.e. $y(S')$ est la variable aléatoire qui, quelque soit $y_0 \in R$, prends la valeur y_0 avec probabilité $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{\{y_k=y_0\}}$.

Cette définition n'impose pas que la fonction de répartition théorique de la variable d'intérêt dans l'échantillon soit égale à sa fonction de répartition empirique dans la population, elle impose, d'une certaine manière, la possibilité de la reconstruire.

Définition équivalente 1 : Un échantillon s est extrapolable à la population U si et seulement si :

$$P(k \in S') = \pi_k E[P(k \in S'|S)] = \frac{1}{N}, \text{ pour tout } k \in U$$

Preuve : Il est clair que si $P(k \in S') = \frac{1}{N}$, pour tout $k \in U$ alors, $P(y(S') = y_0) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{\{y_k=y_0\}}$,

$\forall y_0 \subset (y_1, \dots, y_k, \dots, y_N)$. Si $P(y(S') = y_0) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 1_{\{y_k=y_0\}}$, sans perte de généralité, on s'intéresse au

où les valeurs de $y(S')$ sont toutes différentes. Dans ce cas $P(y(S') = y_0) = \frac{1}{N}$,

$\forall y_0 \subset (y_1, \dots, y_k, \dots, y_N)$ et, comme dans ce cas, $P(y(S') = y_0) = P(k \in S')$, on a bien

$$P(k \in S') = \frac{1}{N}, \text{ pour tout } k \in U .$$

Ce définition équivalente nous dit qu'un échantillon est extrapolable s'il est « équivalent » à un échantillon aléatoire simple, dans le sens où $\pi_k E[P(k \in S'|S)] = \frac{1}{N}$, pour tout $k \in U$.

NB : Il est clair qu'un plan de sondage à stratification proportionnelle aux effectifs produit des échantillons extrapolables.

Définition équivalente 2 : Un échantillon s est extrapolable à la population U si et seulement si il existe des $w_k(s) \in]0;1]$ pour tout $k \in U$ et tout $s \subset \mathcal{S}$ tels que:

$$\sum_{s \supset k} w_k(s) p(s) = 1/N \text{ pour tout } k \in U \text{ avec } \sum_{k \in s} w_k(s) = 1, \text{ pour tout } s \in \mathcal{S} .$$

Preuve : Posons $w_k(s) = P(k \in S'|s)$, alors on a clairement $\sum_{k \in s} w_k(s) = 1$, pour tout $s \in \mathcal{S}$ et on a

$$\text{également } E[P(k \in S'|S)] = \sum_{s \supset k} w_k(s) p(s) = 1/N \text{ pour tout } k \in U .$$

Cette définition équivalente nous montre que l'extrapolation est conditionnée par les probabilités des échantillons et non par les seules probabilités d'inclusion du premier ordre.

Propriété 1 : Si un échantillon s est extrapolable à la population U alors il existe des $w_k(s) \in]0;1]$ pour tout $k \in U$ et tout $s \subset \mathcal{S}$, avec $\sum_{k \in s} w_k(s) = 1$, pour tout $s \in \mathcal{S}$ tels que:

$$\sum_{k \in U} \sum_{s \supset k} w_k(s) p(s) = \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{k \in s} w_k(s) p(s)$$

Preuve : Si $\sum_{s \ni k} w_k(s) p(s) = 1/N$ pour tout $k \in U$, alors $\sum_{k \in U} \sum_{s \ni k} w_k(s) p(s) = \sum_{k \in U} 1/N = 1$ et comme $\sum_{k \in S} w_k(s) = 1$, pour tout $s \in \mathcal{S}$, alors $\sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{k \in S} w_k(s) p(s) = \sum_{s \in \mathcal{S}} p(s) = 1$.

Cette propriété nous dit que, si l'échantillon est extrapolable, les unités k et les échantillons s jouent des rôles « symétriques ».

Propriété 2 : Si l'échantillon s est extrapolable à la population U alors il existe un estimateur sans biais linéairement invariant pour la moyenne de toutes variables d'intérêts.

Preuve : soit \hat{y}_R l'estimateur linéaire homogène suivant :

$$\hat{y}_R = \sum_{k \in S} w_k(S) y_k .$$

De la condition $\sum_{s \ni k} w_k(s) p(s) = 1/N$ pour tout $k \in U$, on déduit que \hat{y}_R est sans biais :

$$\begin{aligned} E(\hat{y}_R) &= E\left(\sum_{k \in S} w_k(S) y_k\right) = \sum_{s \in \mathcal{S}} p(s) \sum_{k \in S} w_k(s) y_k = \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{k=1}^N p(s) w_k(s) y_k 1_{\{k \in s\}} \\ &= \sum_{k=1}^N \sum_{s \in \mathcal{S}} p(s) w_k(s) y_k 1_{\{k \in s\}} = \sum_{k=1}^N y_k \sum_{s \in \mathcal{S}} p(s) w_k(s) 1_{\{k \in s\}} = \sum_{k=1}^N y_k \sum_{s \ni k} w_k(s) p(s) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N y_k \end{aligned}$$

Et de la condition $\sum_{k \in S} w_k(s) = 1$, pour tout $s \in \mathcal{S}$, on déduit que \hat{y}_R est linéairement invariant :

$$\begin{aligned} \hat{y}_R^* &= \sum_{k \in S} w_k(S) (a + b y_k) = \sum_{k \in S} a w_k(S) + b w_k(S) y_k \\ &= \sum_{k \in S} a w_k(S) + \sum_{k \in S} b w_k(S) y_k = a \sum_{k \in S} w_k(S) + b \sum_{k \in S} w_k(S) y_k = a + b \hat{y}_R \end{aligned}$$

En 1977 Patel et Dharmadhikari ont établi les conditions nécessaires et suffisantes (CNS), sur les probabilités d'inclusion de premier et second ordre, de l'existence d'un estimateur sans biais linéairement invariant pour une moyenne ou une somme. Ils montrent en particulier, comme le sous entend l'expression la variance de l'estimateur d'Horvitz-Thompson, que la connaissance des probabilités des échantillons n'est pas nécessaire, celle des probabilités de premier et deuxième ordres est nécessaire et suffisante. On a ainsi le corolaire suivant.

Définition équivalente 3 : Un échantillon s est extrapolable à la population U si et seulement si les probabilités d'inclusion de premier ordre π_k et de second ordre $\pi_{k,l}$ pour tout $k, l \in U, k \neq l$ sont telles que la matrice $C_{N \times N}$, défini par $c_{kk} = (n-1)\pi_k / n$ et $c_{kl} = -\pi_{kl} / n$ est de rang $N-1$.

NB : si l'échantillon est stratifié en m classes, alors l'échantillon sera extrapolable si et seulement si le rang de C est $N-m$.

4 Conclusion

La définition proposée exprime la volonté « d'équivalence » entre la fonction de répartition théorique de la variable d'intérêt dans l'échantillon et sa fonction de répartition empirique dans la population. Nous avons traduit cette « équivalence » par la l'existence théorique d'une deuxième phase de sondage conduisant, au final, à un échantillon aléatoire simple de taille un.

Le concept d'échantillon extrapolable à une population n'est pas une question philosophique. C'est une question statistique dont les contraintes peuvent être formalisées et qui pourrait produire un espace de développement théorique propre. Il est notable que cette modélisation « intuitive » de la notion d'échantillon extrapolable conduise à une condition suffisante d'existence d'un estimateur sans biais linéairement invariant pour une moyenne (ou une somme).

Comme souvent en théorie des sondages, l'estimateur sans biais linéairement invariant qui découle de la définition d'un échantillon extrapolable n'a pas de forme explicite (sauf dans le cas d'un plan simple). Pour autant, le fait même de son existence nous semble une raison suffisante pour explorer plus avant ce domaine.

Bibliographie

- [1] Ardilly P. (2006), Les techniques de sondage, *Edition TECHNIP*.
- [2] Chernoff H (1960), A compromise between bias and variance in the use of non representative samples, *Contributions to Probability and Statistics / Essays in Honor of H. Hotelling*, pp. 153-167.
- [3] Cochran W.G. (1977), *Sampling techniques*, 3rd edition, Wiley & Sons, NY.
- [4] Dutarte P. (2005), *L'induction statistique au lycée*, Edition Didier.
- [5] Kruskal W., Mosteller F. (1979) Representative Sampling, III: *The Current Statistical Literature. International Statistical Review* Vol. 47, No. 3, pp. 245-265
- [6] Neyman J. (1934) On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection, *Journal of the Royal Statistical Society*, Vol. 97, No. 4, pp. 558-625.
- [7] Patel H.C., Dharmadhikari S.W. (1977), On linear invariant unbiased estimators in survey sampling, *Sankhyā: The Indian Journal of Statistics*, Volume 39, Series C, Pt. 1, pp. 21-27
- [8] Patel J.A., Patel H.C. (1993). On Balanced Sampling Designs, *Sankhyā: The Indian Journal of Statistics*, Series B, Vol. 55, No. 2, 283-287.
- [9] Ross S.M. (1999), *Introduction to Probability and Statistics*, Elsevier
- [10] Selz (2013), *La représentativité en statistique*, Méthodes et Savoirs, INED, N°8, 136p.
- [10] Shende, P.S., Ajgonkar, S.G. Prabhu (2002). A note on linear unbiased invariant estimator for some classes of estimators. *J. Indian Soc. Agric. Stat.* 55, No. 2, 153-157.
- [11] Tillé Y. (2001), *Théorie des sondages*, Edition DUNOD.