



HAL
open science

RELATIVITÉ GÉNÉRALE HYPERCOMPLÈXE

Laurent Besson, Yvan Rahbé

► **To cite this version:**

Laurent Besson, Yvan Rahbé. RELATIVITÉ GÉNÉRALE HYPERCOMPLÈXE. 2015. hal-01111250v2

HAL Id: hal-01111250

<https://hal.science/hal-01111250v2>

Preprint submitted on 10 Feb 2015 (v2), last revised 24 Feb 2018 (v5)

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright

RELATIVITÉ GÉNÉRALE HYPERCOMPLÈXE

LAURENT BESSON

RÉSUMÉ. Ce document tapé initialement en 1998 a été le travail effectué sur une période de 1996 à 1998. Celui-ci été ré-écrit en janvier et février 2015 en raison de la perte des sources du document et dans le but de pouvoir le publier. Lors de sa ré-écriture le document à été corrigé et amélioré afin d'être le plus compréhensible possible. N'ayant jamais publié, je ne sais pas quels sont les standards attendus afin que le document soit conforme à ces attentes.

Le présent document tente une approche peut-être explorée par ailleurs, une approche simple qui est le remplacement des coordonnées du quadri-vecteur réels en coordonnées avec des nombres quaternions (hypercomplexes). De plus ce document ré-introduit l'idée de M Hermann Weyl, une métrique de jauge sur les longueur. Appelée plus communément «jauge d'échelle» : Voir http://www.researchgate.net/profile/Laurent_Nottale/publication/241619222_Relativite_hypercomplexes/links/00b4952a2e69c7f72d000000.pdf

http://www-cosmosaf.iap.fr/Weyl-Cartan_et_la_geometrie_infinitesimale_synthese_par_E_Scholz.pdf

Si le lien ne fonctionne pas :

http://www-cosmosaf.iap.fr/Weyl-Cartan_et_la_geometrie_infinitesimale_synthese_par_E_Scholz.pdf

TABLE DES MATIÈRES

1. Définition	2
1.1. Définition du quadri-vecteur	2
1.2. Définition des quaternions	2
1.3. Notation d'Einstein	2
2. Postulat	2
1er postulat	2
2eme postulat	2
3. Notations diverses (dérivées covariantes, anti-commutateur, etc.)	2
3.1. Dérivée covariante des coordonnées	2
3.2. Dérivée covariante des h_i	2
4. Tenseurs	3
4.1. Transport d'un quadri-vecteur	3

1. DÉFINITION

La relativité générale hypercomplexe se définit comme la RG mais avec des composantes des quadri-vecteurs hypercomplexes.

1.1. Définition du quadri-vecteur. $\vec{V} = \sum_{\alpha=0}^3 V^\alpha \cdot \vec{e}_\alpha$ où $\alpha \in \{0, 1, 2, 3\}$ et les composantes de V^α sont des nombres quaternions.

1.2. Définition des quaternions. $V^\alpha \in \mathbb{H}$ ensemble des quaternions, noté \mathbb{H} tel $V^\alpha = V^{\alpha i} \cdot h_i$ $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ avec $h_1 \cdot h_2 \cdot h_3 = -1$, $h_i \cdot h_i = -1$ pour $i \neq 0$

Ce qui donne pour un quadri-vecteur hypercomplexe : $\vec{V} = \sum_{\alpha=0}^3 \sum_{i=0}^3 V^{\alpha i} \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha$ $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ $\alpha \in \{0, 1, 2, 3\}$

1.3. Notation d'Einstein. Les notations d'Einstein lorsqu'elles sont sans ambiguïtés sont : $\vec{V} = V^\alpha \cdot \vec{e}_\alpha$ où la somme est sous entendu sur les indices hauts ou bas.

2. POSTULAT

1er postulat. Le principe d'équivalence reste vrai.

2eme postulat. Les coordonnées de l'espace-temps sont hypercomplexes (cf : Nombres Quaternions).

3. NOTATIONS DIVERSES (DÉRIVÉES COVARIANTES, ANTI-COMMUTATEUR, ETC.)

3.1. Dérivée covariante des coordonnées. On note la dérivée covariante par coordonnée :

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} = \frac{\partial}{\partial(x^{\mu i} \cdot h_i)} = \frac{\partial}{\partial x^{\mu i} \cdot h_i + x^{\mu i} \cdot \partial h_i}$$

Posons

$$\partial h_i = H_{i\mu}^j \cdot h_j \cdot \partial x^\mu$$

d'où

$$\frac{\partial h_i}{\partial x^\mu} = H_{i\mu}^j \cdot h_j$$

or

$$\partial x^\mu = \partial x^{\mu i} \cdot h_i + x^{\mu i} \cdot \partial h_i$$

donc

$$\frac{\partial h_i}{H_{i\mu}^j \cdot h_j} = \partial x^{\mu i} \cdot h_i + x^{\mu i} \cdot \partial h_i$$

$$\partial x^{\mu i} \cdot h_i = \frac{\partial h_i}{H_{i\mu}^j \cdot h_j} - x^{\mu i} \cdot \partial h_i = \left(\frac{1}{H_{i\mu}^j \cdot h_j} - x^{\mu i} \right) \cdot \partial h_i$$

$$\partial x^{\mu i} \cdot h_i \cdot H_{i\mu}^j \cdot h_j = (1 - H_{i\mu}^j \cdot h_j \cdot x^{\mu i}) \cdot \partial h_i$$

d'où

$\partial h_i = \frac{\partial x^{\mu i} \cdot h_i \cdot H_{i\mu}^j \cdot h_j}{(1 - H_{i\mu}^j \cdot h_j \cdot x^{\mu i})}$ avec $h_i \cdot h_j = \delta_{ij}^k \cdot h_k$ et en introduisant l'opérateur commutateur de la physique quantique : $[h_i, h_j] = h_i \cdot h_j - h_j \cdot h_i = h_i \cdot h_j + h_i \cdot h_j = 2 \cdot \delta_{ij}^k \cdot h_k$

$$(3.1) \quad [h_i, h_j] = 2 \cdot \delta_{ij}^k \cdot h_k$$

Alors

$$(3.2) \quad \partial h_i = \frac{\partial x^{\mu i} \cdot H_{i\mu}^j \cdot \delta_{ij}^k \cdot h_k}{2 \cdot (1 - H_{i\mu}^j \cdot h_j \cdot x^{\mu i})}$$

3.2. Dérivée covariante des h_i .

$$\partial_\mu h_i = H_{\mu i}^j \cdot h_j$$

4. TENSEURS

Nous devons re-définir un certain nombre de grandeurs telle que la courbure, en effet comme nous étendons la définition de quadri-vecteur, la courbure va s'étendre en faisant apparaître des termes supplémentaires. Ceux-ci, et on le constatera, pourront se coupler entre eux.

L'intérêt est que nous retrouverons le tenseur courbure de Riemann $R_{\mu\gamma\nu}^\alpha$ et de Ricci $R_{\mu\nu}$, puis d'autre qui pourront être associés à d'autres champs physiques, qui de plus pourront se coupler entre eux et s'autocoupler.

Pour re-définir ces tenseurs nous devons reprendre les calculs de transport d'un quadri-vecteur, faisant apparaître bien évidemment les symboles de Christoffel $\Gamma_{\mu\alpha}^\beta$ http://fr.wikipedia.org/wiki/Symboles_de_Christoffel, et donc le tenseur de courbure. Mais d'autres tenseurs tels que : $H_{\mu i}^j \Phi_{\mu j}^i$, dont $\Phi_{\mu j}^i$ est le tenseur de « courbure » métrique de Weyl http://classiques.uqac.ca/collection_sciences_nature/fabre_lucien/Nouvelle_figure_du_monde (qui fera apparaître le champ $F_{\mu\nu}$ électromagnétique). Et $H_{\mu i}^j$ qui introduira d'autres tenseurs... Dont la signification physique sera à discuter.




FIGURE 4.1. transport quadri-vecteur

4.1. Transport d'un quadri-vecteur. Soit \vec{X} un quadri-vecteur $x^{\alpha i} \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha$

On utilise la jauge d'échelle de Weyl

<http://luth2.obspm.fr/~luthier/nottale/arLecce.pdf>

ou

http://classiques.uqac.ca/collection_sciences_nature/fabre_lucien/Nouvelle_figure_du_monde/Nouvelle_figur

$$x^{\alpha i} = x^\alpha \cdot \varphi^i$$

Soit la dérivée covariante

$$\nabla_\mu = \frac{d}{dx^\mu}$$

et

$$\nabla_\nu = \frac{d}{dx^\nu}$$

Nous allons faire le calcul suivant

$$(\nabla_\mu \cdot \nabla_\nu - \nabla_\nu \cdot \nabla_\mu) \vec{X}$$

Qui est nul dans un espace euclidien sans métrique de Weyl.

Commençons par

$$\nabla_\mu \vec{X} = \partial_\mu (x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha) = \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot \partial_\mu \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot \partial_\mu h_i \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\mu \vec{e}_\alpha$$

Avec la définition des symboles de Christoffel

$$(4.1) \quad \partial_\mu \vec{e}_\alpha = \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta$$

Et avec

$$(4.2) \quad \partial_\mu h_i = H_{\mu i}^j \cdot h_j$$

Puis

$$(4.3) \quad \partial_\mu \varphi^i = \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j$$

$$\nabla_\mu \vec{X} = \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot (\Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta)$$

On pose

$$\gamma_\mu = \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta \cdot \vec{e}^\alpha$$

Or on peut invoquer les symbole de Kronecker avec :

$$\vec{e}_\beta \cdot \vec{e}^\alpha = \delta_\beta^\alpha$$

On obtient une quantité indiquant comment ce comporte la connexion dans l'espace utilisé (Riemannien et hypercomplèxe) lors du parcours d'un quadri-vecteur...

$$(4.4) \quad \gamma_\mu = \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha$$

Donc

$$\nabla_\mu \vec{X} = \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot (\gamma_\mu) \cdot \vec{e}_\alpha$$

Commençons le calcul $\nabla_\nu \cdot \nabla_\mu \vec{X}$.

$$\nabla_\nu \cdot \nabla_\mu \vec{X} = \partial_\nu (\partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot (\gamma_\mu) \cdot \vec{e}_\alpha)$$

$$\begin{aligned} \nabla_\nu \cdot \nabla_\mu \vec{X} &= \partial_\nu \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\ &+ \partial_\mu x^\alpha \cdot \partial_\nu \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot \partial_\nu h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\ &+ \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\nu \vec{e}_\alpha + \partial_\nu x^\alpha \cdot (\gamma_\mu) \cdot \vec{e}_\alpha \\ &+ x^\alpha \cdot (\partial_\nu \gamma_\mu) \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot (\gamma_\mu) \cdot \partial_\nu \vec{e}_\alpha \end{aligned}$$

Nous allons former le calcul $\nabla_\mu \cdot \nabla_\nu \vec{X}$.

$$\begin{aligned} \nabla_\mu \cdot \nabla_\nu \vec{X} &= \partial_\mu \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\ &+ \partial_\nu x^\alpha \cdot \partial_\mu \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot \partial_\mu h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\ &+ \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\mu \vec{e}_\alpha + \partial_\mu x^\alpha \cdot (\gamma_\nu) \cdot \vec{e}_\alpha \\ &+ x^\alpha \cdot (\partial_\mu \gamma_\nu) \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot (\gamma_\nu) \cdot \partial_\mu \vec{e}_\alpha \end{aligned}$$

Nous devons évaluer $\partial_\nu \gamma_\mu$ et $\partial_\mu \gamma_\nu$

$$(4.5) \quad \partial_\nu \gamma_\mu = \partial_\nu (\Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha)$$

$$\begin{aligned} \partial_\nu \gamma_\mu &= \partial_\nu \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i \\ &+ \partial_\nu \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j \\ &+ \partial_\nu \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\ &+ \Phi_{\mu j}^i \cdot \partial_\nu \varphi^j \cdot h_i \\ &+ \varphi^i \cdot \partial_\nu H_{\mu i}^j \cdot h_j \\ &+ \varphi^i \cdot \partial_\nu h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\ &+ \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot \partial_\nu h_i \\ &+ \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot \partial_\nu h_j \\ &+ \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\nu \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\ &+ \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \partial_\nu \delta_\beta^\alpha \end{aligned}$$

$$(4.6) \quad \partial_\mu \gamma_\nu = \partial_\mu (\Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha)$$

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \gamma_\nu &= \partial_\mu \Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i \\
&+ \partial_\mu \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j \\
&+ \partial_\mu \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\
&+ \Phi_{\nu j}^i \cdot \partial_\mu \varphi^j \cdot h_i \\
&+ \varphi^i \cdot \partial_\mu H_{\nu i}^j \cdot h_j \\
&+ \varphi^i \cdot \partial_\mu h_i \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\
&+ \Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot \partial_\mu h_i \\
&+ \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot \partial_\mu h_j \\
&+ \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\mu \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\
&+ \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \partial_\mu \delta_\beta^\alpha
\end{aligned}$$

Formons la différence de transport d'un quadri-vecteur

$$\begin{aligned}
\nabla_\nu \cdot \nabla_\mu \vec{X} - \nabla_\mu \cdot \nabla_\nu \vec{X} &= \partial_\nu \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\
&+ \partial_\mu x^\alpha \cdot \partial_\nu \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot \partial_\nu h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\
&+ \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\nu \vec{e}_\alpha + \partial_\nu x^\alpha \cdot (\gamma_\mu) \cdot \vec{e}_\alpha \\
&+ x^\alpha \cdot (\partial_\nu \gamma_\mu) \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot (\gamma_\mu) \cdot \partial_\nu \vec{e}_\alpha \\
&- \partial_\mu \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha + \partial_\nu x^\alpha \cdot \partial_\mu \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\
&+ \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot \partial_\mu h_i \cdot \vec{e}_\alpha + \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\mu \vec{e}_\alpha \\
&+ \partial_\mu x^\alpha \cdot (\gamma_\nu) \cdot \vec{e}_\alpha + x^\alpha \cdot (\partial_\mu \gamma_\nu) \cdot \vec{e}_\alpha \\
&+ x^\alpha \cdot (\gamma_\nu) \cdot \partial_\mu \vec{e}_\alpha
\end{aligned}$$

Donc avec

$$\partial_\mu \vec{e}_\alpha = \Gamma_{\mu \alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta$$

$$\partial_\mu h_i = H_{\mu i}^j \cdot h_j$$

$$\partial_\mu \varphi^i = \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j$$

$$\gamma_\mu = \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha$$

La différence de transport devient

$$\nabla_\nu \cdot \nabla_\mu \vec{X} - \nabla_\mu \cdot \nabla_\nu \vec{X} =$$

$$\begin{aligned}
& \partial_\nu \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\
& + \partial_\mu x^\alpha \cdot \partial_\nu \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\
& + \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot \partial_\nu h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\
& + \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\nu \vec{e}_\alpha \\
& + \partial_\nu x^\alpha \cdot (\Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) \cdot \vec{e}_\alpha \\
& + x^\alpha \cdot \partial_\nu (\Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) \cdot \vec{e}_\alpha \\
& + x^\alpha \cdot (\Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) \cdot \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta \\
& \quad - \partial_\mu \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\
& \quad - \partial_\nu x^\alpha \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha \\
& \quad - \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j \cdot \vec{e}_\alpha \\
& \quad - \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta \\
& - \partial_\mu x^\alpha \cdot (\Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) \cdot \vec{e}_\alpha \\
& - x^\alpha \cdot \partial_\mu (\Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) \cdot \vec{e}_\alpha \\
& \quad - x^\alpha \cdot (\Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta
\end{aligned}$$

les expressions $\partial_\nu \gamma_\mu$ et $\partial_\mu \gamma_\nu$ deviennent

$$\begin{aligned}
\partial_\nu (\Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) = \\
\partial_\nu \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \partial_\nu \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \partial_\nu \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\
+ \Phi_{\mu j}^i \cdot \partial_\nu \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot \partial_\nu H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot \partial_\nu h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\
+ \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot \partial_\nu h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot \partial_\nu h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\nu \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\
+ \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu\alpha}^\beta \cdot \partial_\nu \delta_\beta^\alpha
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\partial_\mu (\Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) = \\
\partial_\mu \Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \partial_\mu \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j + \partial_\mu \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\
+ \Phi_{\nu j}^i \cdot \partial_\mu \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot \partial_\mu H_{\nu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot \partial_\mu h_i \cdot \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\
+ \Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot \partial_\mu h_i + \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot \partial_\mu h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\mu \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha \\
+ \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu\alpha}^\beta \cdot \partial_\mu \delta_\beta^\alpha
\end{aligned}$$

Donc $\nabla_\nu \cdot \nabla_\mu \vec{X} - \nabla_\mu \cdot \nabla_\nu \vec{X}$ devient

$$\begin{aligned}
\nabla_\nu \cdot \nabla_\mu \vec{X} - \nabla_\mu \cdot \nabla_\nu \vec{X} &= \partial_\nu \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha^\rightarrow + \partial_\mu x^\alpha \cdot \partial_\nu \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha^\rightarrow + \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot \partial_\nu h_i \cdot \vec{e}_\alpha^\rightarrow + \partial_\mu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\nu \vec{e}_\alpha^\rightarrow \\
&+ x^\alpha \cdot [\partial_\nu \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \partial_\nu \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \partial_\nu \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha + \Phi_{\mu j}^i \cdot \partial_\nu \varphi^j \cdot h_i \\
&+ \varphi^i \cdot \partial_\nu H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot \partial_\nu h_i \cdot \Gamma_{\mu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha + \Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot \partial_\nu h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot \partial_\nu h_j \\
&+ \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\nu \Gamma_{\mu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha] \cdot \vec{e}_\alpha^\rightarrow + x^\alpha \cdot (\Phi_{\mu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta^\rightarrow \\
&- \partial_\mu \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha^\rightarrow - \partial_\nu x^\alpha \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j \cdot h_i \cdot \vec{e}_\alpha^\rightarrow - \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot H_{\mu i}^j \cdot h_j \cdot \vec{e}_\alpha^\rightarrow - \partial_\nu x^\alpha \cdot \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\mu \alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta^\rightarrow \\
&- \partial_\mu x^\alpha \cdot (\Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) \cdot \vec{e}_\alpha^\rightarrow \\
&- x^\alpha \cdot [\partial_\mu \Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \partial_\mu \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j + \partial_\mu \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha + \Phi_{\nu j}^i \cdot \partial_\mu \varphi^j \cdot h_i \\
&+ \varphi^i \cdot \partial_\mu H_{\nu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot \partial_\mu h_i \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \partial_\mu \delta_\beta^\alpha \\
&+ \Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot \partial_\mu h_i + \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot \partial_\mu h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \partial_\mu \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \partial_\mu \delta_\beta^\alpha] \cdot \vec{e}_\alpha^\rightarrow \\
&- x^\alpha \cdot (\Phi_{\nu j}^i \cdot \varphi^j \cdot h_i + \varphi^i \cdot H_{\nu i}^j \cdot h_j + \varphi^i \cdot h_i \cdot \Gamma_{\nu \alpha}^\beta \cdot \delta_\beta^\alpha) \cdot \Gamma_{\mu \alpha}^\beta \cdot \vec{e}_\beta^\rightarrow
\end{aligned}$$