



HAL
open science

Sélection de l'efficacité digestive et influence sur la durabilité de la filière avicole

Sandrine Grasteau, Agnès Narcy, Bertrand Méda, Michel Lessire, Nabeel Al Nahhas, Cécile Arnould, Anne-Christine Lalmanach, Fabien Brossier, Nathalie Meme, Laura Sedano, et al.

► To cite this version:

Sandrine Grasteau, Agnès Narcy, Bertrand Méda, Michel Lessire, Nabeel Al Nahhas, et al.. Sélection de l'efficacité digestive et influence sur la durabilité de la filière avicole. Journée Nationale Volailles de Qualité Label et Bio, Mar 2014, Paris, France. hal-01209207

HAL Id: hal-01209207

<https://hal.science/hal-01209207v1>

Submitted on 3 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



VOLAILLES DE QUALITE LABEL ET BIO

PARIS, JEUDI 20 MARS 2014





VOLAILLES DE QUALITE LABEL ET BIO

ORGANISÉE AVEC LE PARTENARIAT DU

Synalaf
Syndicat National
des Labels Avicoles de France

À PARIS, LE JEUDI 20 MARS 2014

Avec la collaboration des Sociétés :

**Biochem**
Feed Safety for Food Safety®

Caringa
A Hendrix Genetics Company

**ccpa**
Groupe
l'esprit de service

**DSM**
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING

**idena**
LA NUTRITION ANIMALE AVANCEE PAR NATURE

**provimi**
shaping tomorrow's nutrition
A Cargill Company

**SPACE**
2014

**ufs**
matériel
d'élevage



**VOLAILLES DE QUALITE
LABEL ET BIO**

PARIS, JEUDI 20 MARS 2014

Sélection de l'efficacité digestive et influence sur la durabilité de la filière avicole


Sandrine GRASTEAU – INRA

Sélection de l'efficacité digestive et influence sur la durabilité de la filière avicole

S. Mignon-Graстеau, A. Narcy, B. Méda, M. Lessire, N. Alnahhas, C. Arnould, A.C. Lalmanach, P. Quéré, F. Brossier, N. Mème, L. Sedano, A. Niepceron, H. Marty, N. Chanteloup, A. Trottereau, Y. Le Vern, N. Lallier, J.M. Brigant, O. Callut, E. Guitton, P. Cousin, B. Campone, S. Lavillatte, M. Hassouna, and C. Schouler


20/03/2014

Besoins accrus en céréales et protéines



➔ **Améliorer l'efficacité digestive permettrait d'inclure plus de matières premières alternatives et de maintenir la durabilité du système de production**

Efficacité alimentaire VS Efficacité digestive



Les lignées D+/D- sélectionnées sur l'efficacité digestive

Souche mâle à croissance intermédiaire
 2.0 kg à 49 j
 2.4 kg à 56 j


Femelles naines




Poulets à croissance intermédiaire utilisés pour la production de poulets certifiés
 2.2 kg à 56 j

Les lignées D+/D- sélectionnées sur l'efficacité digestive

Sélection pendant 8 générations en utilisant du blé « Rialto »
Critère de sélection : EMAn



Les lignées D+/D- sélectionnées sur l'efficacité digestive



Différences anatomiques entre D+ et D-

	Variable	D+		D-
Poids (g.kg ⁻¹)	Gésier	26.0	>	19.0
	Proventricule	8.2	>	6.7
Poids (g.kg ⁻¹)	Duodénum	12.7	<	14.6
	Jéjunum	17.2	<	23.5
	Iléon	12.8	<	17.9
Temps de Rétention (min)	Particules fines	245-264	>	155-204
	Particules grossières	320-468	>	182-256

+33% pour les D+


+31% pour les D-

+25-157% pour les D+




Taille relative de l'ensemble gésier-proventricule des D- (gauche) et des D+ (droite)

Sélection sur la digestibilité : liens avec la composition du microbiote



Identification de zones du génôme contrôlant l'efficacité digestive et l'anatomie du tractus digestif




➔ Recherche des gènes en cause par étude de l'expression des gènes




Sélection sur la digestibilité : conséquences sur la quantité de rejets

Poids de fientes sèches (g)




Poids de fientes sèches rapporté à la consommation alimentaire




Sélection sur la digestibilité : conséquences sur la quantité de rejets

Azote (Excrétion/Ingestion)




Phosphore (Excrétion/Ingestion)




➔ 14-17 ha de surface d'épandage en moins pour les D+ par rapport aux CL (par poulailler)



Quels sont les critères de sélection les plus efficaces pour diminuer les rejets?



Que manque-t-il pour évaluer l'impact sur la durabilité?



Bouchons les trous ...

32 parquets

846 mâles et femelles
D+ et D-
Au sol

2 régimes



Régime classique (RC)

Maïs : 61% (0-14 j); 69% (14-53 j)
Soja : 35% (0-14 j); 26% (14-53 j)

Régime alternatif (RA)

Blé Rialto : 54% (0-14 d); 62% (14-53 d)
Soja : 28% (0-14 d); 16% (14-53 d)
Tourteau de tournesol : 5% (0-14 d); 6% (14-53 d)
Tourteau de colza : 6% (0-14 d); 6% (14-53 d)

Mesures sur les 3 piliers

Economie

Croissance : P0, 1, 2, ..., 8 sem.

Efficacité :

- IC: hebdomadaire par parquet
- Dig. Phosphore (3, 7 sem.)

Composition corporelle :

- Rdt en gras abdo. & filet (8 sem.)
- Rdt en gésier & Intestin (8 sem.)

Qualité de la viande :

- L, a*, b* du filet (8 sem.)
- pH du filet (8 sem.)

Social

Comportement : 1, 3, 5, 7 sem.

- Boire, manger, marcher,
- debout, couché

Qualité des pattes :

- Pododermatites, ampoules au bréchet, brûlures du tibia (1, 3, 5, 7 sem.)

- Rdt en Tibia, taux de cendres tibiales (3, 7 sem.)

Sensibilité aux maladies (3 sem.) :

- E. coli
- E. tenella
- Gènes du système immunitaire

Environnement


Quantité de litière (8 sem.)

Quantité de litière (1, 3, 5, 8 sem.):

- pH, température (surface+profondeur), humidité
- Teneur en azote, ammoniac, phosphore


Qualité de l'air (1, 3, 7 sem.):

- NH₃
- N₂O
- CO₂




Résultats (Economie)

Croissance




IC (0-8 sem.)




Résultats (Environnement)

Quantité de rejets
(kg/ kg d'animal)




Qualité de l'air
(mg/animal/j)





Résultats (social)


Sensibilité à *E. coli*




Score pour les pododermatites




Résultats sur le pilier économique



Résultats sur le pilier environnemental



Résultats sur le pilier social



Conclusions

Des critères tels que la digestibilité de la matière sèche, la rétention en azote ou l'efficacité digestive peuvent être sélectionnés

La sélection du CUD-MS ou de l'EMAN est plus efficace que celle sur l'IC ou la consommation résiduelle pour les critères environnementaux

La sélection pour l'efficacité digestive :

- Améliore les performances économiques
- Améliore les performances environnementales
- Ne modifie pas ou améliore légèrement les performances sociales

Les oiseaux ayant une bonne efficacité digestive sont moins sensibles aux changements alimentaires