



HAL
open science

Les douze surfaces de Darboux et la trialité

Bruno Sévenec

► **To cite this version:**

| Bruno Sévenec. Les douze surfaces de Darboux et la trialité. 2017. hal-01581955v1

HAL Id: hal-01581955

<https://hal.science/hal-01581955v1>

Preprint submitted on 5 Sep 2017 (v1), last revised 29 Sep 2021 (v2)

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Les douze surfaces de Darboux et la trialité

Bruno Sévenec*

September 5, 2017

1 Introduction

Dans le volume 4 du traité de Gaston Darboux sur les surfaces [Darb], consacré aux déformations isométriques des surfaces dans l'espace euclidien \mathbb{R}^3 , on trouve au chapitre 3, intitulé "les douze surfaces", une construction que l'on peut présenter comme suit.

Soit S une surface, f, g deux applications (lisses) de S vers \mathbb{R}^3 avec f une immersion (df est partout injective), telles que

$$df \cdot dg = 0, \quad (1)$$

i.e. qu'en tout point p de S on ait pour tout $v \in T_p S$

$$df(p)v \cdot dg(p)v = 0,$$

(on note \cdot le produit scalaire euclidien dans \mathbb{R}^3). Cette condition est équivalente au fait que la métrique riemannienne q_ε induite sur S par $f_\varepsilon = f + \varepsilon g : S \rightarrow \mathbb{R}_{\text{eucl}}^3$ vérifie

$$q_\varepsilon = q_0 + O(\varepsilon^2).$$

Autrement dit (1) exprime que g , vu comme champ de vecteurs le long de f , est une déformation isométrique infinitésimale (d'ordre 1) de $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$, sujet de nombreuses investigations (notamment en ingénierie) au temps de Darboux comme par la suite.

Du fait que f est une immersion, il existe une unique application (lisse) $h : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que

$$dg(p) = h(p) \times df(p), \quad p \in S \quad (2)$$

où \times désigne le produit vectoriel dans \mathbb{R}^3 . On peut concevoir h comme le champ des "rotations infinitésimales" induites par la déformation g de f . Darboux remarque alors que $\tilde{g} = g - h \times f$ vérifie

$$d\tilde{g} = f \times dh.$$

Si de plus g est une immersion, la relation (1) étant symétrique en f, g on peut définir $h^* : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ par

$$df = h^* \times dg.$$

*C.N.R.S., U.M.P.A., École Normale Supérieure de Lyon, 46 Allée d'Italie, 69364 Lyon cedex 07

Il est clair que ces formules définissent sur les triplets (f, g, h) vérifiant (2) et des conditions de non-dégénérescence convenables deux involutions

$$\begin{aligned} A : (f, g, h) &\mapsto (h, \tilde{g}, f) \\ D : (f, g, h) &\mapsto (g, f, h^*) . \end{aligned}$$

Le résultat surprenant obtenu par Darboux peut maintenant s'énoncer

Théorème 1 (Darboux). *La composition $(D \circ A)^6$ est l'identité.*

Les “douze surfaces” de Darboux sont les premières composantes des douze triplets obtenus par application des éléments du groupe diédral engendré par A et D au triplet initial (f, g, h) .

On propose ici une formulation géométrique de ce théorème, sous forme d’une “trialité différentielle” pour les surfaces totalement isotropes dans la quadrique projective réelle $Q \subset \mathbb{R}P^7 = P(\mathbb{R}^8)$ définie par l’annulation d’une forme quadratique de signature $(4, 4)$ sur \mathbb{R}^8 .

Le lien entre la propriété (1) et la quadrique Q dans $\mathbb{R}P^7$ vient de ce que, considérée comme propriété de l’application

$$(f, g) : S \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$$

elle ne dépend visiblement que de la structure pseudo-conforme définie par la métrique pseudo-riemannienne plate $dx \cdot dy$ de signature $(3, 3)$ sur $\mathbb{R}_x^3 \times \mathbb{R}_y^3$.

Or, par une construction bien connue (rappelée dans la section 2) généralisant la projection stéréographique usuelle, la quadrique $Q \subset \mathbb{R}P^7$ est une compactification pseudo-conforme de $\mathbb{R}_x^3 \times \mathbb{R}_y^3$, quand on munit $\mathbb{R}^8 = \mathbb{R}_x^3 \times \mathbb{R}_s \times \mathbb{R}_y^3 \times \mathbb{R}_t$ de la forme quadratique $q(x, s, y, t) = x \cdot y + st$ et que l’on identifie $(x, y) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ au point $(x : 1 : y : -x \cdot y)$ de Q .¹

Un couple (f, g) vérifiant (1) devient alors une immersion $\varphi : S \rightarrow Q$ totalement isotrope, i.e. dont le plan projectif tangent en tout point est entièrement contenu dans la quadrique Q . On voit facilement qu’il est alors contenu dans exactement *deux* espaces projectifs de dimension 3 (maximale) contenus dans Q .

Or il se trouve que ces “ $\mathbb{R}P^3$ ” contenus dans Q forment deux familles Q_{\pm} , elles-mêmes isomorphes (algébriquement) à la quadrique initiale, et on obtient deux applications $\varphi_{\pm} : S \rightarrow Q$, elles aussi totalement isotropes (mais pouvant dégénérer, i.e. être de rang < 2).

Dans ce cadre, la trialité est le fait que les relations d’incidence naturelles entre éléments de Q, Q_+, Q_- définissent une structure hautement symétrique, dont les automorphismes permutent arbitrairement les trois quadriques. Ce fait est classique, voir [vdBS] et ses références, dont [Cart].

La “trialité différentielle” dont il s’agit ici affirme que $\varphi : S \rightarrow Q$ et ses deux “applications de Gauss” $\varphi_{\pm} : S \rightarrow Q_{\pm}$ jouent aussi des rôles parfaitement symétriques (au moins génériquement), et on montrera que ceci permet de retrouver le théorème de Darboux.

Dans la suite, on commence par rappeler sections 2 à 4 les faits “classiques”² ci-dessus, ainsi que quelques autres qui leurs sont reliés, comme la notion de seconde forme fondamentale projective, la trialité projective évoquée ci-dessus et le théorème de Darboux-Sauer sur l’invariance projective de la rigidité infinitésimale. Puis on étudie section 5

¹Le cas usuel correspond à la quadrique projective de signature $(n + 1, 1)$ dans $\mathbb{R}P^{n+1} = P(\mathbb{R}^{n+2})$, i.e. \mathbb{S}^n , qui est une compactification conforme de $\mathbb{R}_{\text{eucl}}^n$

²mais méritant peut-être d’être rappelés

les triplets de Darboux et leurs involutions A, D , préparant le calcul section 6 des deux “applications de Gauss” φ_{\pm} de l’immersion totalement isotrope φ associée à une déformation isométrique infinitésimale (f, g) . Génériquement, elles s’expriment en termes de composantes de triplets de Darboux transformés du triplet initial (f, g, h) .

Après avoir introduit section 7 le modèle des matrices de Zorn pour les octonions déployés, on met en évidence la trialité différentielle section 8, puis on identifie section 9 les transformations de Darboux en termes de cette trialité, démontrant au passage le théorème 1. On caractérise ensuite section 10 les cas dégénérés où l’une de applications φ_{\pm} est partout de rang < 2 . Les trois “secondes formes fondamentales” associées à une immersion totalement isotrope sont définies et étudiées section 11. Enfin on considère section 12 une variété d’incidence de dimension 11, munie d’un champ de plans tangents de dimension 6, dont les immersions totalement isotropes fournissent des surfaces intégrales.

Remarquons pour finir que ces constructions pourraient permettre d’aborder le problème toujours ouvert (voir [Yau, Gho]) de l’existence de surfaces lisses compactes sans bord (nécessairement non convexes) dans \mathbb{R}^3 admettant des déformations isométriques lisses (finies) non triviales. Rappelons qu’il existe des exemples polyédraux [Kui]. On peut ainsi se demander s’il existe, dans la catégorie analytique réelle C^{ω} , des surfaces compactes sans bord admettant des déformations isométriques infinitésimales non triviales. Trotsenko a montré dans [Trot] qu’il existe des surfaces de révolution difféomorphes à S^2 possédant des déformations isométriques infinitésimales non triviales, et même un espace de dimension arbitrairement grande de telles déformations, mais comme le remarque Spivak dans [Spi], ces déformations ne sont pas lisses aux pôles.

2 La seconde forme fondamentale d’une hypersurface dans l’espace projectif

Soit $M \subset \mathbb{R}P^n$ une hypersurface de classe C^2 , p un point de M , et $f = 0$ une équation locale C^2 de M au voisinage de p . Autrement dit, M coïncide avec $f^{-1}(0)$ au voisinage de p , et $df(p) \neq 0$.

Il existe un unique hyperplan projectif H tangent à M en p , i.e. tel que $T_p H = T_p M$ (il est déterminé par $\ker df(p)$), et la restriction $\bar{f} = f|_H$ à H possède un point critique en p . Il est alors classique (et facile à prouver) que \bar{f} admet en p une différentielle seconde intrinsèque, forme bilinéaire symétrique $D^2\bar{f}(p) \in S^2 T_p^* H = S^2 T_p^* M$.

Puisque $df(p) \neq 0$, il existe une unique application bilinéaire symétrique

$$\Pi_p : S^2 T_p M \rightarrow N_p M := T_p(\mathbb{R}P^n)/T_p M$$

telle que sa composée avec

$$df(p) : N_p M \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$$

soit $-D^2\bar{f}(p)$. Si on change d’équation locale de M en p , $df(p)$ et $D^2\bar{f}(p)$ sont multipliés par un même facteur non nul, et Π_p ne dépend d’aucun choix. C’est la seconde forme fondamentale de M en p . Elle définit un sous-espace vectoriel de dimension au plus 1 dans $S^2 T_p^* M$ (via l’ensemble des isomorphismes $N_p M \simeq \mathbb{R}$), que l’on appellera structure pseudo-conforme projective de M en p .

Exemple 1. Soit q une forme quadratique sur \mathbb{R}^n , et $M \subset \mathbb{R}^{n+1} \subset \mathbb{R}P^{n+1}$ le graphe $\{t = q(x)\}$. Alors la structure pseudo-conforme projective de M s'identifie via la projection $M \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$ à celle associée au champ constant de formes quadratiques

$$x \in \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{I}_x = 2q \in S^2(\mathbb{R}^n)^* \simeq S^2T_x^*\mathbb{R}^n.$$

Cela se vérifie sans difficulté, avec $f(x, t) = q(x) - t$ et N_pM identifié à l'axe vertical, mais peut aussi se déduire de l'existence d'une action affine transitive sur $M \subset \mathbb{R}^{n+1}$ qui relève celle des translations sur \mathbb{R}^n :

$$(x, t) \mapsto (x + v, t + dq(x)v + q(v)), \quad (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1}, v \in \mathbb{R}^n.$$

Cette action est bien sûr restriction d'une action projective, et ne reste plus que le calcul trivial en $(x, y) = (0, 0)$.

Exemple 2. Dans l'exemple précédent, si on suppose q non dégénérée, M est contenue dans la quadrique projective lisse $Q \subset \mathbb{R}P^{n+1}$ d'équation $q(x) - st = 0$ en coordonnées homogènes $(s : x : t)$. Plus précisément, $M = Q \setminus H$, où H est l'hyperplan à l'infini $s = 0$, qui est tangent à Q au point à l'infini sur l'axe vertical $p = (0 : 0 : 1)$. Prenant $q(x) = |x|^2$ euclidienne, et H' l'hyperplan $s + t = 0$, on voit que Q s'identifie à une sphère dans l'espace affine $\mathbb{R}P^{n+1} \setminus H'$, et que la projection stéréographique $\pi : Q \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ depuis p s'identifie à la projection verticale de l'exemple précédent. On retrouve ainsi le fait que π est conforme, vu la définition projective de (la classe conforme de) la seconde forme fondamentale.

Ces exemples montrent que tout espace affine réel muni d'une métrique pseudo-riemannienne plate de signature (p, q) admet une compactification (pseudo-) conforme naturelle, qui est une quadrique projective lisse de signature $(p + 1, q + 1)$ dans un espace projectif de dimension $p + q + 1$. Le "lieu à l'infini" qui est ajouté est le cône sur une quadrique projective de signature (p, q) (un simple point si p ou q est nul).

3 Trialité

Parmi les algèbres de Lie simples complexes, celle de type D_4 , autrement dit $\mathfrak{so}(8, \mathbb{C})$ est exceptionnelle en ce qu'elle admet un automorphisme extérieur d'ordre 3, qui permute cycliquement les trois branches (de longueur 1) de son diagramme de Dynkin en forme de Y. Ce fait peut paraître bien abstrait, mais il s'incarne géométriquement de manière très concrète dans la quadrique réelle Q de signature $(4, 4)$ dans $\mathbb{R}P^7$, espace homogène du groupe de Lie réel $PO(4, 4)$ de type D_4 .

Plus précisément, considérons l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}^{4,4} = \mathbb{R}^4 \oplus \mathbb{R}^4$ muni de la forme quadratique $q(u, v) = |u|^2 - |v|^2$ de signature $(4, 4)$. Alors Q est l'espace des droites vectorielles isotropes pour q .

Un sous-espace isotrope maximal (de dimension 4) de $\mathbb{R}^{4,4}$ n'est autre que le graphe d'une isométrie euclidienne $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, et la variété de ces sous-espaces a donc deux composantes connexes, identifiées à celles $O^\pm(4)$ du groupe réel $O(4)$.

Or $SO(4) = O^+(4)$ est classiquement isomorphe à $S^3 \times S^3 / \pm(1, 1)$, en voyant S^3 comme le groupe multiplicatif des quaternions de norme 1, agissant par multiplications à gauche et à droite sur l'algèbre des quaternions identifiée à \mathbb{R}^4 .

Mais $S^3 \times S^3 / \pm(1, 1)$ est précisément une copie de la quadrique projective Q d'équation homogène $|u|^2 - |v|^2 = 0$. Ainsi les deux familles de $\mathbb{R}P^3$ contenues dans Q sont deux copies Q_{\pm} de la quadrique Q .

Il existe entre deux quelconques de ces quadriques une relation d'incidence. Entre Q et Q_{\pm} , c'est simplement la relation d'appartenance, et entre Q_+ et Q_- , c'est la condition d'avoir une intersection maximale, autrement dit un plan projectif (contenu dans Q).

En termes d'isométries euclidiennes $g_{\pm} \in O^{\pm}(4)$, cela signifie que g_+ et g_- coïncident sur un sous-espace de dimension 3, autrement dit différent par une réflexion hyperplane (on voit ainsi que les éléments de Q_- incidents à un élément fixé de Q_+ forment un $\mathbb{R}P^3$, et vice-versa).

De même, on voit que tout plan projectif contenu dans Q est inclus dans exactement un élément de Q_+ et un élément de Q_- , éléments dont il est l'intersection. Le fait qu'un sous-espace vectoriel V de $\mathbb{R}^{4,4}$ totalement isotrope de dimension 3 est contenu dans exactement deux sous-espaces totalement isotropes maximaux peut aussi se voir simplement en remarquant que $V^{\perp}/V \simeq \mathbb{R}^{1,1}$ a exactement deux droites isotropes.

Le résultat suivant est plus profond

Théorème 2. *Le groupe des bijections de l'union disjointe $Q \cup Q_+ \cup Q_-$ qui respectent les relations d'incidence agit sur les composantes en les permutant arbitrairement.*

C'est l'origine du terme triarité, en référence au fait analogue pour l'union d'un espace projectif et de son dual, à savoir la dualité (projective).

La preuve la plus simple de ce théorème (voir [vdBS]) consiste à introduire sur $\mathbb{R}^{4,4}$ une structure d'algèbre (non associative, à unité), celle des octonions déployés, pour laquelle la forme quadratique q est multiplicative. On montre alors que Q_{\pm} sont paramétrés projectivement par les octonions de norme nulle a , via leurs annulateurs gauche et droit, et que les relations d'incidence entre a, a_+, a_- sont simplement $aa_- = 0$, $a_-a_+ = 0$, $a_+a = 0$. Le théorème en résulte aussitôt.

On utilisera par la suite un modèle particulier des octonions déployés, bien adapté aux calculs, celui des matrices de Zorn (voir section 7).

4 Déformations isométriques infinitésimales

Soit S une surface et $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ une immersion dans l'espace euclidien, toutes deux lisses. Une déformation infinitésimale de S est un champ de vecteurs $g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ le long de S , et elle est isométrique si la dérivée en $t = 0$ de la métrique riemannienne $|df_t|^2 = |df|^2 + 2t df \cdot dg + t^2 |dg|^2$ induite par $f_t = f + tg$ est nulle, autrement dit si

$$df \cdot dg = 0.$$

Un déplacement infinitésimal $g = a \times f + b$ (où $a, b \in \mathbb{R}^3$ et \times désigne le produit vectoriel) est une déformation infinitésimale triviale.

Considérant le couple $\varphi = (f, g)$ comme une immersion de S dans l'espace pseudo-riemannien $\mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}^3$ muni de la métrique plate $dx \cdot dy$, cette condition dit simplement que φ est une immersion totalement isotrope : l'image de $d\varphi(p)$ est totalement isotrope pour tout point p de S .

Cette condition ne dépendant évidemment que de la structure (pseudo-)conforme définie par $dx \cdot dy$, il est naturel d'après la section 2 de considérer φ comme une immersion dans la quadrique projective réelle de signature $(4, 4)$

$$Q = \{(x : s : y : t) \in \mathbb{R}P^7 \mid x \cdot y + st = 0\},$$

donnée par

$$\varphi = (f : 1 : g : -f \cdot g).$$

On notera q la forme quadratique $q(x, s, y, t) = x \cdot y + st$, et $\mathbb{R}^{4,4}$ l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4 \oplus \mathbb{R}^4$ muni de cette forme.

La condition d'isométrie infinitésimale sur (f, g) est équivalente à la totale isotropie de l'immersion $\varphi : S \rightarrow Q$ ci-dessus pour la seconde forme fondamentale projective de Q , et revient à demander que pour tout $p \in S$ le plan projectif $\tau_p \varphi$ tangent à φ en p soit contenu dans Q .

On sait alors (voir section 3) que $\tau_p \varphi$ est contenu dans exactement deux espaces projectifs de dimension 3 contenus dans Q , soit $\varphi_{\pm}(p)$, d'où deux applications

$$\varphi_{\pm} : S \rightarrow Q_{\pm}.$$

Pour fixer les notations on désignera par Q_+ la composante contenant les graphes $(a, b)_+$ des applications linéaires (antisymétriques si on identifie les \mathbb{R}^4 source et but)

$$(x, s) \mapsto (y, t) = (a \times x + bs, -b \cdot x)$$

$a, b \in \mathbb{R}^3$, et par Q_- celle contenant les "graphes tordus" $(a, b)_-$ des applications

$$(x, t) \mapsto (y, s) = (a \times x + bt, -b \cdot x)$$

$a, b \in \mathbb{R}^3$. Noter que ces graphes décrivent des ouverts affines³ (denses) de Q_+ et Q_- .

Lorsque $\varphi : S \rightarrow Q$ provient de $(f, g) : S \rightarrow \mathbb{R}^{3,3}$ avec $g = a \times f + b$ un déplacement infinitésimal, φ_+ est constante, égale à $(a, b)_+$.

Un autre cas de dégénérescence se rencontre si $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ prend ses valeurs dans un plan affine P évitant l'origine et g est un champ de vecteurs lisse quelconque normal à ce plan, de sorte qu'on a bien $df \cdot dg = 0$. Alors on vérifie aisément que φ_- est constante, égale à $(0, b)_-$ si P a pour équation $b \cdot x = -1$. On pourrait encore ajouter à g une rotation infinitésimale $a \times f$ pour obtenir $\varphi_- = (a, b)_-$.

Pour mieux visualiser la situation, remarquons que la condition $df \cdot dg = 0$ équivaut au fait que les deux immersions $f \pm \varepsilon g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ sont isométriques, pour un $\varepsilon > 0$ assez petit, puisque

$$|df \pm \varepsilon dg|^2 = |df|^2 + \varepsilon^2 |dg|^2 \pm 2\varepsilon df \cdot dg.$$

Lorsque g est un déplacement infinitésimal, $f \pm \varepsilon g$ diffèrent par une isométrie affine directe de \mathbb{R}^3 , et φ_+ est constante. Par contre dans le second cas, $f \pm \varepsilon g$ diffèrent par la réflexion orthogonale par rapport à P , et c'est φ_- qui est constante, mais pas φ_+ en général.

³Au sens de la géométrie algébrique : ils sont complémentaires de l'intersection avec un hyperplan dans un plongement projectif, ici le plongement de Plücker $Q_{\pm} \rightarrow \text{Gr}_4(\mathbb{R}^8) \rightarrow P(\wedge^4 \mathbb{R}^8)$.

Définition. On dit qu'une immersion $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ est infinitésimalement rigide si toute déformation isométrique infinitésimale g est un déplacement infinitésimal $g = a \times f + b$, $a, b \in \mathbb{R}^3$.

Pour passer commodément du cadre projectif au cadre affine, remarquons que la quadrique Q contient deux espaces projectifs de dimension 3 disjoints $P_1 = P(\mathbb{R}^4 \oplus 0)$ et $P_2 = P(0 \oplus \mathbb{R}^4)$ et qu'on dispose de deux projections $\pi_1 : Q \setminus P_2 \rightarrow P_1$, $\pi_2 : Q \setminus P_1 \rightarrow P_2$. En particulier si $\varphi = (f : 1 : g : -f \cdot g)$, $\pi_1 \circ \varphi = (f : 1)$ s'identifie à $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3 \subset P_1 \simeq \mathbb{R}P^3$. De plus, la projection π_1 possède une structure naturelle de fibré vectoriel qui l'identifie au fibré $\text{Hom}(L^\perp, L)$, où $L \subset P_1 \times \mathbb{R}^4$ est le fibré en droites tautologique, de sorte que π_1 s'identifie à la projection du fibré (co-)tangent à $P_1 \simeq \mathbb{R}P^3$.

Alors une immersion $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ est infinitésimalement rigide si et seulement si toute immersion totalement isotrope $\varphi : S \rightarrow Q$ relevant f , i.e. telle que $\pi_1 \circ \varphi = f : S \rightarrow \mathbb{R}^3 \subset \mathbb{R}P^3$, est telle que φ_+ est constante.

Un résultat classique est que c'est le cas lorsque f est un plongement de la sphère à courbure de Gauss strictement positive. Au contraire, ce n'est pas le cas dès que f envoie un ouvert dans un plan (voir ci-dessus). Un autre fait classique est qu'au voisinage d'un point où la courbure de Gauss de f ne s'annule pas, il y a un espace de dimension infinie de déformations isométriques infinitésimales, correspondant aux solutions locales d'une EDP linéaire d'ordre 2 de type elliptique ou hyperbolique.

Compte tenu de la nature métrique de la définition, le résultat suivant est un peu surprenant

Théorème 3. (*Darboux-Sauer*) *La rigidité infinitésimale est projectivement invariante. Si $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3 \subset \mathbb{R}P^3$ est une immersion, et $\alpha \in \text{PGL}_4(\mathbb{R}) = \text{Aut}(\mathbb{R}P^3)$ est une transformation projective telle que $\alpha \circ f(S) \subset \mathbb{R}^3$, alors $\alpha \circ f$ est infinitésimalement rigide si et seulement si f l'est.*

Démonstration. La preuve consiste à remarquer que le groupe $\text{PGL}_4(\mathbb{R})$ agit sur $\mathbb{R}P^7 = P(\mathbb{R}^4 \oplus \mathbb{R}^4)$ en respectant la quadrique Q et ses sous-espaces projectifs P_1, P_2 , et en commutant à la projection $\pi_1 : Q \setminus P_2 \rightarrow P_1$: il suffit de faire agir $A \in \text{GL}_4(\mathbb{R})$ par $\text{diag}(A, {}^t A^{-1}) \in \text{SO}(q)$ sur $\mathbb{R}^4 \oplus \mathbb{R}^4$, et de noter que cette action préserve Q_+ , car elle en fixe l'élément $(0, 0)_+ = P(\mathbb{R}^4 \oplus 0) = P_1$. \square

Remarque. Cette preuve montre que les ensembles de déformations isométriques infinitésimales d'une immersion f et de sa transformée projective $\alpha \circ f$ se correspondent bijectivement, et que cette correspondance est linéaire (ce sont des espaces vectoriels). Cela tient au fait que l'action de $\text{PGL}_4(\mathbb{R})$ ci-dessus respecte la structure de fibré vectoriel sur $\pi_1 : Q \setminus P_2 \rightarrow P_1$: cette action s'identifie à celle de $\text{PGL}_4(\mathbb{R})$ sur le fibré cotangent $T^*\mathbb{R}P^3 \rightarrow \mathbb{R}P^3$ (isomorphe au fibré tangent).

Remarque. Darboux démontre ce résultat dans [Darb, Ch. IV, n° 900], et il prouve aussi l'invariance par dualité projective (ou plutôt "transformation par polaires réciproques"). Sauer reprend l'étude (trente ans plus tard) dans [Sau] en utilisant les coordonnées (projectives) de Plücker sur l'espace des droites affines de \mathbb{R}^3 . Voir [Izm], pour une exposition récente. L'introduction de la quadrique Q simplifie quelque peu les calculs, et fait apparaître le groupe de symétries $\text{Aut}(Q) \simeq \text{PGO}(4, 4)$ (de dimension 28), déjà présent

en filigrane dans [Darb, ch.IV, n° 903, 907]. On peut aussi appliquer cette méthode de preuve dans le cas discret (polyèdres et “armatures”⁴), ainsi qu’en plus grande dimension.

5 Triplets de Darboux

Soit $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ une immersion, et $g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ une déformation isométrique infinitésimale (toutes deux lisses). L’équation $df \cdot dg = 0$ entraîne qu’il existe une unique application $h : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que

$$dg = h \times df,$$

car une rotation de \mathbb{R}^3 , même infinitésimale, est déterminée par sa restriction à un plan vectoriel quelconque.

Définition. On appellera *triplet de Darboux* sur une surface S les triplets d’applications lisses (f, g, h) de S vers \mathbb{R}^3 vérifiant cette relation.

Si on pose avec Darboux $\tilde{g} = g - h \times f$, on obtient $d\tilde{g} = f \times dh$, i.e. $(h, \tilde{g}, f) = A(f, g, h)$ est un triplet de Darboux. En particulier $\tilde{g} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ est une déformation isométrique infinitésimale de $h : S \rightarrow \mathbb{R}^3$, même si cette dernière n’est pas nécessairement une immersion. Ainsi, un déplacement infinitésimal $g = a \times f + b$ ($a, b \in \mathbb{R}^3$), donne les applications constantes $h = a$ et $\tilde{g} = b$.

De même, la symétrie de l’équation $df \cdot dg = 0$ entraîne que, au moins dans l’ouvert S' de S où dg est de rang 2, il existe une unique application $h^* : S' \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $df = h^* \times dg$, et $(g, f, h^*) = D(f, g, h)$ est un triplet de Darboux sur S' .

Il est clair que A est une involution, et que D en est une sur les triplets de Darboux (f, g, h) où f et g sont des immersions, ce qui équivaut à $h \notin \text{im } df$. On va maintenant préciser la nature de h^* .

Tout d’abord, le fait que $h \times df = dg$ est fermée (comme 1-forme à valeurs vectorielles) entraîne que $\text{im } dh$ est contenue dans $\text{im } df$. En effet, dans des coordonnées locales sur S on a $\partial_1 h \times \partial_2 f = \partial_2 h \times \partial_1 f$, et en décomposant chaque $\partial_i h$ dans la base $\partial_1 f, \partial_2 f, \nu_f$, où ν_f engendre $(\text{im } df)^\perp$, on obtient aisément $\partial_i h \in \text{im } df$.

Des égalités

$$df = h^* \times dg = h^* \times (h \times df) = (h^* \cdot df)h - (h^* \cdot h)df,$$

il découle (en appliquant $h \times$) que

$$dg = -(h^* \cdot h)dg,$$

d’où

$$h^* \cdot h = -1, \quad h^* \cdot df = 0.$$

Comme $\text{im } dh$ est contenue dans $\text{im } df$, on a $h^* \cdot dh = 0$, de sorte que si h est une immersion, h^* est la surface polaire de h par rapport à la quadrique $x \cdot x = -1$. Autrement dit, le plan affine tangent à h en $p \in S$ a pour équation $h^*(p) \cdot x + 1 = 0$, et en particulier $h^*(p)$ n’est pas défini si ce plan contient $0 \in \mathbb{R}^3$ (h^* doit alors être interprété projectivement).

Inversement on peut étendre l’involution D à cette situation

⁴pour “frameworks”

Lemme 4. Soit (f, g, h) un triplet de Darboux tel que h soit une immersion dont les plans affines tangents évitent l'origine 0. Alors (g, f, h^*) est un triplet de Darboux, que l'on prendra pour définition de $D(f, g, h)$.

Démonstration. Le fait que $h \times df = dg$ est fermée entraîne maintenant $\text{im } df \subset \text{im } dh$, donc $h^* \cdot df = 0$. Dès lors $h^* \times dg = h^* \times (h \times df) = (h^* \cdot df)h - (h^* \cdot h)df = df$. Cette définition est consistante, i.e. les deux définitions de $D(f, g, h)$ coïncident quand elles s'appliquent toutes deux, comme il résulte des calculs précédant le lemme. \square

On peut donc appliquer l'involution D au triplet $A(f, g, h) = (h, \tilde{g}, f)$ dès lors que f est une immersion à plan affine tangent évitant l'origine, obtenant le triplet $DA(f, g, h) = (\tilde{g}, h, f^*)$, et enfin on peut considérer $ADA(f, g, h) = (f^*, \tilde{h}, \tilde{g}) = (f^*, h - f^* \times \tilde{g}, \tilde{g})$ qui interviendra dans la section suivante.

Remarque. Dans l'étude locale des déformations infinitésimales isométriques g d'une immersion $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$, l'hypothèse que g est une immersion n'est pas réellement restrictive, car on peut modifier trivialement g en lui ajoutant une rotation infinitésimale $a \times f$, et pour un $a \in \mathbb{R}^3$ générique $g + a \times f$ sera une immersion au voisinage de tout point $p \in S$ fixé à l'avance (il suffit que $h + a \notin \text{im } df$). De même, l'hypothèse que les hyperplans affines tangents f évitent l'origine peut être satisfaite au voisinage de p en remplaçant f par $f + b$ pour un $b \in \mathbb{R}^3$ générique.

6 Calcul de φ_{\pm}

Soit $\varphi = (f : 1 : g : -f \cdot g) : S \rightarrow Q$ l'immersion totalement isotrope associée à une immersion $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ et à sa déformation isométrique infinitésimale g , et $h : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ vérifiant $dg = h \times df$. Alors le plan projectif tangent à φ en $p \in S$ est $\tau_p \varphi = P(V_p)$, où $V_p = \mathbb{R}\psi(p) \oplus \text{im } d\psi(p)$ est totalement isotrope de dimension 3 dans $\mathbb{R}^{4,4}$ et

$$\psi = (f, 1, g, -f \cdot g) : S \rightarrow \mathbb{R}^{4,4}.$$

On vérifie alors sans peine à partir de $dg = h \times df$ et $\tilde{g} = g - h \times f$ que V_p^{\perp} a pour équations en $(x, s, y, t) \in \mathbb{R}^{4,4}$ (et en sous-entendant l'évaluation en p)

$$(y - h \times x - \tilde{g}s) \cdot df = 0, \quad (x - sf) \cdot g + y \cdot f + t = 0,$$

que l'on peut réécrire

$$y = h \times x + \tilde{g}s + \lambda \nu_f, \quad t = -\tilde{g} \cdot x - \lambda \nu_f \cdot f,$$

où $\nu_f \in \mathbb{R}^3$ engendre $(\text{im } df)^{\perp}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Si $(x, s, y, t) \in V_p^{\perp}$, on a donc $x \cdot y + st = \lambda \nu_f \cdot (x - sf)$, de sorte que les deux sous-espaces totalement isotropes maximaux de $\mathbb{R}^{4,4}$ contenant V_p sont donnés par les équations additionnelles $\lambda = 0$ et $\nu_f \cdot (x - sf) = 0$, soit encore

$$V_p^+ \begin{cases} y &= h \times x + \tilde{g}s \\ t &= -\tilde{g} \cdot x \end{cases}$$

$$V_p^- \begin{cases} y &= h \times x + \tilde{g}s + \lambda \nu_f \\ t &= -\tilde{g} \cdot x - \lambda \nu_f \cdot f \\ 0 &= \nu_f \cdot (x - sf) \end{cases}$$

En particulier, avec les paramétrages $(\cdot, \cdot)_\pm$ d'ouverts affines de Q_\pm par $\mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}^3$ donnés section 4 on a

$$\varphi_+ = (h, \tilde{g})_+ .$$

Pour donner à V_p^- une allure plus présentable, commençons par supposer que $\nu_f \cdot f \neq 0$ en p . On peut alors définir $f^* = -\nu_f / (\nu_f \cdot f)$, polaire de f par rapport à la quadrique $x \cdot x + 1 = 0$ (voir la section précédente), et les équations définissant V_p^- peuvent s'écrire

$$V_p^- \begin{cases} y &= h \times x + \tilde{g}s - \lambda(\nu_f \cdot f)f^* \\ t &= -\tilde{g} \cdot x - \lambda\nu_f \cdot f \\ s &= -f^* \cdot x \end{cases}$$

ou encore, en éliminant $\lambda\nu_f \cdot f$ entre les deux premières équations

$$V_p^- \begin{cases} y &= h \times x + \tilde{g}s + (\tilde{g} \cdot x + t)f^* \\ s &= -f^* \cdot x \end{cases}$$

qui peut aussi s'écrire

$$V_p^- \begin{cases} y &= (h - f^* \times \tilde{g}) \times x + f^*t \\ s &= -f^* \cdot x \end{cases}$$

Noter que (\tilde{g}, h, f^*) est un triplet de Darboux d'après la section précédente, donc aussi son image $A(\tilde{g}, h, f^*) = (f^*, \tilde{h}, \tilde{g}) = (f^*, h - f^* \times \tilde{g}, \tilde{g})$. En particulier, on a

$$\varphi_- = (\tilde{h}, f^*)_-$$

là où f^* est définie.

Quand $\nu_f \cdot f$ s'annule en p , les équations définissant V_p^\perp données plus haut deviennent

$$V_p^\perp \begin{cases} y &= h \times x + s\tilde{g} + \lambda\nu_f \\ t &= -\tilde{g} \cdot x \end{cases}$$

et la forme quadratique $x \cdot y + st$ vaut $\lambda\nu_f \cdot x$ sur ce sous-espace, de sorte que V_p^- est donné par l'équation additionnelle

$$\nu_f \cdot x = 0.$$

Remarquons que $\nu_f \cdot f$ s'annule identiquement si et seulement si l'immersion f prend ses valeurs dans un cône de sommet 0. Cependant, même dans ce cas le sous-espace V_p^- précédent est parfaitement défini, et son image projective est $\varphi_-(p)$.

7 Matrices de Zorn [vdBS]

On considère l'algèbre \mathcal{Z} des matrices de Zorn sur \mathbb{R}

$$\begin{pmatrix} a & x \\ y & b \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}, x, y \in \mathbb{R}^3$$

de produit

$$\begin{pmatrix} a & x \\ y & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & x' \\ y' & b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' + x \cdot y' & ax' + b'x - y \times y' \\ a'y + by' + x \times x' & x' \cdot y + bb' \end{pmatrix}$$

Alors le “déterminant”

$$N\left(\begin{pmatrix} a & x \\ y & b \end{pmatrix}\right) = ab - x.y$$

est multiplicatif, car son défaut de multiplicativité avec le produit “standard”, i.e. sans les produits vectoriels, est $(x \cdot y')(x' \cdot y) - (x \cdot y)(x' \cdot y')$, qui est l’opposé du seul terme supplémentaire $(x \times x') \cdot (y \times y')$ introduit par ces produits vectoriels.

Comme \mathcal{Z} a clairement une unité, il en résulte que \mathcal{Z} est une algèbre d’octonions déployée (sur \mathbb{R}). En particulier les sous-espaces totalement isotropes maximaux de \mathcal{Z} sont les annulateurs gauches et droits des éléments isotropes non nuls de \mathcal{Z} (voir section 3).

Par exemple, on vérifie aisément que l’annulateur à gauche de

$$\begin{pmatrix} 1 & u \\ v & u \cdot v \end{pmatrix} \in \mathcal{Z}$$

n’est autre que l’image du sous-espace de $\mathbb{R}^{4,4}$ noté $(u, v)_-$ section 4 par l’application

$$\begin{aligned} \rho : \quad \mathbb{R}^{4,4} &\rightarrow \mathcal{Z} \\ (x, s, y, t) &\mapsto \begin{pmatrix} s & x \\ y & -t \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

qui est une anti-isométrie, i.e. $N(\rho(x, s, y, t)) = -x \cdot y - st$.

L’annulateur à droite du même élément de \mathcal{Z} est quant à lui l’image par $\rho\sigma$ de $(v, u)_-$ (sic), avec $\sigma(x, s, y, t) = (y, s, x, t)$. Un calcul sans difficulté montre alors que si $u \cdot v \neq 0$, ce sous-espace est l’image par ρ de $(-u/(u \cdot v), -v/(u \cdot v))_+$. Plus généralement $(u, v)_+$ est l’annulateur à droite de

$$\begin{pmatrix} u \cdot v & -u \\ -v & 1 \end{pmatrix} = \overline{\begin{pmatrix} 1 & u \\ v & u \cdot v \end{pmatrix}} \in \mathcal{Z},$$

où $Z \mapsto \overline{Z}$ désigne l’anti-automorphisme de conjugaison dans \mathcal{Z} .

En particulier, en identifiant $\mathbb{R}^{4,4}$ à \mathcal{Z} par l’application ρ , on peut paramétrer Q_+ par $Q \subset P(\mathcal{Z})$ via l’application $\mathbb{R}Z_+ \mapsto \ker L_{Z_+}$, ($Z_+ \in \mathcal{Z} \setminus \{0\}$, $N(Z_+) = 0$) et de même pour Q_- via $\mathbb{R}Z_- \mapsto \ker R_{Z_-}$, où L_Z et R_Z désignent les multiplications à gauche et à droite par Z dans \mathcal{Z} .

Lemme 5. [vdBS] *La relation d’incidence $\dim(\ker L_{Z_+} \cap \ker R_{Z_-}) = 3$ entre Q_+ et Q_- équivaut à $Z_-Z_+ = 0$.*

Démonstration. Il suffit de le vérifier dans un ouvert dense de $Q_+ \times Q_-$, car les deux relations définissent des sous-variétés compactes de $Q_+ \times Q_-$ (toutes deux fibrées en $\mathbb{R}P^3$ sur Q_\pm). Or un calcul rapide montre que $(a, b)_+$ et $(a', b')_-$ sont incidents si et seulement si

$$a' - a = b \times b',$$

et d’après ce qui précède ils s’identifient via ρ à $\ker L_{Z'}$ et $\ker R_{Z'}$ où

$$Z' = \begin{pmatrix} 1 & a' \\ b' & a' \cdot b' \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} a \cdot b & -a \\ -b & 1 \end{pmatrix}.$$

Il n’y a plus qu’à vérifier que la relation ci-dessus équivaut à $Z'Z = 0$ dans l’algèbre \mathcal{Z} . \square

8 Trialité différentielle

Soit \mathcal{O} une algèbre d'octonions déployés sur \mathbb{R} , $Q \subset P(\mathcal{O})$ la quadrique des droites isotropes de \mathcal{O} , $\varphi : S \rightarrow Q$ une immersion totalement isotrope d'une surface. Alors, quitte à restreindre à un ouvert (ou bien passer à un revêtement double) de S , φ se relève en $\psi : S \rightarrow \mathcal{O} \setminus \{0\}$, et pour tout $p \in S$, le sous-espace $V_p = \mathbb{R}\psi(p) + \text{im } d\psi(p)$ de \mathcal{O} est totalement isotrope de dimension 3.

Les deux sous-espaces totalement isotropes maximaux contenant V_p sont $\ker L_{\psi_+(p)}$ et $\ker R_{\psi_-(p)}$ pour des applications lisses $\psi_{\pm} : S \rightarrow \mathcal{O} \setminus \{0\}$ (là encore quitte à travailler localement), de sorte qu'en termes de la structure d'algèbre de \mathcal{O}

$$\begin{aligned} \psi_+ \psi &= 0, & \psi \psi_- &= 0, & \psi_- \psi_+ &= 0 \\ \psi_+ d\psi &= 0, & d\psi \psi_- &= 0, & & \end{aligned}$$

d'où aussi (Leibniz)

$$d\psi_+ \psi = 0, \quad \psi d\psi_- = 0, \quad d\psi_- \psi_+ + \psi_- d\psi_+ = 0.$$

La trialité différentielle se résume alors à l'énoncé

Proposition 6. *On a en fait $d\psi_- \psi_+ = \psi_- d\psi_+ = 0$.*

Démonstration. Si X, Y, Z sont des champs de vecteurs tangents à S , $XY\psi$ est orthogonal à ψ , car $V = \mathbb{R}\psi + \text{im } d\psi$ étant totalement isotrope,

$$0 = X\langle Y\psi, \psi \rangle = \langle XY\psi, \psi \rangle + \langle Y\psi, X\psi \rangle = \langle XY\psi, \psi \rangle.$$

De plus $XY\psi$ est orthogonal à $Z\psi$, car en dérivant $\langle Y\psi, Z\psi \rangle = 0$ on obtient

$$\langle XY\psi, Z\psi \rangle + \langle Y\psi, XZ\psi \rangle = 0,$$

ce qui montre que la quantité $\langle XY\psi, Z\psi \rangle$ est antisymétrique en Y, Z , alors qu'elle est symétrique en X, Y . Par un lemme classique, elle est donc nulle.

En particulier, $XY\psi$ prend ses valeurs dans

$$V^\perp = (\ker L_{\psi_+} \cap \ker R_{\psi_-})^\perp.$$

Avant de poursuivre la preuve, rappelons le

Lemme 7. *Pour $a \in \mathcal{O}$ posons $\text{Re}(a) = \langle a, 1 \rangle$ et $\bar{a} = 2\text{Re}(a)1 - a$. Alors $a \mapsto \bar{a}$ est un anti-automorphisme de \mathcal{O} et $L_a, L_{\bar{a}}$ sont adjoints, de même que R_a et $R_{\bar{a}}$. De plus $L_a L_{\bar{a}} = N(a)\text{Id} = R_{\bar{a}} R_a$.*

Si $a, b \in \mathcal{O} \setminus \{0\}$ vérifient $ba = 0$, on a $a(\mathcal{O}\bar{b}) = \mathbb{R}\bar{b}$ et $(\bar{a}\mathcal{O})b = \mathbb{R}\bar{a}$.

Démonstration. Voir [vdBS]. Disons simplement qu'elle s'obtient en polarisant l'identité multiplicative satisfaite par la norme, ce qui donne pour $a, b, x, y \in \mathcal{O}$

$$\langle ax, by \rangle + \langle ay, bx \rangle = 2\langle a, b \rangle \langle x, y \rangle,$$

puis en appliquant cette identité un nombre suffisant de fois. Par exemple, on obtient sous les hypothèses du lemme $a(x\bar{b}) = 2\text{Re}(ax)\bar{b}$, d'où la seconde assertion (l'autre identité

s'en déduit par conjugaison). \square

Revenant à la preuve de la proposition, il résulte du lemme que

$$V^\perp = \text{im } L_{\overline{\psi}_+} + \text{im } R_{\overline{\psi}_-} = \overline{\psi}_+ \mathcal{O} + \mathcal{O} \overline{\psi}_-,$$

puis que $\psi_+(XY\psi) \in \mathbb{R}\overline{\psi}_-$ et $(XY\psi)\psi_- \in \mathbb{R}\overline{\psi}_+$, car $\psi_-\psi_+ = 0$.

On obtient ainsi deux champs de formes bilinéaires symétriques sur S , notés $\Pi_\mp \in S^2T^*S$, bien définis à multiplication près par des fonctions ne s'annulant pas, i.e. deux structures pseudo-conformes (pouvant dégénérer) sur S .

Soit X un champ de vecteurs sur S et montrons que $\psi_-X\psi_+$ s'annule en $p \in S$. On peut supposer $X\psi_+(p) \neq 0$, et choisir un champ de vecteurs Y sur S tel que $Y(p) \neq 0$ et $\Pi_-(X(p), Y(p)) = 0$, i.e. $\psi_+(p)(XY\psi)(p) = 0$. Alors en dérivant dans la direction $X(p)$ l'identité $\psi_+Y\psi = 0$, on obtient $X\psi_+(p)Y\psi(p) = 0$, de sorte que $\psi(p)$ et $Y\psi(p)$ sont dans le noyau de $L_{X\psi_+(p)}$. Mais ils sont aussi dans le noyau de $R_{\psi_-(p)}$ (par définition de ψ_-), et comme l'intersection de ces noyaux est de dimension impaire elle est de dimension 3. Finalement $\psi_-(p)X\psi_+(p) = 0$ d'après le lemme 5. \square

Il en résulte que pour tout $p \in S$, tout point du plan projectif tangent $\tau_p\varphi_+ \subset Q_+$ (resp. de $\tau_p\varphi_- \subset Q_-$) est incident à $\varphi(p) \in Q$ et $\varphi_-(p) \in Q_-$ (resp. à $\varphi(p) \in Q$ et $\varphi_+(p) \in Q_+$), tout comme (par définition) tout point de $\tau_p\varphi \subset Q$ est incident à $\varphi_+(p) \in Q_+$ et $\varphi_-(p) \in Q_-$.

En particulier, si φ_+ (resp. φ_-) est une immersion, φ_- et φ (resp. φ et φ_+) sont ses deux "applications de Gauss".

9 Identification des transformations de Darboux

Il est naturel au vu des deux sections qui précèdent d'identifier chacune des quadriques Q, Q_+, Q_- avec la quadrique $Q_0 \subset P(\mathcal{Z})$ au moyen des isomorphismes

$$\begin{array}{ccc} \rho : Q \rightarrow Q_0 & \rho_+ : Q_+ \rightarrow Q_0 & \rho_- : Q_- \rightarrow Q_0 \\ (x : s : y : t) \mapsto \mathbb{R} \begin{pmatrix} s & x \\ y & -t \end{pmatrix} & \rho^{-1}(\ker L_{Z_+}) \mapsto \mathbb{R}Z_+ & \rho^{-1}(\ker R_{Z_-}) \mapsto \mathbb{R}Z_- \end{array}$$

(rappelons (section 7) que \mathcal{Z} désigne l'algèbre des matrices de Zorn sur \mathbb{R}). On obtient ainsi des isomorphismes "trialitaires"

$$\theta_\pm = \rho^{-1}\rho_\pm : Q_\pm \rightarrow Q.$$

Associons à chaque triplet de Darboux $T = (f, g, h)$ sur S l'application

$$\varphi_T = (f : 1 : g : -f \cdot g) : S \rightarrow Q.$$

Proposition 8. *Il existe des applications A et D de l'ensemble des immersions totalement isotropes $\varphi : S \rightarrow Q$ vers les applications totalement isotropes de S dans Q , telles que si $T = (f, g, h)$ est un triplet de Darboux pour lequel φ_T est une immersion (i.e. f est une immersion), $A(\varphi_T) = \varphi_{A(T)}$ et que si de plus $D(T)$ est défini, $D(\varphi_T) = \varphi_{D(T)}$.*

Démonstration. En prenant $\sigma(x : s : y : t) = (y : s : x : t)$, il est clair que $D(\varphi) = \sigma \circ \varphi$ convient. Rappelons que $D(f, g, h) = (g, f, h^*)$ n'a été défini que si g est une immersion (donc f aussi) ou si h est une immersion dont les plans affines tangents évitent l'origine. Pour traiter le cas de la transformation A , démontrons le

Lemme 9. *Soit $T = (f, g, h)$ un triplet de Darboux, avec f une immersion. Alors*

$$\theta_+ \circ (\varphi_T)_+ = (h : -h \cdot \tilde{g} : \tilde{g} : 1) = c \circ \varphi_{A(T)},$$

où c est la transformation projective induite par la conjugaison, i.e. $c(x : s : y : t) = (x : t : y : s)$.

Démonstration. En remarquant que c est induite via ρ par la conjugaison $Z \mapsto \bar{Z}$ de \mathcal{Z} , la formule peut s'écrire $\rho_+ \circ (\varphi_T)_+ = \overline{\rho \circ \varphi_{A(T)}}$, ce qui équivaut à $(\varphi_T)_+ = \ker L_{\overline{\rho \circ \varphi_{A(T)}}$. Mais cette égalité résulte du calcul de φ_+ section 6 et de l'identification de $(a, b)_+$ en termes de \mathcal{Z} section 7. \square

Le lemme montre que l'on peut prendre $A(\varphi) = c \circ \theta_+ \circ \varphi_+$, et la proposition est démontrée. \square

Pour alléger les notations, identifions les quadriques Q_\pm à Q via les isomorphismes trialitaires θ_\pm , ce qui permet de voir φ_\pm comme applications de S vers Q . La trialité différentielle démontrée dans la section 8 précédente se résume alors à la

Proposition 10. *Si $\varphi : S \rightarrow Q$ est une immersion totalement isotrope telle que φ_+ soit une immersion, on a $\varphi_{++} = \varphi_-$ et $\varphi_{+-} = \varphi$. De même, si φ_- est une immersion on a $\varphi_{--} = \varphi_+$ et $\varphi_{-+} = \varphi$.* \square

Corollaire 11. *Si $\varphi : S \rightarrow Q$ est une immersion totalement isotrope telle que φ_\pm soient aussi des immersions, les opérations $()_\pm$ sur $\{\varphi, \varphi_+, \varphi_-\}$ sont les deux générateurs d'une action de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.* \square

Le fait que c est induit par un anti-automorphisme de \mathcal{Z} entraîne que $(c \circ \varphi)_+ = c \circ \varphi_-$, et la proposition entraîne que A est une involution sur les immersions φ telles que $A(\varphi)$ soit une immersion.

De même que c , l'involution σ telle que $D(\varphi) = \sigma \circ \varphi$ est induite via ρ par un anti-automorphisme de \mathcal{Z} , la transposition. On alors $D \circ A(\varphi) = \sigma \circ c \circ \varphi_+$, et comme $\sigma \circ c$ est un automorphisme involutif de \mathcal{Z} , on voit que $(D \circ A)^2(\varphi) = \varphi_{++} = \varphi_-$ dès que cela a un sens. En particulier le corollaire précédent entraîne

Corollaire 12 (Théorème de Darboux). *La transformation $(D \circ A)^6$ est l'identité sur l'ensemble des immersions totalement isotropes $\varphi : S \rightarrow Q$ telles que φ_\pm sont aussi des immersions.* \square

On voit aussi que l'orbite de φ sous l'action du groupe D_{12} diédral d'ordre 12 engendré par A, D est constituée de $\varphi, \varphi_+, \varphi_-$ et de leurs images par les éléments non triviaux $\sigma, c, \sigma \circ c$ du groupe d'ordre 4 engendré par les involutions projectives σ et c de Q . En particulier l'involution centrale $(D \circ A)^3$ correspond à l'involution projective $\sigma \circ c$, donnée par $(x : s : y : t) \mapsto (y : t : x : s)$.

10 Dégénérescences

Il importe de comprendre les cas de dégénérescence, où l'une des applications tangentes $T_p\varphi_{\pm}$ est de rang 0 ou 1 dans un ouvert non vide de points $p \in S$ (dans l'étude locale qui suit, on remplacera S par cet ouvert).

Avant de commencer, remarquons que pour l'étude locale d'une immersion totalement isotrope $\varphi : S \rightarrow Q$, on peut se ramener (quitte à restreindre S) par un automorphisme de Q au cas où $\varphi = (f : 1 : g : -f \cdot g)$, pour une immersion $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ et sa déformation isométrique infinitésimale $g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Dans ce cas on a vu section 4 que les cas où φ_+ ou φ_- est constante correspondent respectivement aux déformations triviales (déplacement infinitésimaux) de l'immersion $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ et aux "déformations normales" de f lorsque son image est contenue dans un plan.

Supposons (la différentielle de) $\varphi_+ = (h, \tilde{g})_+$ de rang 1 en tout point de S . C'est équivalent à h de rang 1 en tout point de S , car $d\tilde{g} = f \times dh$.

On peut alors choisir des coordonnées locales (x_1, x_2) sur S telles que ∂_1 engendre $\ker dh$, d'où $\partial_1 h = \partial_1 \tilde{g} = 0$ et $\partial_1 f \times \partial_2 h = \partial_2 f \times \partial_1 h = 0$.

On en déduit que $h = h(x_2)$ et $\partial_1 f = \lambda(x_1, x_2)h'(x_2)$, pour une fonction λ ne s'annulant pas. Quitte à remplacer x_1 par $x'_1 = \int_0^{x_1} \lambda(t, x_2) dt$, on peut supposer que $\lambda = 1$, i.e. $\partial_1 f = h'(x_2)$. On a alors

$$f(x_1, x_2) = f_0(x_2) + x_1 h'(x_2),$$

autrement dit f est réglée. L'intégration de $\partial_1 g = h \times \partial_1 f = h \times h'$ montre alors que

$$g(x_1, x_2) = g_0(x_2) + x_1 h(x_2) \times h'(x_2)$$

est aussi réglée, de sorte que l'immersion $\varphi : S \rightarrow Q$ elle-même est réglée, i.e. localement de la forme

$$\varphi(x_1, x_2) = \mathbb{R}(\psi_0(x_2) + x_1 \psi_1(x_2)),$$

où ψ_0, ψ_1 sont telles que $\psi_0(x_2), \psi_1(x_2), \psi'_0(x_2), \psi'_1(x_2)$ engendrent pour tout x_2 un sous-espace totalement isotrope de $\mathbb{R}^{4,4}$ de dimension au moins 3, qui coïncide avec $\varphi_+(x_2)$ quand il est de dimension 4.

Inversement, ces équations définissent des déformations isométriques infinitésimales d'immersions réglées, pour lesquelles l'image de φ_+ est une courbe, dès lors que $g'_0 = h \times f'_0$ et que f est une bien une immersion, i.e. $\partial_1 f \times \partial_2 f = h' \times (f'_0 + x_1 h'')$ ne s'annule pas dans le domaine des (x_1, x_2) considérés.

Envisageons maintenant le cas où φ_- est de rang 1 en tout point de S . On peut supposer comme précédemment (travaillant localement) que $\varphi = (f : 1 : g : -f \cdot g)$, pour une immersion $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ et sa déformation isométrique infinitésimale $g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$. On peut aussi supposer que les plans affines tangents de f évitent l'origine, quitte à appliquer un nouvel automorphisme de Q relevant une translation de \mathbb{R}^3 . On a alors d'après la section 6 $\varphi_- = (\tilde{h}, f^*)_-$.

Comme $d\tilde{h} = \tilde{g} \times df^*$, l'hypothèse équivaut à f^* de rang 1 (rappelons que $A \circ D \circ A(f, g, h) = (f^*, \tilde{h}, \tilde{g})$ est un triplet de Darboux (section 5)). Cela signifie que f est une surface *développable*, enveloppe d'une famille à un paramètre de plans.

On peut choisir des coordonnées locales (x_1, x_2) telles que ∂_1 engendre le noyau de df^* . Alors, en abusant un peu des notations, $f^* = f^*(x_2)$, et comme $f^* \cdot f = -1$ et $f^* \cdot df = 0$, on a $f \cdot df^* = 0$ et

$$f(x_1, x_2) = f_0(x_2) + \mu(x_1, x_2) f^*(x_2) \times f^{*'}(x_2),$$

pour une fonction μ vérifiant $\partial_1 \mu \neq 0$ (que l'on peut prendre égale à x_1 si on le souhaite), et une application f_0 telle que $f^* \cdot f_0 = -1$ et $f^* \cdot f_0' = 0$.

L'égalité $d\tilde{h} = \tilde{g} \times df^*$ entraîne d'abord que $\partial_1 \tilde{h} = 0$, puis que $\partial_1 \tilde{g} \times \partial_2 f^* = 0$, de sorte que

$$\tilde{g}(x_1, x_2) = \tilde{g}_0(x_2) + \lambda(x_1, x_2) f^{*'}(x_2)$$

pour une fonction réelle λ .

En se rappelant que $\tilde{h} = h - f^* \times \tilde{g}$, l'égalité $h = \tilde{h} + f^* \times \tilde{g}$ s'écrit

$$h(x_1, x_2) = h_0(x_2) + \lambda(x_1, x_2) f^*(x_2) \times f^{*'}(x_2)$$

pour $h_0 = \tilde{h} + f^* \times \tilde{g}_0$, que l'on reporte dans $g = \tilde{g} + h \times f$ (en omettant les arguments pour plus de lisibilité), obtenant

$$g = \tilde{g}_0 + \lambda f^{*'} + (h_0 + \lambda f^* \times f^{*'}) \times (f_0 + \mu f^* \times f^{*'}),$$

qui se réduit à

$$g(x_1, x_2) = g_0(x_2) + \mu(x_1, x_2) h_0(x_2) \times (f^*(x_2) \times f^{*'}(x_2))$$

en utilisant $f^* \cdot f_0 = -1$ et $f^{*'} \cdot f_0$.

Quant à la condition de fermeture $\partial_1 h \times \partial_2 f = \partial_2 h \times \partial_1 f$, elle se réduit après un calcul fastidieux à une seule équation (les deux membres sont proportionnels à f^*)

$$a \partial_1(\lambda \mu) = b \partial_1 \lambda + c \partial_1 \mu,$$

pour des fonctions a, b, c de x_2 données par

$$a = \det(f^*, f^{*'}, f^{*''}), \quad b = f_0' \cdot f^{*'}, \quad c = h_0' \cdot f^{*'}.$$

Ceci équivaut clairement à l'existence d'une fonction d de x_2 telle que $a\lambda\mu = b\lambda + c\mu + d$, soit encore

$$\lambda = \frac{c\mu + d}{a\mu - b}.$$

Ainsi à x_2 fixé, le vecteur $h = h_0 + \lambda f^* \times f^{*'}$ s'obtient par application à $f = f_0 + \mu f^* \times f^{*'}$ d'une transformation projective entre les droites qu'ils parcourent.

Des formules donnant f et g il résulte qu'ici encore, l'immersion φ est réglée, i.e. localement de la forme $\varphi(x_1, x_2) = \mathbb{R}(\psi_0(x_2) + x_1 \psi_1(x_2))$, où ψ_0, ψ_1 sont telles que $\psi_0(x_2), \psi_1(x_2), \psi_0'(x_2), \psi_1'(x_2)$ engendrent pour tout x_2 un sous-espace totalement isotrope de $\mathbb{R}^{4,4}$ de dimension au moins 3, qui coïncide avec $\varphi_-(x_2)$ quand il est de dimension 4.

De ces calculs on déduit la

Proposition 13. *Supposons S compacte sans bord et S , $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ analytiques, avec g une déformation isométrique infinitésimale de l'immersion f .*

Alors l'immersion totalement isotrope $\varphi = (f : 1 : g : -f \cdot g) : S \rightarrow Q$ est telle que φ_- est de rang 2 (i.e. une immersion) sur un ouvert dense de S , et il en va de même pour φ_+ si elle est non constante.

Démonstration. En effet f n'ayant pas d'ouvert plat, ni même réglé (par analyticité et compacité), φ_- ne peut être constante ou de rang 1 sur un ouvert d'après ce qui précède. De même, si φ_+ est non constante, elle ne peut être de rang 1 sur un ouvert, pour la même raison. \square

11 Les secondes formes fondamentales

Si $\varphi : S \rightarrow Q$ est une immersion totalement isotrope, on peut la relever localement en $\psi : S \rightarrow \mathbb{R}^{4,4} \setminus \{0\}$, et alors $V = \mathbb{R}\psi + \text{im } d\psi$ est totalement isotrope de dimension 3.

On a vu section 8 que pour tous champs de vecteurs X, Y, Z tangents à S , on a $XY\psi \in V^\perp$, d'où $\langle XY\psi, Z\psi \rangle = 0$ et $\langle XY\psi, \psi \rangle = 0$, ce qui implique que pour tous X, Y, Z on a $\langle XYZ\psi, \psi \rangle = 0$. Si W est un quatrième champ de vecteurs tangents à S , on en déduit que $\langle XYZ\psi, W\psi \rangle = -\langle YZ\psi, XW\psi \rangle$ est symétrique en (W, X, Y, Z) , puisque c'est aussi $-\langle WXYZ\psi, \psi \rangle$.

Mais comme $V^\perp/V \simeq \mathbb{R}^{1,1}$ a deux droites isotropes $\mathbb{R}v_\pm$, on peut poser

$$XY\psi \pmod V = \Pi_+(X, Y)v_+ + \Pi_-(X, Y)v_-$$

pour deux formes bilinéaires symétriques $\Pi_\pm \in S^2T^*S$ bien définies à un facteur près. On peut supposer $\langle v_+, v_- \rangle = 1$, et aussi que $V + \mathbb{R}v_\pm$ appartient à Q_\pm , pour fixer les signes.

Alors la totale symétrie de $\langle WX\psi, YZ\psi \rangle$ en (W, X, Y, Z) équivaut à la condition que pour tous X, Y on a

$$\Pi_+(X, X)\Pi_-(Y, Y) + \Pi_+(Y, Y)\Pi_-(X, X) = 2\Pi_+(X, Y)\Pi_-(X, Y),$$

autrement dit Π_+ et Π_- sont orthogonales pour la forme quadratique discriminant ("apolaires")

$$\text{discr}(B) \in (\wedge^2 T^*S)^{\otimes 2} : X \wedge Y \mapsto B(X, X)B(Y, Y) - B(X, Y)^2.$$

Les formes Π_\pm sont à un facteur non nul près les mêmes que celles définies section 8 au moyen des octonions déployés $\mathcal{O} \simeq \mathbb{R}^{4,4}$ par

$$\psi_+(XY\psi) = \Pi_-(X, Y)\overline{\psi_-}, \quad (XY\psi)\psi_- = \Pi_+(X, Y)\overline{\psi_+}.$$

On les appellera *secondes formes fondamentales* de l'immersion totalement isotrope φ ⁵.

Noter que l'on a aussi

$$(\overline{XY\psi_+})\psi = \Pi_-(X, Y)\overline{\psi_-}, \quad \psi(\overline{XY\psi_-}) = \Pi_+(X, Y)\overline{\psi_+},$$

⁵La seconde forme fondamentale de l'immersion projective $\varphi : S \rightarrow Q \rightarrow \mathbb{R}P^7$ est une application linéaire $\Pi_\varphi : N_\varphi^* \rightarrow S^2T^*S$, et si φ est une immersion totalement isotrope, l'image de Π_φ est engendrée par Π_+ et Π_- .

et la trialité différentielle (proposition 6) entraîne que

$$(XY\psi_-)\psi_+ = \psi_-(XY\psi_+) = -(X\psi_-)(Y\psi_+) = \Pi(X, Y)\overline{\psi}$$

pour une troisième forme bilinéaire symétrique Π sur TS , définie à un facteur près et orthogonale aux deux formes Π_{\pm} précédentes.

En particulier

Proposition 14. *Si les formes Π_+ , Π_- , Π sont non nulles en un point $p \in S$, alors*

- soit elles sont toutes non dégénérées, l'une d'elles est définie, les deux autres sont indéfinies à directions isotropes mutuellement orthogonales et aussi orthogonales pour la forme définie,
- soit l'une des formes est de rang 1, disons $\pm\ell^2$ pour une forme linéaire non nulle $\ell \in T^*S$, les deux autres sont divisibles par ℓ , et l'une d'elles au moins est proportionnelle à ℓ^2 .

Démonstration. Il s'agit de comprendre les positions de trois points de $\mathbb{R}P^2 = P(\mathbb{R}^{1,2}) \simeq P(S^2T^*S)$ qui sont deux à deux orthogonaux vis-à-vis de la conique lisse C d'équation $\text{discr} = 0$. Si aucun n'est sur la conique, un des points est intérieur à C , les deux autres sur sa droite polaire, donc extérieurs à C , et orthogonaux entre eux. Or l'orthogonalité de deux formes quadratiques non dégénérées en dimension 2 équivaut à ce que les directions isotropes (éventuellement complexes) de l'une sont orthogonales pour l'autre.

Enfin l'orthogonal (polaire) d'un point $q = [\ell^2]$ de C est la droite tangente d à C en ce point, projectif du sous-espace de dimension 2 des formes quadratiques divisibles par ℓ . Deux points de d sont orthogonaux si et seulement si l'un d'eux est égal à q . \square

Lemme 15. *En tout point $p \in S$, $\ker(\Pi_{\pm})_p = \ker T_p\varphi_{\mp}$, et chaque noyau est contenu dans $\ker \Pi_p$.*

Démonstration. Prenons comme ci-dessus des relèvements $\psi, \psi_{\pm} : S \rightarrow \mathcal{O} \setminus \{0\}$ de φ, φ_{\pm} au voisinage de p . Le sous-espace $V = \mathbb{R}\psi(p) + \text{im } d\psi(p)$ est totalement isotrope de dimension 3, et $X \in \ker(\Pi_+)_p$ équivaut à $(Y\psi)(X\psi_-) = 0$ pour tout $Y \in T_pS$, donc à $V(X\psi_-) = 0$. Comme l'intersection de deux annulateurs gauches dans \mathcal{O} est de dimension paire, ceci équivaut à $X\psi_- \in \mathbb{R}\psi_-(p)$, autrement dit à $X \in \ker T_p\varphi_-$. De plus, $X\psi_- \in \mathbb{R}\psi_-(p)$ entraîne clairement $(X\psi_-)(Y\psi_+) = 0$ pour tout $Y \in T_pS$, i.e. $X \in \ker \Pi_p$.

Le cas de Π_- est similaire (ou s'en déduit par conjugaison). \square

On en déduit la caractérisation suivante des situations où l'une des formes Π_+ , Π_- , Π s'annule.

Proposition 16. *Pour une immersion totalement isotrope $\varphi : S \rightarrow Q$, la forme Π_+ (resp. Π_-) s'annule au point $p \in S$ si et seulement si $T_p\varphi_- = 0$ (resp. $T_p\varphi_+ = 0$). On a alors aussi $\Pi_p = 0$.*

La forme Π s'annule en p si et seulement si $T_p\varphi_- = 0$, ou $T_p\varphi_+ = 0$, ou bien $T_p\varphi_{\pm}$ sont toutes deux de rang 1. Dans ce dernier cas, $(\Pi_{\pm})_p$ sont de rang 1 et ont même noyau $\mathbb{R}X = \ker T_p\varphi_{\mp}$, et les droites projectives tangentes $\tau_p\varphi_{\pm} \subset Q_{\pm}$ découpent par incidence dans Q la même droite projective, à savoir celle ayant pour vecteur tangent $X\varphi \in T_pQ$ en $\varphi(p)$.

Démonstration. La première partie de la proposition résulte aussitôt du lemme précédent.

La forme Π_+ est nulle en $p \in S$ si et seulement si le produit $(X\psi)_p(Y\psi_-)_p$ (dans \mathcal{O}) est nul pour tous champs de vecteurs X, Y sur S . Mais cela entraîne que les sous-espaces vectoriels $V = \mathbb{R}\psi(p) + \text{im } d\psi(p)$ et $V_- = \mathbb{R}\psi_-(p) + \text{im } d\psi_-(p)$ de \mathcal{O} s'annulent mutuellement, i.e. $VV_- = 0$. Comme l'intersection de deux annulateurs gauches (resp. droits) dans \mathcal{O} est de dimension paire et que V est de dimension 3 (car φ est une immersion), ceci force V_- à être de dimension 1, i.e. $T_p\varphi_-(p) = 0$. La réciproque est claire. Le cas de Π_- se traite semblablement (ou s'en déduit par conjugaison).

L'annulation de Π_p équivaut à $V_-V_+ = 0$ dans \mathcal{O} , où $V_- = \mathbb{R}\psi_-(p) + \text{im } d\psi_-(p)$, $V_+ = \mathbb{R}\psi_+(p) + \text{im } d\psi_+(p)$, et on a soit $\dim V_+ = 1$ ou $\dim V_- = 1$, soit V_-, V_+ sont de dimension 2, i.e. $T_p\varphi_\pm$ sont de rang 1, et $V_-V_+ = 0$.

Inversement, supposons $T_p\varphi_\pm$ de rang 1. Les formes $(\Pi_\pm)_p$ sont aussi de rang 1 d'après le lemme, et comme elles sont orthogonales pour le discriminant, elles ont même noyau $\mathbb{R}X \subset T_pS$, qui est aussi le noyau commun de $T_p\varphi_\pm$.

Soit $Y \in T_pS \setminus \mathbb{R}X$. Alors $(X\psi)(Y\psi_-) = (Y\psi)(X\psi_-) = 0$, car $X\psi_- \in \mathbb{R}\psi_-(p)$, et de même $(Y\psi_+)(X\psi) = 0$, de sorte que

$$\ker L_{Y\psi_+} \cap \ker R_{Y\psi_-} \supset \mathbb{R}\psi(p) \oplus \mathbb{R}X\psi$$

est de dimension au moins 2, impaire, donc 3, et $(Y\psi_-)(Y\psi_+) = 0$ en vertu du lemme 5. Mais ceci signifie que $\Pi(Y, Y) = 0$, et comme $X \in \ker \Pi$ d'après le lemme 15, on a bien $\Pi_p = 0$.

Quant à la dernière assertion, elle résulte de ce que le plan vectoriel $W = \mathbb{R}\psi(p) + \mathbb{R}X\psi$ coïncide pour raison de dimension avec $\ker L_{\psi_+(p)} \cap \ker L_{Y\psi_+}$ et avec $\ker R_{\psi_-(p)} \cap \ker R_{Y\psi_-}$. Géométriquement, cela signifie que la droite $P(W) \subset Q$ est l'ensemble de points de Q incidents à tous les points de $\tau_p\varphi_+ = P(V_+)$ (resp. de $\tau_p\varphi_- = P(V_-)$). Comme $P(W)$ est la droite projective de vecteur tangent $X\varphi$ en $\varphi(p)$, la proposition est démontrée. \square

Les possibilités obtenues pour le triplet $(\text{rg } \Pi_+, \text{rg } \Pi_-, \text{rg } \Pi)$ sont résumées dans le tableau

Π_+	Π_-	Π
2	2	2
2	1	1
1	2	1
1	1	0
0	*	0
*	0	0

Supposons maintenant que $\varphi = (f : 1 : g : -f \cdot g)$ pour une immersion $f : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ et sa déformation isométrique infinitésimale $g : S \rightarrow \mathbb{R}^3$. On va déterminer les trois formes bilinéaires (à un facteur près) en termes des applications f, g et h , où $dg = h \times df$. Pour cela, on peut supposer sans perte de généralité, quitte à travailler localement sur S et remplacer (f, g, h) par $(f + v, g + a \times f + b, h + a)$ pour $v, a, b \in \mathbb{R}^3$ génériques, que g est une immersion et que les plans affines tangents à f et g évitent l'origine. On peut alors définir les polaires f^*, g^* par $f^* \cdot df = 0$, $f^* \cdot f = -1$, $g^* \cdot dg = 0$, $g^* \cdot g = -1$, et on prend

$$\Pi_f = f^* \cdot D^2f, \quad \Pi_g = g^* \cdot D^2g$$

pour représentantes des secondes formes fondamentales de f et g à un facteur près. Noter que $g^* = -h/(h \cdot g)$, puisque $dg = h \times df$ entraîne $\text{im } dg = (\mathbb{R}h)^\perp$.

D'après la section 5, le triplet de Darboux $D(f, g, h) = (g, f, h^*)$ est donné par $h^* \cdot df = 0$, $h^* \cdot h = -1$. On a alors $f^* = -(h \cdot f^*)h^*$, donc $(h^* \cdot f)(h \cdot f^*) = 1$, et on pose

$$\mathbb{I}_h = h^* \cdot D^2 h.$$

Lorsque h est une immersion, ses plans affines tangents évitent l'origine, et h^* coïncide avec la polaire de h .

On se place dans le modèle des matrices de Zorn \mathcal{Z} pour les octonions déployés. En utilisant les isomorphismes trialitaires de la section 9 et les résultats des sections 6 et 7, on peut identifier ψ_+, ψ, ψ_- aux matrices de Zorn

$$\psi_+ = \begin{pmatrix} h \cdot \tilde{g} & -h \\ -\tilde{g} & 1 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 1 & f \\ g & f \cdot g \end{pmatrix}, \quad \psi_- = \begin{pmatrix} 1 & \tilde{h} \\ f^* & \tilde{h} \cdot f^* \end{pmatrix}$$

et dès lors les trois formules

$$\begin{aligned} -X\psi_+Y\psi &= \mathbb{I}_-(X, Y)\overline{\psi_-} \\ -X\psi Y\psi_- &= \mathbb{I}_+(X, Y)\overline{\psi_+} \\ -X\psi_-Y\psi_+ &= \mathbb{I}(X, Y)\overline{\psi} \end{aligned}$$

permettent de vérifier la

Proposition 17. *Dans ces conditions, les formes bilinéaires symétriques \mathbb{I}_+ , \mathbb{I}_- , \mathbb{I} sur TS sont respectivement proportionnelles à \mathbb{I}_f , \mathbb{I}_g , \mathbb{I}_h , avec des facteurs non nuls.*

Démonstration. Il suffit de calculer un coefficient du produit correspondant de matrices de Zorn dans chaque cas, ce qui donne $\mathbb{I}_+(X, Y) = -Yf \cdot Xf^* = (XYf) \cdot f^*$, donc $\mathbb{I}_+ = \mathbb{I}_f$. De même $\mathbb{I}(X, Y) = Xf^* \cdot Yh = -f^* \cdot (XYh)$, donc $\mathbb{I} = (h \cdot f^*)\mathbb{I}_h$. Enfin $\mathbb{I}_-(X, Y) = X\tilde{g} \cdot Yf = (f \times Xh) \cdot (h^* \times Yg) = (f \cdot h^*)(Xh \cdot Yg) = -(f \cdot h^*)(h \cdot XYg)$, donc $\mathbb{I}_- = (h \cdot g)(f \cdot h^*)\mathbb{I}_g$. \square

On retrouve ainsi certaines observations de Darboux [Darb, p. 71-72] qui regroupe notamment les 12 surfaces par paquets de 4 partageant les mêmes "lignes asymptotiques", autrement dit à secondes formes fondamentales proportionnelles. Dans les notations présentes, ce sont $\{f, f^*, \tilde{f}, \tilde{f}^*\}$, $\{g, g^*, \tilde{g}, \tilde{g}^*\}$ et $\{h, h^*, \tilde{h}, \tilde{h}^*\}$. Du point de l'action du groupe diédral D_{12} engendré par les involutions A et D sur les triplets de Darboux (voir sections 5 et 9), les douze surfaces sont les premières composantes des triplets dans l'orbite de (f, g, h) , et les sous-ensembles ci-dessus sont les premières composantes des triplets dans les trois orbites du sous-groupe engendré par les involutions ADA , correspondant à $(\)^*$, et DAD , correspondant à $(\)$. Noter que ces involutions commutent, leur produit $(DA)^3$ étant une involution.

12 La variété d'incidence et sa distribution de dimension 6

Grâce à la trialité différentielle des sections précédentes, on va reformuler les déformations isométriques infinitésimales de surfaces comme surfaces intégrales d'un champ de plans

tangents (une "distribution") de dimension 6 sur une variété de dimension 11.

Soit $Q_0 = Q$, $Q_1 = Q_-$, $Q_2 = Q_+$ (sic), les trois quadriques en trialité. Chaque Q_i est une copie de la quadrique des droites isotropes de $P(\mathcal{O})$, où \mathcal{O} est une algèbre d'octonions déployée sur \mathbb{R} . On définit alors la variété d'incidence

$$\mathcal{I} = \{([x_i])_{i \in \mathbb{Z}/3} \mid x_i x_{i+1} = 0, i \in \mathbb{Z}/3\} \subset Q_0 \times Q_1 \times Q_2.$$

Géométriquement, \mathcal{I} s'identifie à la variété des drapeaux formés d'un point de Q et d'un plan projectif contenu dans Q et contenant ce point. C'est une variété de dimension 11, fibrée sur chaque Q_i avec fibres isomorphes à la variété $P(T^*\mathbb{R}P^3)$ des drapeaux (point, plan) de $\mathbb{R}P^3$.

On note $q_i : \mathcal{I} \rightarrow Q_i$, $i \in \mathbb{Z}/3$ ces fibrations. Alors $q_{i+1} \times q_{i-1} : \mathcal{I} \rightarrow Q_{i+1} \times Q_{i-1}$ a pour image la sous-variété d'incidence $J_i \subset Q_{i+1} \times Q_{i-1}$, fibrée en $\mathbb{R}P^3$ sur $Q_{i \pm 1}$, et $q_{i+1} \times q_{i-1} : \mathcal{I} \rightarrow J_i$ est une fibration de fibre $\mathbb{R}P^2$. On considère le fibré tangent vertical $\xi_i \subset T\mathcal{I}$ de cette fibration, i.e.

$$\xi_i = \ker Tq_{i+1} \cap \ker Tq_{i-1}.$$

Lemme 18. *Les ξ_i sont en somme directe dans $T\mathcal{I}$.*

Démonstration. Il est clair que les ξ_i , $i \in \mathbb{Z}/3$ sont deux à deux en somme directe, car pour tout i , $\xi_i \cap \xi_{i+1} = \bigcap_j \ker Tq_j = 0$. De même, $\xi_i \oplus \xi_{i+1}$ est contenu dans $\ker Tq_{i-1}$, et comme $\xi_{i-1} \cap \ker Tq_{i-1} = 0$, on a bien la conclusion du lemme. \square

Ceci mène à considérer le sous-fibré tangent, ou "distribution", de rang 6

$$\xi = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}/3} \xi_i \subset T\mathcal{I}.$$

Proposition 19. *Les immersions totalement isotropes $\varphi : S \rightarrow Q$ sont en bijection avec les surfaces intégrales $\Phi : S \rightarrow \mathcal{I}$ de $\xi \subset T\mathcal{I}$ (immersions avec $\text{im } T\Phi \subset \xi$) telles que $\varphi = q_0 \circ \Phi$ soit une immersion, via $\varphi \mapsto \Phi = (\varphi, \varphi_-, \varphi_+)$.*

Démonstration. Ce n'est qu'une reformulation de la trialité différentielle (proposition 6). \square

Proposition 20. *La distribution ξ est complètement non intégrable. Plus précisément, $\xi' = [\xi, \xi]$ est de rang 9, et $[\xi, \xi'] = T\mathcal{I}$ (donc de rang 11).*

Démonstration. La restriction de ξ aux fibres de q_i , i.e. $\xi \cap \ker Tq_i$, n'est autre que la structure de contact canonique de la fibre $q^{-1}([x_i]) \simeq P(T^*\mathbb{R}P^3)$. En particulier, $[\xi, \xi] = \xi'$ contient la somme des $\ker Tq_i$, qui est de rang 9, comme on le vérifie aisément, de même que $[\xi, \xi] = \xi'$.

References

[vdBS] F. van der Blij, T. A. Springer, *Octaves and triality*, Nieuw Arch. Wiskd., III. Ser., vol 8, (1960), p. 158-169.

- [Cart] E. Cartan, *Le principe de dualité et la théorie des groupes simples et semi-simples*, Math. Zeitschr., 16, 1923, p. 78-91, et aussi Oeuvres I, p. 555.
- [Darb] G. Darboux, *Leçons sur la théorie générale des surfaces et les applications géométriques du calcul infinitésimal*, Vol. 4, Gauthier-Villars, Paris, 1896.
- [EMS] I. Kh. Sabitov, *Local theory of bendings of surfaces* chap. 3 de Geometry III, Encyclopaedia of Mathematical Sciences, Springer Verlag 1992.
- [Gho] M. Ghomi, "Open problems in geometry of curves and surfaces", 2016.
- [Izm] I. Izmistiev, *Projective background of the infinitesimal rigidity of frameworks*. Geom. Dedicata 140 (2009), 183-203.
- [Kui] N. Kuiper, *Exemples de sphères polyédriques flexibles dans E^3 , d'après Robert Connelly*, Séminaire Bourbaki, Vol. 1977/78, Exposé No.514, Lect. Notes Math. 710, 147-168 (1979).
- [Sau] R. Sauer, *Infinitesimale Verbiegungen zueinander projektiver Flächen*. Math. Ann. 111 (1935), no. 1, 71-82.
- [Spi] M. Spivak, *A comprehensive introduction to differential geometry, vol.5, chap.12, Addendum*. 3ème édition, Publish or Perish 1999.
- [Stu] E. Study, *Grundlagen und Ziele der analytischen Kinematik*. Sitzungsber. Berl. Math. Ges., 12:36-60, 1913.
- [Trot] D. A. Trotsenko, *Nonrigid analytic surfaces of revolution*, Siberian Math. Journal 21-5 (1980), 718-724.
- [Yau] S.-T. Yau, *Open problems in geometry*. J. Ramanujan Math. Soc. 15 (2000), no. 2, 125-134.
- [Zor] M. Zorn, *Theorie der alternativen Ringe*, Abh. Math. Seit. Hamb. Univ., 8:123-147, 1930.