



## Open Archive TOULOUSE Archive Ouverte (OATAO)

OATAO is an open access repository that collects the work of Toulouse researchers and makes it freely available over the web where possible.

This is an author-deposited version published in : <http://oatao.univ-toulouse.fr/>  
Eprints ID : 18332

**To cite this version** : Mombo, Stéphane and Lepengue, Alexis  
Nicaise and M'Batchi, Bertrand and Souza, Alain and Muluway  
Kalenda, André and Ontod, Tshi-tshi D.S. and Dumat, Camille *Etude  
de l'impact du manganèse sur l'absorption minérale du manioc  
(Manihot esculenta Crantz) dans les sols manganifères au Gabon et  
de ses potentielles conséquences environnementales et sanitaires.*  
(2017) In: Sustainable Urban Agricultures (UA) : Vector for  
Ecological Transition, 6 June 2017 - 9 June 2017 (Toulouse, France).  
(Unpublished)

Any correspondence concerning this service should be sent to the repository administrator: [staff-oatao@listes-diff.inp-toulouse.fr](mailto:staff-oatao@listes-diff.inp-toulouse.fr)

EXHIBITION OF  
THE INTERNATIONAL RESEARCH SYMPOSIUM,  
Toulouse 6-9 June 2017  
**Sustainable Urban Agricultures (UA) :**  
Vector for Ecological Transition!

# S3



**Etude de l'impact du manganèse sur l'absorption minérale du manioc (*Manihot esculenta Crantz*) dans les sols manganifères au Gabon et de ses potentielles conséquences environnementales et sanitaires.**

Mombo<sup>1</sup>S, Lepengue<sup>1</sup>N, M'batchi<sup>1</sup>B, Souza<sup>1</sup>A, Muluway Kalenda<sup>1</sup>A, Ontod<sup>1</sup>T, Dumat<sup>2,3</sup>C.

<sup>1</sup>Laboratoire de Physiologie Végétale et Amélioration des plantes, Unité de recherche Agrobiologie, Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) ; BP 067 Franceville.

<sup>2</sup>CERTOP, Axe Transition Ecologique, UMR5044, Université J. Jaurès - Toulouse II, 5 allée Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9, France.

<sup>3</sup>Université de Toulouse, INP-ENSAT, Av. de l'Agrobiopôle, 31326 Castanet-Tolosan, France



## Introduction

Moanda, ville au Sud-Est du Gabon présente l'un des plus grands gisements mondiaux de manganèse (Mn) à ciel ouvert, avec des réserves  $\approx$  670 millions de tonne (Fig. 1). Dans cette localité, les [Mn] à 15 km de la mine sont de 9400 mg.kg<sup>-1</sup> (Eba et al., 2007). Ces fortes concentrations peuvent avoir des effets négatifs sur l'absorption des éléments nutritifs pour des cultures vivrières comme le manioc (*Manihot esculenta Crantz*) largement cultivé et consommé à Moanda (Mombo et al., 2016). Le manioc présente dans cette région de très fortes [Mn] dans ses différents organes (feuilles, tiges et tubercules), susceptibles d'engendrer des troubles cryptogamiques (Eba et al., 2007), mais également des problèmes sanitaires dus à la consommation courante de cet aliment.

L'objectif de cette étude est de comprendre l'impact des fortes [Mn] dans le sol sur l'absorption d'éléments nutritifs et minéraux essentiels pour la croissance des plantes.



Fig.2: Champs de manioc dans la zone de Leyima



Fig.1: Mine de Mn à ciel ouvert Moanda

## Matériels et méthodes


Moanda (région potentiellement contaminée en Mn), 4 sites étudiés (l'Alliance, Leyima, la Gare et l'Oasis) (Fig. 2) et sur un site témoin à Franceville (non contaminée) à 76 km de Moanda. Pour chaque site, 20 pieds de manioc ont été échantillonnés.

Feuilles de manioc, séchées au four 3 jours à 105°C, broyées et minéralisées avec 20 mL d'acide sulfurique et 5 mL H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Puis, Mn, K<sup>+</sup> et Ca<sup>2+</sup> dosés par ICP-AES.

## Résultats

C organique (g.kg <sup>-1</sup> )	N total (g.kg <sup>-1</sup> )	CEC (mEq/100g)	Argile (%)	Sable (%)	Limon (%)	C/N	pH	Ca (mg.kg <sup>-1</sup> )	K (mg.kg <sup>-1</sup> )	Mn éch. (mg.kg <sup>-1</sup> )	Mn <sub>total</sub> (mg.kg <sup>-1</sup> )
23,8±1	2,70±0,30	13,4 ± 3	36,42±6,1	40,5	22,37	10,7/9,50	4,87 ± 0,28	0,32 ± 0,06	0,01±0,001	3406±494	9400

Tableau 1: Caractéristiques physico-chimique du sol et concentration en Mn à 15 km de la mine à ciel ouvert de Moanda



## Discussion

- Fortes [Mn] à Leyima: site proche de la mine à ciel ouvert.
- [K] élevées par rapport aux témoins: favorisées par les fortes [Mn] dans le sol ou les particules en suspensions dans l'air ?
- Faibles [Ca]: inhibition de l'absorption par les fortes [Mn]. La présence du Mn dans le sol peut inhiber ou favoriser la translocation des autres éléments (Lepengue et al., 2012).

## Conclusion

Toutes les plantes de manioc échantillonnées sur les 4 sites présentent des [Mn] élevées dans leurs feuilles.

Les fortes [Mn] dans le sol et certainement aussi en suspension dans l'air, ont des effets positifs et négatifs respectivement sur les concentrations en K<sup>+</sup> et en Ca<sup>2+</sup> dans les feuilles de manioc. Ces fortes [Mn] dans les feuilles de manioc peuvent avoir des effets sur les populations qui les consomment!

## Bibliographie

Eba, F., J.A. Onto, S.E. Mba, M.O. Boulo, and J. Omva-zué. 2007. Taux de manganèse accumulé dans quelques plantes vivrières cultivées dans la région de Moanda au Gabon. *Agroforestry Systems* 23: 63-73.

Lepengue AN, Souza A, Mouangadjia L, Kondi D, Akai S, M'Batchi N. (2012): Effet du NaCl sur le développement des cultivars de la roselle (*Hibiscus sabdariffa* L. var. *sabdariffa*, Malvaceae) en zone côteière du Gabon. *Agronomie Africaine* 24 (1): 1-10.

Mombo, S., Dumat, C., Shahid, M., Schreck, E., 2016. A socio-scientific analysis of the environmental and health benefits as well as potential risks of cassava production and consumption. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 1-15. doi:10.1007/s11356-016-8190-z