



Sap-In: Comprendre les mécanismes de formation des poches d'eau du bois et des dépérissements du sapin pectiné (*Abies alba*)

Ludovic Martin

► To cite this version:

Ludovic Martin. Sap-In: Comprendre les mécanismes de formation des poches d'eau du bois et des dépérissements du sapin pectiné (*Abies alba*). Colloque Sapin pectiné, où en est-on ?, FiBois Aura., Oct 2019, Clermont-Ferrand, France. 14 p. <hal-02336485>

HAL Id: hal-02336485

<https://hal.science/hal-02336485v1>

Submitted on 5 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization




Sap-In: Comprendre les mécanismes de formation des poches d'eau du bois et des dépérissements du sapin pectiné (*Abies alba*)





Le sapin pectiné en Auvergne-Rhône-Alpes



- L'un des 2 plus importants résineux en région AURA (74 000 hectares, soit 1/3 du volume sur pied et 86 millions de m³)

- Identification de 2 enjeux économiques majeurs :
 - 1^{ère} transformation : poches d'eau dans les grumes → problèmes de séchage = surcoût
 - dépérissements dus aux fortes chaleurs et aux sécheresses répétées → mise en péril de la ressource



Le projet Sap-In



- **Deux questions scientifiques :**

1. Quels sont les origines et les mécanismes de formation des poches d'eau ?
2. Quels sont les mécanismes physiologiques des dépérissements ?

- **Objectifs opérationnels :**

- 1a. Proposer des méthodes de détection des poches d'eau
- 1b. Comprendre leur(s) mécanisme(s) de formation
- 1c. Identifier de potentielles conditions stationnelles à risque
- 2a. Caractériser la vulnérabilité des sapinières de la région
- 2b. Identifier les provenances les mieux adaptées aux conditions climatiques futures



Les poches d'eau chez le sapin



Les poches d'eau sont des zones de bois plus humides situées dans le duramen



- La présence de poches d'eau est observée chez toutes les espèces de sapins

- Taux d'humidité (*Abies balsamea*) : duramen humide \approx aubier > duramen (Lihra et al., 2000)

- Perméabilité du bois (*Abies balsamea*, *Abies lasioscarpa*) : aubier > duramen humide \geq duramen (Schneider and Zhou, 1989 ; Cai and Oliveira, 2007)


Quel est l'importance du phénomène chez le sapin pectiné ?



Détection et étude des poches d'eau en forêt






Tomographie de résistivité électrique (ERT)





Détection et étude des poches d'eau en forêt

- 128 sapins : âge moyen 80 ans, diamètre moyen 52 cm
- 10 forêts auvergnates : conditions pédo-climatiques variées






Au sein d'un même peuplement, pour des diamètres proches, les sapins présentent des humidités internes très variables



Détermination de l'humidité réelle et de la densité du bois




- Découpage carottes en morceaux d'1cm, mesures poids frais-poids secs






Quelle est la proportion de sapins présentant un duramen humide ?



- L'ERT permet d'estimer le taux d'humidité du duramen

- D'une forêt à l'autre la résistivité moyenne mesurée varie :

- épaisseur de l'aubier,
- contenu en électrolytes de la sève,
- densité du bois






- Seuls 10% des arbres étudiés présentent un duramen complètement sec

- Différences entre les peuplements concernant le niveau d'humidité du duramen et le nombre d'arbres concernés



Localisation des poches d'eau dans les grumes





La présence de poches d'eau est hétérogène le long des troncs :

- taux d'humidité et surface touchée variables,
- plus importante à la base.



Comment se forment les poches d'eau ? Observations en tomographie à rayons X



Les poches d'eau sont des zones duraminisées qui se sont resaturées en eau → présence systématique d'une zone complètement embolisée plus sèche entre l'aubier et la poche d'eau sur tous les profils



D'où provient l'eau contenue dans les poches d'eau ?



**Zones humides
visibles quelques
jours après
abatage d'un sapin**



**Diffusion de l'eau
autour des
branches mortes
jusqu'au cœur de
l'arbre**



**Aucune zone
humide n'est visible
autour des
branches vertes**



**L'eau semble pénétrer dans le tronc par diffusion au niveau des branches mortes
Couplage avec un autre phénomène pour les parties basales ?**



En résumé



- La présence de zones humides plus ou moins nombreuses et importantes dans le duramen semble être un phénomène très fréquent chez le sapin pectiné ($\approx 90\%$ des sapins étudiés)
- La formation de poches d'eau ne dépend pas de la densité du bois, ni de la vitesse de croissance
- Isolée de l'aubier, l'eau contenue dans ces poches d'eau ne peut pas être utilisée par les arbres en cas de sécheresse
- Pouvant être présentes sur l'ensemble du tronc, les poches d'eau semblent se former par l'intermédiaire d'une entrée d'eau au niveau des branches mortes dans les trachéides embolisées du duramen



Travaux en cours et futurs



Fin de l'étude du mécanisme de formation des poches d'eau

- Mise en évidence de l'entrée d'eau au niveau des branches mortes : perfusion sur des troncs en forêt avec colorant (floxine)

Tests de séchage et de retrait du bois

- Comparaison vitesse de séchage aubier/poches d'eau en conditions contrôlées en température et humidité

Lancement de la deuxième partie du projet sur l'études des dépérissements

- Début des expérimentations en janvier

