



HAL
open science

Aménorrhée post-partum / Post-partum amenorrhea

Elise de La Rochebrochard

► **To cite this version:**

Elise de La Rochebrochard. Aménorrhée post-partum / Post-partum amenorrhea. Dictionnaire de Démographie et des Sciences de la Population, 2011, pp.18. hal-02420670

HAL Id: hal-02420670

<https://hal.science/hal-02420670>

Submitted on 20 Dec 2019


HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Sous la direction de
France Meslé, Laurent Toulemon, Jacques Véron

**DICTIONNAIRE
DE DÉMOGRAPHIE
ET DES SCIENCES DE LA POPULATION**



La Rochebrochard Elise (de), **2011**, « Aménorrhée post-partum / Post-partum amenorrhea ». In : France Meslé, Laurent Toulemon, Jacques Véron (sous la direction de), **Dictionnaire de Démographie et des sciences de la population**, Editions Armand Colin – Ined, ISBN : 978-2200347444, p. 18.

Aménorrhée post-partum

Post-partum amenorrhea

Absence de menstruations dans la période suivant l'accouchement* (c'est-à-dire absence de l'écoulement sanguin mensuel chez la femme marquant l'activité de l'appareil reproducteur féminin). Cette période s'achève avec les premières menstruations après la grossesse*, le « retour de couches » qui marque la fin du temps mort* lié à la grossesse. L'aménorrhée post-partum est vue comme le signe d'une absence de fertilité* bien qu'en réalité la première ovulation puisse survenir avant le retour de couches. La durée de cette période varie fortement selon les modalités d'allaitement* du nourrisson, l'allaitement maternel retardant le retour de couches, surtout s'il est exclusif. Néanmoins, si l'allaitement est poursuivi pendant plus de trois mois, le retour de couches survient généralement avant que la mère ait sevré son bébé. En l'absence d'allaitement maternel, la durée d'aménorrhée est de l'ordre de deux mois.

N.B. L'astérisque renvoie à la définition d'un mot ou d'une expression figurant dans le dictionnaire. S'il s'agit d'une expression, il est placé après le dernier mot de celle-ci.