



**HAL**  
open science

# L'entropie, de Clausius aux inégalités fonctionnelles

Ivan Gentil

► **To cite this version:**

| Ivan Gentil. L'entropie, de Clausius aux inégalités fonctionnelles. 2020. hal-02464182v2

**HAL Id: hal-02464182**

**<https://hal.science/hal-02464182v2>**

Preprint submitted on 9 Nov 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# L'entropie, de Clausius aux inégalités fonctionnelles

Ivan Gentil

9 novembre 2020

Nous nous intéressons dans ce document à l'entropie\*. L'entropie est multiple, l'idée est de la décrire dans le prolongement de sa définition proposée par le physicien Clausius. En effet, Clausius expose en 1865 le second principe de la thermodynamique et propose aussi le concept d'entropie. Au lieu de définir simplement une fonctionnelle, point central pour l'élaboration du second principe, il va en fait définir un concept suffisamment général pour qu'il soit utilisé dans de nombreux domaines des mathématiques.

Dans ces quelques pages, je souhaite faire apparaître le rôle joué par l'entropie dans le domaine de l'étude des flots de gradient et des inégalités fonctionnelles. Partant de la définition de Clausius en 1865, je vais tenter d'expliquer comment des inégalités fonctionnelles fondamentales comme l'inégalité de Sobolev, point clé en analyse, sont des inégalités de structures naturelles reliées à une certaine entropie. Ce cheminement me permet de donner un aperçu de l'utilisation des flots de gradient en dimension finie ou infinie, de la théorie de Bakry-Émery et plus récemment du calcul d'Otto.

## 1 L'entropie proposée par Clausius

On retrouve 6 millions de fois le terme Entropy sur le moteur de recherche Ecosia et près de 40 millions sur Google. Il apparaît 41000 fois dans Zentrablatt, ce qui représente un peu plus de 1% des entrées. Ce terme est tellement utilisé que l'on ne peut pas être exhaustif dans une courte introduction, il en existe d'ailleurs bien d'autres.

Une fois n'est pas coutume, on sait quand ce mot a été inventé, c'est en 1865 dans un article de Rudolf Julius Emmanuel Clausius, physicien allemand du milieu du XIXe siècle, cf. [Cla65].

Avant de parler du contenu scientifique de l'article, arrêtons-nous sur sa forme. Cet article est publié dans la revue de mathématiques *Journal de mathématiques pures et appliquées* en 1865. Rappelons que c'est un des plus vieux journaux de mathématiques existants, fondé par Joseph Liouville en 1836, juste après le journal de Crelle (*Journal für die reine und angewandte Mathematik*) qui a été fondé, lui, en 1826. On peut se demander pourquoi Clausius choisit un journal de mathématiques et pourquoi celui-ci en langue française. Le journal de Crelle existe et est allemand ! Est-ce le prestige de ce nouveau journal français ? C'est d'autant plus étonnant car Clausius a publié la très grande majorité de ses articles en allemand, dans *Annalen der Physik*, dont la publication commence dès 1790 et aussi dans le journal de Crelle. Ce qui est certain c'est qu'à cette époque, le choix du journal est fondamental pour une diffusion rapide des idées contrairement à maintenant, où le choix d'une

---

\*. Ce document a été préparé à l'occasion d'un colloquium donné le 12 avril 2019 à l'Université Paris Descartes que je remercie pour l'invitation.

revue est plus lié à son prestige et à la carrière du chercheur. Clausius n'écrivait probablement pas assez bien le français puisque son article a été traduit par un traducteur qui semble professionnel et non mathématicien.

Cet article est clairement important car Clausius y formule le second principe de la thermodynamique en définissant l'entropie. On peut en dégager deux points importants.

1. Il participe à l'élaboration du second principe de la thermodynamique : l'irréversibilité des phénomènes physiques lors d'échanges thermiques. Il s'appuie sur des travaux précédents du physicien Sadi Carnot, mort à 36 ans en 1832. Notons que Carnot n'a publié qu'un seul ouvrage en 1824 intitulé *Réflexions sur la puissance motrice du feu*, livre fondateur de la thermodynamique, même si ce mot n'a été inventé que plus tard. Carnot souhaite, dans son livre, améliorer ce qu'il appelle la machine à feu, dont l'exemple fondamental est la machine à vapeur développée à la fin du XVIII<sup>e</sup>.
2. Pour démontrer ce second principe Clausius introduit le concept d'entropie : exhiber une fonctionnelle qui montrera l'irréversibilité d'un phénomène physique. Il comprend qu'il y a deux notions importantes, l'énergie et ce nouveau concept. Il a donc cherché un mot proche du mot *énergie*. Son idée est d'utiliser la racine du mot grecque  $\eta\tau\rho\pi\eta$  qui signifie transformation, ou plutôt *en transformation*. L'utilisation de cette racine grecque lui donne une consonance universelle et le mot « entropie » s'écrit presque de la même façon dans toute les langues utilisant l'alphabet latin. Il pense, et l'histoire lui a donné raison, que ce mot représente un concept général.

Ce mot va effectivement rester et être largement utilisé dans de nombreux domaines. Clausius note l'entropie  $S$  et l'assimile à *du désordre qui ne peut que croître*. Citons l'exemple récent et emblématique de Perelman qui définit aussi sa propre entropie, fonctionnelle centrale dans sa preuve de la conjecture de Poincaré. Dans sa célèbre prépublication [Per02] de 2002, Perelman note aussi l'entropie  $S$ , comme Clausius.

Clausius termine son papier par des considérations générales, bien connues maintenant, qui sont les deux principes de la thermodynamique. Nous les reproduisons tels qu'ils sont écrits dans son article page 400 :

- *L'énergie de l'univers est constante*
- *L'entropie de l'univers tend vers un maximum*

A l'école, j'ai plutôt appris que *l'entropie d'un système isolé est croissante*.

Illustrons simplement le concept proposé par Clausius avec l'équation de la chaleur dans  $\mathbf{R}^n$ . Partant d'une mesure de probabilités  $\mu_0$  dans  $\mathbf{R}^n$ , c'est-à-dire une mesure positive de masse 1, l'équation de la chaleur est l'équation aux dérivées partielles suivante,

$$\partial_t \mu_t = \Delta \mu_t, t > 0.$$

Dans le cadre de cet article, on peut allègrement remplacer les mesures de probabilité par des fonctions positives ayant une intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue égale à 1. Rappelons que partant d'une mesure de probabilités  $\mu_0$  sur  $\mathbf{R}^n$ , l'équation de la chaleur admet une unique solution régulière sur  $\mathbf{R}_+^* \times \mathbf{R}^n$ , qui est un flot dans l'ensemble des mesures de probabilité dans  $\mathbf{R}^n$ , noté  $\mathcal{P}(\mathbf{R}^n)$ ,

$$[0, \infty) \ni t \mapsto \mu_t \in \mathcal{P}(\mathbf{R}^n).$$

Dès 1872, soit seulement quelques années après l'article de Clausius, Boltzmann a compris les deux points fondamentaux de Clausius : *l'irréversibilité du phénomène physique* et le *concept de l'entropie*. Ainsi il définit sa propre entropie, appelée maintenant entropie de Boltzmann. Pour toute mesure de probabilité  $\mu \in \mathcal{P}(\mathbf{R}^n)$  admettant une densité (que l'on note abusivement aussi  $\mu$ ) par rapport à la mesure de Lebesgue  $\lambda$ ,

$$\text{Ent}(\mu) = \int \mu \log \mu = \int \log \frac{d\mu}{d\lambda} d\mu \in [0, \infty]. \quad (1)$$

Cette entropie est proposée par Boltzmann en 1872 dans son célèbre théorème  $H$ , (nous proposons ici seulement une version simplifiée). L'entropie de Boltzmann diffère de l'entropie thermodynamique de Clausius mais c'est la même que celle utilisée par Shannon au XX<sup>e</sup> siècle, avec un signe opposé. Citons aussi le cas de Nash qui utilise aussi l'entropie de Boltzmann en 1958 pour démontrer, dans un article fondateur et de façon surprenante, la régularité d'équations elliptiques et paraboliques.

Ainsi, pour simplifier, partant d'une donnée initiale  $\mu_0$  à densité régulière (par exemple dans l'espace de Schwartz), si on dérive l'entropie de Boltzmann le long du flot de la chaleur, on obtient pour  $t \geq 0$ ,

$$\frac{d}{dt} \text{Ent}(\mu_t) = \int (1 + \log \mu_t) \partial_t \mu_t = \int \Delta \mu_t \log \mu_t = - \int \nabla \mu_t \cdot \nabla \log \mu_t = - \int \frac{|\nabla \mu_t|^2}{\mu_t}, \quad (2)$$

où le point clé est l'utilisation d'une intégration par parties dans la troisième égalité. L'entropie du système est toujours décroissante. On ne peut pas revenir en arrière dans une évolution naturelle. Si la condition initiale est par exemple une masse de Dirac en 0 ( $\mu_0 = \delta_0$  et dans ce cas le calcul donné en (2) n'est valable que pour  $t > 0$ ), la chaleur va se diffuser dans l'espace tout entier. Il est impossible de revenir à une masse de Dirac, autrement dit la diffusion de la chaleur a un sens, celui donné par *la flèche du temps*. Nous concluons que **l'évolution de cette transformation physique est irréversible**. Il est important de remarquer que pour démontrer l'irréversibilité de l'équation de la chaleur, la fonctionnelle d'entropie est seulement un outil. L'entropie de Boltzmann est une fonctionnelle remarquable, comme nous le verrons en section 3, mais il y en a d'autres qui montrent d'irréversibilité de l'équation de la chaleur, comme par exemple la norme  $L^p$  ( $p > 1$ ) de la densité,  $\mu \mapsto \int \mu^p$ .

Bien entendu, toutes les transformations physiques ne sont pas forcément irréversibles. Par exemple, la chute libre d'un corps satisfait à l'équation de Newton qui est, elle, une équation réversible. Si on renvoie le corps avec une vitesse inversée, il retournera à sa place initiale!

En conclusion, le concept d'entropie est un outil qui s'adapte à ce que l'on veut étudier. Nous allons illustrer, dans les sections suivantes, son utilisation remarquable dans l'étude des flots de gradient, en dimension finie qui est un cadre simple pour énoncer les propriétés et en dimension infinie, où l'on retrouve des résultats importants d'analyse fonctionnelle.

## 2 Flots de gradient en dimension finie et entropie

Nous explorerons maintenant le cas simple d'un flot de gradient, permettant d'illustrer la théorie de Bakry-Émery proposée en 1985 dans [BE85].

Considérons une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$ ,

$$E : \mathbf{R}^n \mapsto \mathbf{R},$$

vérifiant pour un certain  $\rho > 0$ , la condition

$$\text{Hess } E \geq \rho \text{Id}, \quad (3)$$

où l'inégalité est vue dans le sens des matrices symétriques. Cette fonction est alors coercive, elle vérifie  $\lim_{|x| \rightarrow \infty} E(x) = \infty$ , et admet donc un minimum global atteint en un unique point  $\beta \in \mathbf{R}^n$ . On garde en mémoire l'exemple typique,  $E(x) = |x|^2/2$  où  $\rho = 1$  et  $\beta = 0$ .

• **Flot de gradient**

On note  $(S_t(x))_{t \geq 0}$ ,  $x \in \mathbf{R}^n$ , la solution de l'équation différentielle ordinaire

$$\begin{cases} \dot{X}_t = -\nabla E(X_t); \\ X_0 = x. \end{cases}$$

On utilise la notation provenant de la mécanique  $\dot{X}_t = \frac{d}{dt}X_t$ , désignant le vecteur vitesse de la trajectoire  $(X_t)_{t \geq 0}$ .

On dit que  $(S_t)_{t \geq 0}$  est le *flot de gradient de E par rapport à la métrique euclidienne, celle qui définit le gradient usuel*. Dans l'exemple classique,  $E(x) = |x|^2/2$ , la solution partant de  $x$  est simplement  $S_t(x) = e^{-t}x$ , solution d'une équation différentielle ordinaire, linéaire et de degré 1.

• **Identité de de Bruijn**

Nous appelons  $E$  la fonctionnelle d'entropie du système, on a

$$\frac{d}{dt}E(S_t(x)) = \nabla E(S_t(x)) \cdot \frac{d}{dt}S_t(x) = -|\nabla E(S_t(x))|^2 \leq 0. \quad (4)$$

L'opposé du terme de droite est appelé *la production d'entropie* (appelé parfois énergie, peut-être à tort) et cette identité porte parfois le nom de de Bruijn.

Pour les mêmes raisons que précédemment, ce phénomène physique est irréversible. Si on imagine  $S_t(x)$  comme étant la position d'une bille à l'instant  $t$ , celle-ci va descendre vers  $\beta$ , le point où  $E$  réalise son unique minimum global. C'est exactement la même chose que la chaleur, la bille ne remontera pas la pente.

• **Méthode de Bakry-Émery**

Clausius invente le concept d'entropie, Boltzmann propose de dériver l'entropie le long du flot. L'idée fondamentale de Bakry et Émery est de dériver une seconde fois l'entropie le long du flot,

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}E(S_t(x)) &= -\frac{d}{dt}|\nabla E(S_t(x))|^2 = -2\nabla E(S_t(x)) \cdot \frac{d}{dt}\nabla E(S_t(x)) = \\ &= 2\nabla E(S_t(x)) \cdot \text{Hess } E(S_t(x))\nabla E(S_t(x)). \end{aligned}$$

En utilisant l'inégalité  $\text{Hess } E \geq \rho \text{Id}$ , on obtient

$$\frac{d}{dt}|\nabla E(S_t(x))|^2 \leq -2\rho|\nabla E(S_t(x))|^2,$$

soit donc après intégration sur l'intervalle  $[0, t]$ ,

$$|\nabla E(S_t(x))|^2 \leq e^{-2\rho t}|\nabla E(x)|^2. \quad (5)$$

Sous la condition de convexité (3), la production d'entropie décroît vers 0 avec une vitesse exponentielle et explicite.

- **Inégalité entropie-production d'entropie**

On peut montrer que  $\lim_{t \rightarrow \infty} S_t(x) = \beta$ . En effet,  $\nabla E(S_t(x))$  tend vers 0 grâce à l'inégalité (5) et  $\beta$  est le seul point qui annule le gradient de  $E$ .

Ainsi on a

$$E(x) - E(\beta) = E(S_0(x)) - E(\lim_{t \rightarrow \infty} S_t(x)) = - \int_0^\infty \frac{d}{dt} E(S_t(x)) dt = \int_0^\infty |\nabla E(S_t(x))|^2 dt \leq \int_0^\infty e^{-2\rho t} |\nabla E(x)|^2 dt = \frac{1}{2\rho} |\nabla E(x)|^2.$$

On a ainsi démontré l'inégalité suivante

$$E(x) - E(\beta) \leq \frac{1}{2\rho} |\nabla E(x)|^2 = - \frac{1}{2\rho} \frac{d}{dt} E(S_t(x)) \Big|_{t=0}, \quad (6)$$

qui est une inégalité entre l'entropie et la production d'entropie. Elle peut apparaître comme une simple inégalité de convexité mais elle a des conséquences intéressantes.

On remarque que cette inégalité est optimale au sens où pour l'exemple classique,  $E(x) = |x|^2/2$  on a une égalité. Par ailleurs, le flot de gradient  $(S_t(x))_{t \geq 0}$  est une interpolation remarquable entre  $x$  et  $\beta$  (lorsque  $t = 0$  et  $t = \infty$ ), permettant de démontrer une inégalité de type (6).

- **Convergence à l'équilibre du flot de gradient**

De cette inégalité (6) on exhibe un taux explicite de la convergence à l'équilibre du flot de gradient. Nous savions déjà que le flot  $(S_t(x))_{t \geq 0}$  convergeait vers  $\beta$  mais on peut maintenant préciser la vitesse et l'espace naturel. En effet, il est facile de démontrer que l'inégalité entropie-production d'entropie (6) (pour un certain  $\beta$ ) est équivalente à la convergence exponentielle en entropie du flot de gradient. Plus précisément pour tout  $x \in \mathbf{R}^n$  et  $t \geq 0$ ,

$$0 \leq E(S_t(x)) - E(\beta) \leq e^{-2\rho t} (E(x) - E(\beta)).$$

Notons que l'équivalence n'est plus vérifiée si la convergence est de la forme  $Ce^{-2\rho t}$  avec  $C > 1$  au lieu de simplement  $e^{-2\rho t}$ , dans ce cas on parle d'hypocoercivité et ces techniques doivent alors être modifiées.

Cette simple méthode a été utilisée un très grand nombre de fois depuis 1985 l'année de parution du papier de Bakry-Émery au *Séminaire de probabilités*, [BE85]. Nous l'illustrerons avec deux exemples remarquables dans la section suivante.

### 3 Que se passe-t-il en dimension infinie ?

Une généralisation intéressante aux flots de gradient en dimension infinie a été proposée par Félix Otto en particulier dans [Ott01] et plus tôt dans l'algorithme JKO proposé par Jordan, Kinderlehrer et Otto, cf. [JKO98]. C'est Villani qui lui a donné son nom, *le calcul d'Otto*, dans son ouvrage de référence [Vil09, Chapitre 15].

Ces travaux apportent une nouvelle utilisation de la distance de Wasserstein. Depuis les travaux de Kantorovich en 1942, cette distance sur l'espace des mesures de probabilités était largement utilisée en théorie des probabilités et en statistique pour estimer des convergences ou des déviations mais peu en EDP. L'idée d'Otto est simple : montrer qu'un flot de mesures comme par exemple l'équation de la chaleur est simplement le flot de gradient d'une fonctionnelle sur l'espace des mesures, considéré avec une métrique adaptée. Considérer l'équation de la chaleur comme un flot de gradient n'est pas une idée nouvelle mais Otto propose une nouvelle métrique, plus naturelle que nous détaillons ici.

Nous nous permettons ici, de ne pas être rigoureux. De nombreux problèmes techniques ont été réglés en partie dans les travaux de Ambrosio, Gigli et Savaré, on pourra par exemple consulter l'ouvrage de référence [AGS08]. Soit  $M = \mathcal{P}_2(\mathbf{R}^n)$ , l'ensemble des mesures de probabilités dans  $\mathbf{R}^n$ , absolument continues par rapport à la mesure de Lebesgue et ayant un moment d'ordre 2 fini. On confond de nouveau la mesure de probabilité avec sa densité par rapport à la mesure de Lebesgue.

Otto a l'idée de considérer  $M$  comme une variété riemannienne de dimension infinie où la distance de Wasserstein est simplement la distance riemannienne.

### • Equation de continuité et vélocité

Soit un chemin dans l'ensemble des mesures de probabilités,

$$t \mapsto \mu_t \in M = \mathcal{P}_2(\mathbf{R}^n),$$

alors il existe une unique fonction  $t \mapsto \Phi_t$  (à une constante près) telle que

$$\partial_t \mu_t = -\text{Div}(\mu_t \nabla \Phi_t), \quad (7)$$

où  $\text{Div}$  est l'opérateur divergence dans  $\mathbf{R}^n$ . Bien entendu, pour que l'équation de continuité (7) soit vérifiée, le chemin  $(\mu_t)_{t \geq 0}$  doit vérifier quelques propriétés. Sans entrer dans les détails, il suffit que le chemin soit absolument continu dans l'espace de Wasserstein dans un sens expliqué dans [AGS08, Chap. 8], et dans ce cas l'équation (7) est vérifiée au sens faible.

Nous allons identifier la quantité  $\partial_t \mu_t$  par la fonction  $\nabla \Phi_t$  et on note la vélocité du chemin par l'identification suivante

$$\dot{\mu}_t = \nabla \Phi_t,$$

où on utilise comme en dimension finie la notation provenant de la mécanique. Cette représentation permet de voir l'évolution d'un flot de probabilités, où  $\dot{\mu}_t$  est un vecteur qui montre la direction et la vitesse d'un élément de masse. Cette notion provient de la mécanique des fluides. Utilisée de cette façon, *la vélocité* (velocity) peut apparaître un anglicisme plaisant, il pourrait être remplacé par *le vecteur vitesse*.

### • Espace tangent et métrique

Par l'équation de continuité, on a défini la vélocité du chemin  $(\mu_t)_{t \geq 0}$  (ayant suffisamment de régularité). L'espace tangent est donc naturellement défini à partir de la vélocité, soit  $\mu \in M$ , alors

$$T_\mu M = \{\nabla \Phi, \Phi : \mathbf{R}^n \mapsto \mathbf{R}\}.$$

De façon rigoureuse, l'espace tangent est l'adhérence de cet espace pour des fonctions régulières à support compact. La métrique proposée par Otto est la suivante, pour tout  $\nabla \Phi, \nabla \Psi \in T_\mu M$ ,

$$\langle \nabla \Phi, \nabla \Psi \rangle_\mu = \int \nabla \Phi \cdot \nabla \Psi d\mu. \quad (8)$$

• **Distance de Wasserstein**

La distance de Wasserstein, qui s'appelle aussi (plus justement) distance de Monge-Kantorovich, est définie par : soit  $\mu, \nu \in M$ ,

$$W_2(\mu, \nu) = \inf \sqrt{\iint |x - y|^2 d\pi(x, y)},$$

où l'infimum est pris sur l'ensemble des probabilités  $\pi \in \mathcal{P}(\mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^n)$  ayant pour marginales  $\mu$  et  $\nu$ .

Dans [BB00], J.-D. Benamou et Y. Brenier montrent que pour  $\mu, \nu \in M$ , mesures régulières et ayant un moment d'ordre 2,

$$W_2(\mu, \nu) = \inf \sqrt{\int_0^1 \int |\nabla \Phi_t|^2 d\mu_t dt},$$

où l'infimum, pris sur l'ensemble des chemins  $(\mu_t)_{t \in [0,1]}$  joignant  $\mu$  à  $\nu$  et  $\nabla \Phi_t$ , est la vitesse du chemin  $(\mu_t)_{t \in [0,1]}$  considéré.

En d'autres termes, la distance de Wasserstein est la distance riemannienne sur  $M$  associée à la métrique définie précédemment en (8). La métrique définie par le produit scalaire (8) est souvent appelée métrique d'Otto.

• **Gradient et hessienne d'une fonctionnelle**

De la métrique, on peut calculer le gradient d'une fonctionnelle, élément de l'espace tangent. Prenons par exemple l'entropie de Boltzmann définie en (1). Si on prend un chemin  $(\mu_t)_{t \geq 0}$  de vitesse  $\dot{\mu}_t = \nabla \Phi_t$ , alors

$$\frac{d}{dt} \text{Ent}(\mu_t) = \frac{d}{dt} \int \mu_t \log \mu_t = - \int \log \mu_t \text{Div}(\mu_t \nabla \Phi_t) = \int \nabla \log \mu_t \cdot \nabla \Phi_t \mu_t = \langle \nabla \log \mu_t, \dot{\mu}_t \rangle_{\mu_t}.$$

Ainsi, le gradient de l'entropie au point  $\mu \in M$ , que l'on note dans ce contexte  $\text{grad}_\mu \text{Ent}$ , est donné par,

$$\text{grad}_\mu \text{Ent} = \nabla \log \mu.$$

De la métrique, on peut aussi définir une dérivée covariante, basée sur une connexion riemannienne. Par ce biais, on peut définir les géodésiques (appelées géodésiques de McCann) dans l'espace de Wasserstein et pour finir la hessienne d'une fonctionnelle.

En effet si  $\mathcal{F} : M \mapsto \mathbf{R}$  est une fonctionnelle sur  $M$ , et si  $(\mu_s)_{s \in [0,1]}$  une géodésique (à vitesse constante) de vitesse  $(\dot{\mu}_s)_{s \in [0,1]}$ , on peut définir la hessienne au point  $\mu_s$ , appliquée au vecteur tangent  $\dot{\mu}_s$ , de la façon suivante :

$$\text{Hess}_{\mu_s} \mathcal{F}(\dot{\mu}_s, \dot{\mu}_s) = \frac{d^2}{ds^2} \mathcal{F}(\mu_s),$$

si tout est assez régulier pour dériver deux fois. Pour obtenir une formule explicite nous avons besoin de l'équation des géodésiques. Sans entrer dans les détails techniques, en particulier les problèmes délicats de régularité, une géodésique  $(\mu_s)_{s \in [0,1]}$  vérifie de façon formelle le système différentiel suivant

$$\begin{cases} \partial_s \mu_s + \text{Div}(\mu_s \nabla \Phi_s) = 0, \\ \partial_s \Phi_s + \frac{1}{2} |\nabla \Phi_s|^2 = 0. \end{cases} \quad (9)$$



Par ce biais, au moins de façon formelle, on peut calculer explicitement  $\frac{d^2}{ds^2}\mathcal{F}(\mu_s)$  et obtenir une expression de la hessienne.

Reprenons l'exemple de l'entropie de Boltzmann. Soit  $(\mu_s)_{s \in [0,1]}$  une géodésique de vitesse  $(\nabla\Phi_s)_{s \in [0,1]}$ , on a vu précédemment que

$$\frac{d}{ds}\text{Ent}(\mu_s) = \int \nabla \log \mu_s \cdot \nabla \Phi_s \mu_s = \int \nabla \mu_s \cdot \nabla \Phi_s.$$

Ainsi, de façon formelle en supposant que tout est régulier, en particulier pour le système (9),

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{ds^2}\text{Ent}(\mu_s) &= \int \nabla \partial_s \mu_s \cdot \nabla \Phi_s + \int \nabla \mu_s \cdot \nabla \partial_s \Phi_s = \\ &= - \int \nabla \text{Div}(\mu_s \nabla \Phi_s) \cdot \nabla \Phi_s - \frac{1}{2} \int \nabla \mu_s \cdot \nabla |\nabla \Phi_s|^2 = \\ &= \int \left( -\nabla \Phi_s \cdot \nabla \Delta \Phi_s + \frac{1}{2} \Delta |\nabla \Phi_s|^2 \right) \mu_s, \end{aligned}$$

où la dernière ligne s'obtient après 3 intégrations par parties.

Par ce calcul, au point  $\mu \in M$  et appliquée au vecteur tangent  $\nabla\Phi \in T_\mu M$ , l'expression de la hessienne de l'entropie est donnée par

$$\text{Hess}_\mu \text{Ent}(\nabla\Phi, \nabla\Phi) = \int \left( \frac{1}{2} \Delta |\nabla\Phi|^2 - \nabla\Phi \cdot \nabla \Delta \Phi \right) \mu.$$

On a donc maintenant tous les ingrédients pour appliquer en dimension infinie, ce qui a été fait précédemment en dimension finie.

### Illustration avec deux exemples remarquables :

Même si ce qui précède est formel, dû en particulier aux problèmes de régularité, dans les deux exemples suivants, les résultats sont rigoureux car ils reposent sur des équations de types paraboliques qui ont des solutions régulières.

#### 1. Équation de la chaleur.

Considérons l'équation de la chaleur dans  $\mathbf{R}^n$ ,

$$\partial_t \mu_t = \Delta \mu_t = \text{Div}(\nabla \mu_t) = \text{Div}(\mu_t \nabla \log \mu_t).$$

Ainsi, dans le calcul d'Otto, la vitesse du chemin de probabilité  $\mathbf{R}^+ \ni t \mapsto \mu_t$ , est donnée par

$$\dot{\mu}_t = -\nabla \log \mu_t.$$

Si on reprend l'entropie de Boltzmann  $\text{Ent}(\mu) = \int \mu \log \mu$ , on a vu précédemment que  $\text{grad}_\mu \text{Ent} = \nabla \log \mu$ , on a

$$\dot{\mu}_t = -\text{grad}_{\mu_t} \text{Ent}.$$

Ainsi l'équation de la chaleur est le flot de gradient de l'entropie de Boltzmann dans la métrique d'Otto. Ce résultat est fondamental, démontré dans [JKO98], article précurseur de ce domaine. Il

permet aux auteurs de proposer un algorithme, basé sur la distance de Wasserstein, pour approcher la solution de l'équation de la chaleur.

Ainsi, tout ce qui a été démontré dans le cas fini dimensionnel s'applique. Il reste à comprendre quand la hessienne de la fonctionnelle Ent est uniformément minorée par une constante strictement positive. On a vu précédemment que

$$\text{Hess}_\mu \text{Ent}(\nabla\Phi, \nabla\Phi) = \int \left( \frac{1}{2} \Delta |\nabla\Phi|^2 - \nabla\Phi \cdot \nabla \Delta\Phi \right) \mu = \int \|\text{Hess}\Phi\|^2 \mu,$$

où  $\|\text{Hess}\Phi\|^2 = \sum_{i,j=1}^n (\partial_{i,j}\Phi)^2$ . Maintenant, si on souhaite obtenir une inégalité de type (3), soit donc

$$\text{Hess}_\mu \text{Ent}(\nabla\Phi, \nabla\Phi) = \int \|\text{Hess}\Phi\|^2 \mu \geq \rho \int |\nabla\Phi|^2 \mu,$$

pour toute fonction  $\Phi$ . Cette inégalité n'est malheureusement possible que si  $\rho = 0$  (prendre par exemple  $\Phi(x) = a \cdot x$ ,  $a \in \mathbf{R}^n$ ).

C'est assez naturel car, dans  $\mathbf{R}^n$ , la solution de l'équation de la chaleur tend vers 0 (qui n'est pas une probabilité, de la masse a été perdue). Pour éviter ça, on peut, soit se placer dans une variété riemannienne compacte, soit modifier l'équation de la chaleur et ajouter une force de rappel, lui permettant de converger vers une distribution non nulle.

Ainsi, pour rester dans l'espace euclidien, nous considérons l'équation de Fokker-Planck,

$$\partial_t \mu_t = \Delta \mu_t + \text{Div}(x \mu_t) = \text{Div} \left( \mu_t \nabla \left[ \log \mu_t + \frac{|x|^2}{2} \right] \right).$$

Cette équation admet une solution explicite et régulière partant par exemple d'une donnée initiale dans l'espace de Schwartz. Elle admet une unique solution stationnaire de masse 1, la mesure gaussienne standard,

$$d\gamma(x) = \exp \left( -\frac{|x|^2}{2} \right) \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} d\lambda(x).$$

La vélocité de la solution  $(\mu_t)_{t \geq 0}$  est par définition,

$$\dot{\mu}_t = -\nabla \left( \log \mu_t + \frac{|x|^2}{2} \right),$$

et est le flot de gradient de la fonctionnelle

$$\mathcal{F}(\mu) = \int \mu \log \mu + \frac{|x|^2}{2} \mu,$$

par rapport à la métrique d'Otto. En effet, le gradient d'une fonctionnelle est une application linéaire et on obtient à la mesure de probabilité  $\mu$ ,

$$\text{grad}_\mu \mathcal{F} = \nabla \log \mu + \nabla \frac{|x|^2}{2}.$$

Il n'est pas difficile de montrer que la hessienne de  $\mathcal{F}$  est uniformément minorée par constante  $\rho = 1$ , c'est-à-dire dans le langage d'Otto on peut montrer que

$$\text{Hess}_\mu \mathcal{F}(\nabla\Phi, \nabla\Phi) = \int \|\text{Hess}\Phi\|^2 \mu + \int \text{Hess} \left( \frac{|x|^2}{2} \right) (\nabla\Phi, \nabla\Phi) \mu \geq \int |\nabla\Phi|^2 \mu.$$

De façon condensée, cette inégalité s'écrit simplement

$$\text{Hess}_\mu \mathcal{F} \geq \text{Id}_\mu,$$

où  $\text{Id}_\mu$  représente la métrique au point  $\mu \in M$ . On retrouve la même inégalité qu'en dimension finie, l'inégalité (3) avec la constante  $\rho = 1$ .

Le minimum de la fonctionnelle  $\mathcal{F}$  est atteint pour la mesure gaussienne standard  $\gamma$ . Ainsi, en imitant, ce qui se passe en dimension finie, la méthode de Bakry-Émery permet de démontrer l'inégalité suivante

$$\int \left| \nabla \left( \log \mu_t + \frac{|x|^2}{2} \right) \right|^2 \mu_t \leq e^{-2t} \int \left| \nabla \left( \log \mu_0 + \frac{|x|^2}{2} \right) \right|^2 \mu_0,$$

inégalité équivalente à (5) dans le cas fini dimensionnel. L'inégalité entropie-production d'entropie s'écrit de la façon suivante, pour tout  $\mu \in M$ ,

$$\mathcal{F}(\mu) - \mathcal{F}(\gamma) \leq \frac{1}{2} |\text{grad}_\mu \mathcal{F}|_\mu^2 = \frac{1}{2} \int \left| \nabla \left( \log \mu + \frac{|x|^2}{2} \right) \right|^2 \mu.$$

Après un changement de fonction,  $\mu = \exp(-|x|^2/2)f$ , cette inégalité prend la forme suivante, pour toute fonction  $f$  positive,

$$\int f \log \frac{f}{\int f d\gamma} d\gamma \leq \frac{1}{2} \int \frac{|\nabla f|^2}{f} d\gamma.$$

Celle-ci s'appelle l'inégalité de Sobolev logarithmique pour la mesure gaussienne  $\gamma$  et a été démontrée par Gross en 1975 dans [Gro75]. Cette inégalité a de nombreuses propriétés remarquables et est utilisée en EDP, probabilités, géométrie etc.

## 2. L'équation des milieux poreux avec une force de rappel.

Considérons maintenant l'équation de Fokker-Planck non linéaire dans  $\mathbf{R}^n$ ,  $n > 2$ , ou équation des milieux poreux avec une dérive (en fait plutôt appelée équation des diffusions rapides puisque l'exposant, ici  $1 - 1/n$ , est dans l'intervalle  $]0, 1[$ ),

$$\partial_t \mu = \frac{1}{n} \Delta (\mu^{1-1/n}) + \frac{n-1}{n} \text{Div}(\mu x) = \frac{n-1}{n} \text{Div} \left[ \mu \nabla \left( -\mu^{-1/n} + \frac{|x|^2}{2} \right) \right]. \quad (10)$$

Partant d'une donnée initiale qui est une probabilité, la vélocité du flot est donc donnée par

$$\dot{\mu}_t = -\frac{n-1}{n} \nabla \left( -\mu_t^{1/n} + \frac{|x|^2}{2} \right).$$

Il n'est pas trop difficile de voir que

$$\dot{\mu}_t = -\text{grad}_{\mu_t} \mathcal{F},$$

où

$$\mathcal{F}(\mu) = \int \left( -\mu^{-1/n} + \frac{n-1}{n} \frac{|x|^2}{2} \right) \mu.$$

Un calcul un peu plus compliqué, si on ne s'y prend mal, permet de calculer la hessienne de  $\mathcal{F}$ . Au point  $\mu$  et pour  $\nabla\Phi$ , élément de l'espace tangent, on obtient

$$\text{Hess}_\mu \mathcal{F}(\nabla\Phi, \nabla\Phi) = \frac{1}{n} \int (||\text{Hess } \Phi||^2 - \frac{1}{n}(\Delta\Phi)^2)\mu + \frac{n-1}{n} \int |\nabla\Phi|^2 \mu,$$

calcul effectué par exemple dans [OW06]. Puisque  $||\text{Hess } \Phi||^2 = \sum_{i,j} (\partial_{ij}\Phi)^2$ , par une inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$||\text{Hess } \Phi||^2 - \frac{1}{n}(\Delta\Phi)^2 \geq 0.$$

Ainsi on obtient,

$$\text{Hess}_\mu \mathcal{F}(\nabla\Phi, \nabla\Phi) \geq \frac{n-1}{n} \int |\nabla\Phi|^2 \mu,$$

ce qui s'écrit aussi de la façon suivante,

$$\text{Hess}_\mu \mathcal{F} \geq \frac{n-1}{n} \text{Id}_\mu.$$

On retrouve encore le cas de la dimension finie (3) avec la constante  $\rho = \frac{n-1}{n}$ . Un calcul indépendant montre que la solution  $(\mu_t)_{t \geq 0}$  converge, lorsque  $t$  tend vers l'infini, vers l'état stationnaire  $\mu_\infty = (C + |x|^2/2)^{-n}$  où  $C$  est une constante de normalisation pour que  $\mu_\infty$  soit une mesure de probabilité. On peut alors montrer une inégalité d'entropie-production d'entropie, pour toute mesure  $\mu_0 \in M$ ,

$$\mathcal{F}(\mu_0) - \mathcal{F}(\mu_\infty) \leq \frac{n-1}{2n} \int \left| \nabla \left( \mu_0^{-1/n} - \frac{|x|^2}{2} \right) \right|^2 \mu_0 = -\frac{n}{2(n-1)} \frac{d}{dt} \mathcal{F}(\mu_t) \Big|_{t=0},$$

Cette inégalité de convexité n'est rien d'autre qu'une forme un peu « barbare », et équivalente, de l'inégalité de Sobolev optimale dans  $\mathbf{R}^n$ , pour toute fonction  $f : \mathbf{R}^n \mapsto \mathbf{R}$ , régulière à support compact,

$$||f||_{L^{\frac{2n}{n-2}}(\lambda)} \leq C_{op} ||\nabla f||_{L^2(\lambda)}.$$

Cette dernière inégalité se retrouve simplement après un changement de fonction et une intégration par parties. Notons que cette inégalité est attribuée à Sobolev en 1938 et que la constante optimale a été calculée par Aubin et Talenti en 1976.

Il est remarquable de voir qu'une telle inégalité, si importante en analyse, en EDP et en géométrie, n'est qu'une inégalité de convexité le long d'un flot de gradient. On s'aperçoit aisément dans la preuve de cette inégalité que d'autres cas assez similaires peuvent être traités, par exemple on retrouve naturellement par cette méthode la famille des inégalités de Gagliardo-Nirenberg optimales démontrées par M. del Pino et J. Dolbeault en 2002 ou bien l'inégalité de Sobolev dans une variété riemannienne avec des conditions de courbures, démontrée par J. Demange en 2008.

L'interaction entre l'entropie et le calcul d'Otto est toujours un domaine très actif en mathématique. Pour l'illustrer, écrivons en détail ce récent théorème de S. Zugmeyer qui démontre une inégalité de type Sobolev sur un ensemble convexe borné de  $\mathbf{R}^n$ , mettant à profit le calcul d'Otto pour généraliser les résultats précédents.

**Théorème ([Zug19])** *Soit  $H : \mathbf{R}^+ \mapsto \mathbf{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$ , strictement convexe, vérifiant  $H(0) = 0$  et posons  $\Psi = H'$ . Choisissons un ensemble convexe fermé  $\Omega \subset \mathbf{R}^n$  ( $n \geq 1$ ) et une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$ ,  $v : \Omega \mapsto (0, +\infty)$ . Supposons que*

- Pour tout  $x \geq 0$ ,  $xU'(x) + \frac{1-n}{n}U(x) \geq 0$ , où  $U(x) = x\Psi(x) - H(x)$ ;
- Il existe une constante  $C > 0$ , telle que  $-\text{Hess}(\Psi(v)) \geq C\text{Id}$ .

Alors pour tout fonction strictement positive  $u \in C^\infty(\Omega)$  vérifiant  $\int_\Omega u = \int_\Omega v$ ,

$$\int_\Omega (H(u) - H(v) - (u - v)\Psi(v))d\lambda \leq \frac{1}{2C} \int_\Omega \|\nabla(\Psi(v) - \Psi(u))\|^2 u d\lambda.$$

Terminons ces quelques pages par une citation de Ievgueni Zamiatine, tiré de *Nous autres* (1920), « Alors voici : il y a deux forces en ce monde - l'entropie et l'énergie. L'entropie vise la paix et la béatitude, l'équilibre heureux - l'autre recherche la rupture des équilibres, la torture du mouvement infini. » C'est très probablement la première utilisation de l'entropie en littérature. On peut se demander si l'auteur de ce remarquable livre d'anticipation reprend les mêmes notions de l'entropie que celles proposées par Clausius. Si Clausius n'a pas pu donner son avis sur cette question, le régime soviétique lui n'a pas apprécié cette œuvre satirique dénonçant le totalitarisme.

Je tiens à remercier Louis Dupaigne et Laurent Miclo pour leurs remarques pertinentes lors de la rédaction de ces quelques pages.

## Références

- [AGS08] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré. *Gradient flows in metric spaces and in the space of probability measures*. Basel : Birkhäuser, 2nd edition, 2008.
- [BB00] J.-D. Benamou and Y. Brenier. A computational fluid mechanics solution to the Monge-Kantorovich mass transfer problem. *Numer. Math.*, 84(3) :375–393, 2000.
- [BE85] D. Bakry and M. Émery. Diffusions hypercontractives. *Sémin. de probabilités XIX, Univ. Strasbourg 1983/84, Proc., Lect. Notes Math. 1123, 177-206*, 1985.
- [Cla65] R. Clausius. Sur diverses formes facilement applicables qu'on peut donner aux équations fondamentales de la théorie mécanique de la chaleur. *J. Math. Pures Appl. (2)*, 10 :361–400, 1865.
- [Gro75] L. Gross. Logarithmic Sobolev inequalities. *Am. J. Math.*, 97 :1061–1083, 1975.
- [JKO98] R. Jordan, D. Kinderlehrer, and F. Otto. The variational formulation of the Fokker-Planck equation. *SIAM J. Math. Anal.*, 29(1) :1–17, 1998.
- [Ott01] F. Otto. The geometry of dissipative evolution equations : The porous medium equation. *Commun. Partial Differ. Equations*, 26(1-2) :101–174, 2001.
- [OW06] F. Otto and M. Westdickenberg. Eulerian calculus for the contraction in the Wasserstein distance. *SIAM J. Math. Anal.*, 37(4) :1227–1255, 2006.
- [Per02] G. Perelman. The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications. *Preprint*, 2002.
- [Vil09] C. Villani. *Optimal transport. Old and new*. Berlin : Springer, 2009.
- [Zug19] S. Zugmeyer. Entropy flows and functional inequalities in convex sets. Preprint hal-02407995, 2019.

I. G. Institut Camille Jordan, Umr Cnrs 5208, Université Claude Bernard Lyon 1, 43 boulevard du 11 novembre 1918, F-69622 Villeurbanne cedex. [gentil@math.univ-lyon1.fr](mailto:gentil@math.univ-lyon1.fr)