



**HAL**  
open science

# Le Grand bouleversement. Le système bio-Terre et l'éon Anthropozoïque

Marc Delepouve

► **To cite this version:**

Marc Delepouve. Le Grand bouleversement. Le système bio-Terre et l'éon Anthropozoïque. 2020. hal-02503252v2

**HAL Id: hal-02503252**

**<https://hal.science/hal-02503252v2>**

Preprint submitted on 31 Mar 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

# **Le grand bouleversement**

*Systeme bio-Terre*  
*Éon Anthropozoïque*

**Marc Delepoue**

**CNAM, Univ.Lille, EA 3716-HT2S**

Texte rédigé dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat  
dirigée par Bertrand Bocquet et codirigée par Jean-Claude Ruano-Borbalan

*A Gilles Ramstein, auteur de Voyage à travers les climats de la Terre (2015). De cet ouvrage j'ai puisé des données reprises tout au long des deux premiers chapitres. Sa lecture a contribué à la maturation de ma pensée dont ce texte est le fruit.*

## Table des matières

1 <sup>ère</sup> partie.....	6
Le système bio-Terre.....	6
I. Influences et chocs externes.....	6
1. Les mouvements des continents.....	7
2. L'activité volcanique.....	8
3. L'érection des montagnes.....	9
4. L'activité solaire.....	9
5. Les météorites et les astéroïdes.....	9
6. Les variations de l'orbite de la Terre.....	10
II. Cycles climatiques du Quaternaire.....	10
III. Bouleversement du cycle du carbone.....	11
IV. Un système complexe.....	11
2 <sup>e</sup> partie.....	14
L'hypothèse de l'éon Anthropozoïque.....	14
I. Éons, ères, périodes.....	14
II. L'Hadéen et l'Archéen.....	14
1. Instabilité.....	14
2. Vers l'apparition du vivant.....	15
3. Un climat très chaud.....	15
4. Le premier stade du système bio-Terre.....	15
III De l'Archéen au Protérozoïque.....	16
IV Du Protérozoïque au Phanérozoïque.....	17
V Du Phanérozoïque à l'Anthropozoïque ?.....	19
1. Les bifurcations entre éons.....	19
2. L'hypothèse de l'éon Anthropozoïque.....	20
3. L'ère de l'Anthropocène.....	20
4. Une nouvelle composante du vivant.....	21
5. Fulgurance.....	21
3 <sup>e</sup> partie.....	22
Libérer la complexité.....	22
I. Géo-ingénierie.....	22
II. Obscurantisme scientifique.....	22
III. XX <sup>e</sup> siècle, l'humanité entre en bifurcation.....	23
IV. Accélération.....	24
V. La force du sens.....	24
Addenda.....	26
Point sur la bifurcation du système bio-Terre.....	26
en ce début de XXI <sup>e</sup> siècle.....	26
I. Dioxyde de carbone et climat.....	26
II. Les forêts dévastées.....	26
III. Biodiversité.....	27
IV. Nitrates.....	27
V. Perturbateurs endocriniens.....	28
VI. Microparticules de plastique.....	28
VII. Champignons, l'effet boomerang.....	28
VIII. Océans, la rupture des équilibres.....	29

IX. Perméabilité et vulnérabilité des humains.....	31
X. Instabilité du vivant.....	32
XI. Choc frontal.....	33
Annexe 1. Les paramètres de Milankovitch.....	34
L'excentricité.....	34
L'obliquité.....	34
La précession.....	34
Annexe 2. L'acidification des océans.....	35
Remerciements.....	36

# 1<sup>ère</sup> partie

## Le système bio-Terre

Le Monde du vivant, l'atmosphère (sa composition chimique, les nuages...), les océans (la composition chimique de l'eau, les courants, les fonds marins...), les sols continentaux (l'albédo, la nature des sols...), le climat, ces cinq domaines présentent des évolutions extrêmement liées, inséparables. Finalement, leurs histoires ne font qu'une. « Monde du vivant – atmosphère - océans - sols continentaux - climat » forment un même système. Un système au sein duquel d'innombrables interactions s'expriment et se traduisent par une évolution sans fin du système pris dans son ensemble. Un système que j'appellerai désormais système bio-Terre, où des stades d'évolution lente sont entrecoupés de moments de basculement, de bifurcation. Pourquoi introduire le terme système bio-Terre, alors que le terme système Terre lui pré-existe et bénéficie déjà d'un usage répandu ? Le préfixe bio renvoie au Monde du vivant, lequel présente une évolution irréversible qui ne s'interrompt jamais. Une évolution qui conditionne constamment et fortement l'état de la totalité du système bio-Terre et enclenche ou contribue à enclencher des bifurcations de ce système, notamment – nous le verrons - les plus importantes d'entre elles. Aussi, nous pourrions définir le système bio-Terre comme l'ensemble des éléments en interaction complexe avec le Monde du vivant. Ainsi l'intérieur de la Terre (plaques tectoniques incluses) n'est pas compris dans le système bio-Terre, bien qu'il puisse être considéré comme une partie du système Terre.

### I. Influences et chocs externes

Le système bio-Terre n'est pas un univers fermé, mais est soumis à l'influence de phénomènes qui lui sont extérieurs : le mouvement des continents, l'activité volcanique, l'érection des montagnes, l'activité solaire, les météorites et astéroïdes qui percutent la Terre, les variations de l'orbite terrestre. Ces phénomènes sont la cause ou une des causes de certaines bifurcations du système bio-Terre.

Système bio-Terre		
Composantes internes	Influences externes	
	Terrestres	Non terrestres
Monde du vivant	Mouvements des continents	
Climat	Activité volcanique	
Atmosphère	Érection des montagnes	
Océans		Activité solaire

Sols continentaux	Météorites
	Orbite de la Terre

## 1. Les mouvements des continents

Au commencement, il y a environ 2,9 milliard d'années, nous avons la naissance des premières surfaces continentales conséquentes. Auparavant la Terre était quasiment entièrement couverte d'océans. Depuis, se déroule un va et vient – dû aux mouvements des plaques tectoniques. Ce va et vient va de la constitution d'un continent unique ou quasiment unique à son éclatement en plusieurs continents, puis à des dérives de ceux-ci, et enfin à leur rapprochement et à la formation d'un nouveau continent unique. Et ainsi de suite.

L'histoire des continents influence celle du climat. Toutefois, la nature et les mécanismes de cette influence ont évolué au cours des temps géologiques, car ils dépendent du vivant et du stade de son évolution. Nous allons ici nous situer après la période géologique du Dévonien (de 419 millions d'années à 358,9 millions d'années avant nos jours), durant laquelle les forêts, écosystème inédits, sont apparues et ont colonisés les continents. Sur un continent unique, encore appelé super continent, les surfaces arides prennent des dimensions démesurées. L'effet albédo y est important, ce qui favorise un refroidissement climatique global. Mais il y a aussi et surtout des effets opposés. Tout d'abord, la décomposition des forêts et de leur sol génère du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) qui rejoint l'atmosphère, ce qui favorise un réchauffement climatique global. Ensuite, l'effondrement de la végétation a pour conséquence une réduction notable de la quantité de dioxyde de carbone capté par cette végétation, ce qui favorise à nouveau un réchauffement. Enfin, il y a une diminution du captage du dioxyde de carbone par érosion des silicates des sols – en raison d'une moindre présence de la végétation, d'une part, et, d'autre part, d'une moindre quantité de pluies - ce qui apporte une troisième contribution à l'augmentation du taux de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère et donc au réchauffement.

### Érosion chimique des silicates


Le captage du CO<sub>2</sub> par érosion des silicates des sols continentaux se réalise grâce à de l'eau de pluie chargée en CO<sub>2</sub>, laquelle est plus rare sur un continent unique, immense et globalement aride, que sur des continents dispersés et de taille réduite. Il repose sur des réactions chimiques (voir l'exemple ci-dessous) entre des molécules de silicate, des molécules de CO<sub>2</sub> et des molécules d'eau, et donne naissance à d'autres molécules dont des molécules de carbonate<sup>1</sup> (lesquelles contiennent les atomes de carbone issues des molécules de CO<sub>2</sub>). Ce processus a une influence importante sur le taux de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère et donc sur le climat, car les silicates sont présents dans des quantités considérables : ils composent l'essentiel de la croûte terrestre.

### Exemple de l'aluminosilicate de calcium

<sup>1</sup> Les molécules de carbonates sont composées de CO<sub>3</sub> et d'un ou plusieurs autres atomes. Par exemple le bicarbonate a pour formule chimique HCO<sub>3</sub>. Le bicarbonate de soude, NaHCO<sub>3</sub>. Le carbonate de calcium, CaCO<sub>3</sub>.



Une catégorie de labradorites - pierres précieuses dont le nom est inspiré de la région où elles ont été identifiées, le Labrador, au Canada - sont composées d'aluminosilicate de calcium,  $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ . L'érosion chimique de ce silicate repose sur la réaction suivante :



Le carbone du dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ ) est passé dans le carbonate ( $\text{HCO}_3$ )

Au final, depuis la période du Dévonien, la formation d'un supercontinent agit en faveur d'un réchauffement climatique global. Le dernier supercontinent a pour nom la Pangée. Il a notamment occupé toute la période géologique du Permien, allant de 299 millions d'années à 252 millions d'années. Au début de cette période, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était situé entre 300 et 400ppm (proche du taux actuel). Le climat était celui d'une glaciation (l'énergie solaire arrivant sur Terre était alors inférieure de 2 % à ce qu'elle est de nos jours). 47 millions d'années plus tard, à la fin du Permien, le taux de  $\text{CO}_2$  était multiplié par un facteur estimé entre 5 et 10. Le climat était très chaud et aride. Des espèces vivantes ne survécurent pas à ce réchauffement climatique global ; y compris dans les mers et océans, devenus plus chauds et plus acides. C'est alors qu'une intense activité volcanique se déclencha, en Sibérie, avec pour conséquence une intensification de la disparition d'espèces vivantes, et finalement la plus grande extinction du Phanérozoïque. De là s'ouvrit une nouvelle ère géologique, l'ère du Mésozoïque (autrefois appelée ère secondaire).

Autre événement notable de l'histoire de la Terre lié aux mouvements des continents : l'ouverture du passage du Drake, il y a un peu plus de 30 millions d'années. Le continent Antarctique, à l'époque couvert de forêts, s'est séparé du continent Sud Américain, ce qui a ouvert un passage entre les océans Pacifique et Atlantique. Ceci a permis la naissance d'un courant océanique circulaire qui, aujourd'hui encore, fait le tour de l'Antarctique. Ce courant, dit circumpolaire, créa une frontière entre d'un côté l'Antarctique et ses eaux limitrophes, et de l'autre les eaux chaudes situées plus au Nord. Concrètement, depuis lors les courants venant des mers chaudes sont bloqués par le courant circumpolaire, ils ne réchauffent donc plus l'Antarctique. Cela, combiné à une baisse du taux de  $\text{CO}_2$ , eut pour effet la disparition de la forêt antarctique et la constitution de la calotte de glace de ce continent polaire.

Ces deux exemples, la Pangée et l'ouverture du Drake, illustrent l'influence des mouvements des continents sur l'ensemble des composantes du système bio-Terre : climat, Monde du vivant, atmosphère, océans et sols continentaux. Cependant, la réciproque est fautive. Les mouvements des continents ne sont influencés par aucune des composantes de ce système. Ils ne sont pas considérés comme interne au système bio-Terre, mais extérieurs à celui-ci.

## 2. L'activité volcanique

Aux premiers temps de l'histoire terrestre, l'activité volcanique était particulièrement intense et donnait lieu à des émissions massives de dioxyde de carbone et d'oxysulfure de carbone ( $\text{COS}$ ), un puissant gaz à effet de serre, d'où un climat particulièrement chaud malgré une activité solaire bien moins intense que de nos jours. L'activité volcanique joua ensuite un rôle de premier plan lors de certaines extinctions massives d'espèces animales et végétales. Ce fût en particulier le cas au terme

de l'ère du Paléozoïque il y a 252 millions d'années, comme nous venons de le voir, et au terme de l'ère du Mésozoïque il y a 66 millions d'années.

### **La disparition des dinosaures**

Il y a 66 millions d'années, une gigantesque irruption de volcans, située dans l'ouest de l'Inde, s'étendit sur plusieurs centaines de milliers d'années. C'est alors que la Terre entra en collision avec un astéroïde. Le cratère d'impact, situé à Chicxulub, dans la péninsule du Yucatán au Mexique, mesure 180 kilomètres de diamètre. Cependant, l'impact ne fut pas que local et durant 50 000 ans les volumes des coulées de lave des irruption volcanique indienne ont plus que doublé. La collision de l'astéroïde combiné à l'activité volcanique a produit des fumées toxiques et des poussières qui se sont répandues partout sur la planète. Le climat en a été modifié. Fumées toxiques, poussières, changement climatique..., ont eu pour conséquence la disparition de la moitié des espèces vivantes, dont l'ensemble des dinosaures et une grande partie des animaux.

### **3. L'érection des montagnes**

L'érection des montagnes impacte directement le climat. Ainsi, en Inde la mousson résulte de la formation de l'Himalaya, et les silicates mis à nu associés à la pluviosité élevée font de ce massif un important puits de carbone.

### **4. L'activité solaire**

Trois derniers phénomènes, cette fois-ci extérieurs à la planète Terre, influencent le système bio-Terre sans être influencés par celui-ci. Tout d'abord l'activité solaire. La quantité d'énergie solaire reçue par la planète Terre augmente de 7 % chaque milliard d'années. Elle a donc augmenté de 31 %<sup>2</sup> en 4 milliards d'années. Cela aurait dû rendre la Terre inhabitable, ce qui ne se produisit pas car en tendance longue la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, extrêmement élevée aux premiers âges de la Terre, poursuit une baisse continue.

L'activité solaire présente en outre des fluctuations de courte durée. Certaines selon un cycle de onze ans. D'autres, plus longues, peuvent s'inscrire sur plusieurs siècles. Cependant, ces fluctuations possèdent une ampleur et une durée insuffisante pour participer aux grands basculements de l'histoire du climat. Elles constituent par contre des facteurs notables de la météo. Elles jouent aussi un rôle dans des variations climatiques de courte durée, jusqu'à plusieurs siècles. Durant le dernier millénaire, l'impact de ces fluctuations sur l'énergie emmagasinée dans l'atmosphère a varié de  $\pm 0,3 \text{ W/m}^2$ . Depuis le milieu du XXe siècle, nous sommes en haut de cette fourchette, entre  $+0,2$  et  $+0,3 \text{ W/m}^2$ . Il y a donc une contribution de l'activité solaire au réchauffement climatique global. Toutefois, ce chiffre doit être comparé à l'impact du dioxyde de carbone émis depuis deux siècles par les activités humaines, qui est aujourd'hui de l'ordre de  $2 \text{ W/m}^2$ , soit près de dix fois plus important. Les émissions de gaz à effet de serre par les humains constituent clairement la toute première cause du réchauffement climatique global<sup>1</sup>.

---

2  $(1,07)^4 = 1,31$

## 5. Les météorites et les astéroïdes

La rencontre de la Terre avec des comètes ou avec des corps célestes influence le système bio-Terre. Il y a 66 millions d'années, l'impact d'un météorite percutant la Terre associé à celui de l'activité volcanique joua un rôle dans l'extinction massive d'espèces vivantes qui marqua le passage entre l'ère du Mésozoïque (autrefois appelée ère secondaire) et l'ère du Cénozoïque (qui réunit les ères tertiaire et quaternaire de l'ancienne nomenclature).

## 6. Les variations de l'orbite de la Terre

Enfin, sixième et dernier phénomène de notre tour d'horizon, la variation de l'orbite de la Terre autour du soleil et la variation de la position de la Terre par rapport à son orbite. En 1941, le Serbe Milutin Milankovitch publia une théorie du climat où il expliquait les glaciations et les déglaciations des derniers 600 000 ans, en se basant sur les variations de trois paramètres orbitaux : l'excentricité, l'obliquité et la précession (voir Annexe 1). Ces paramètres, aujourd'hui appelés paramètres de Milankovitch, varient selon des cycles dont la durée s'expriment en dizaines de milliers d'années. M. Milankovitch a révélé le lien de causalité entre les variations des paramètres du même nom et les cycles climatiques. Depuis lors, la théorie de M. Milankovitch a été confirmée, avec toutefois une nuance sur laquelle nous allons revenir. En outre, son application a été étendue à l'ensemble de la période du Quaternaire, qui a débuté il y a 2,6 millions d'années et qui, nous le verrons, a pris fin récemment (géologiquement parlant).

## II. Cycles climatiques du Quaternaire

Le climat du Quaternaire variait selon un système cyclique relativement stable. Les variations cycliques des trois paramètres de Milankovitch se combinaient pour orchestrer des variations cycliques du climat terrestre où chaque cycle débutait par une glaciation (augmentation importante du volume de glace terrestre), puis s'achevait par une déglaciation. Toutefois, les cycles n'étaient pas parfaits. Tout d'abord ils se sont succédé sur un fond de refroidissement climatique lent (aux effets négligeables à l'échelle de l'humanité). Ensuite, la durée des cycles a varié : de l'ordre de 40 000 ans entre 2,6 millions d'années et 1 million d'années avant nos jours, puis de l'ordre de 100 000 ans durant le dernier million d'années. Enfin, au cours de chacun des cycles, le climat a connu des fluctuations distinctes d'un cycle à l'autre, qui elles même se déroulaient plus ou moins en cycles (de courte durée). Pour l'essentiel, ces fluctuations étaient, elles aussi, liées aux paramètres de Milankovitch, sinon à l'activité solaire.

Toutefois, la variation de l'insolation terrestre (la quantité d'énergie solaire reçue au sommet de l'atmosphère et sa répartition selon les latitudes et les saisons), consécutive aux variations des paramètres de Milankovitch, était bien trop faible pour expliquer à elle seule les cycles glaciations/déglaciations. Un mécanisme d'amplification de l'influence des paramètres de Milankovitch entraînait en jeu et reposait notamment sur le carbone et le Monde du vivant.

Du carbone est stocké dans le sols des continents et dans les fonds marins. Lors d'un réchauffement climatique global engendré par les variations combinées des trois paramètres de Milankovitch, une partie de ce carbone est relâché dans l'atmosphère, cela sous la forme de gaz à effet de serre ( $\text{CO}_2$  et  $\text{CH}_4$ ), ce qui amplifie le réchauffement. A l'opposé, lors d'un refroidissement

climatique engendré par la variation des paramètres de Milankovitch, du dioxyde de carbone est soustrait de l'atmosphère et vient accroître les stocks de carbone des sols continentaux et des fonds marins, ce qui amplifie le refroidissement.

### **Durée de vie du méthane**

L'oxygène (O<sub>2</sub>) réagit chimiquement avec le méthane (CH<sub>4</sub>), ce qui donne du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) et de l'eau (H<sub>2</sub>O). Les molécules de méthane dans l'atmosphère ont actuellement une durée de vie médiane d'environ douze ans, laquelle a varié au cours de l'histoire terrestre en fonction du taux d'oxygène.

Lors d'un réchauffement climatique global, une part conséquente du carbone relâché provient du pergélisol, les terres gelées du grand Nord de notre planète. En effet, des étendues de ce dernier se désintègre et donne lieu, d'une part à la fonte d'hydrates<sup>3</sup> de méthane (dont le méthane a été produit par le vivant au moins des dizaines de milliers d'années auparavant) et d'autre part à la formation de marres thermokarst. De la partie inférieure de ces marres, des archées méthanogènes émettent du méthane, alors que d'autres micro-organismes, plus proches de la surface de l'eau, émettent du dioxyde de carbone. Ces mares font leur apparition à chaque déglaciation.

## **III. Bouleversement du cycle du carbone**

Le mouvement incessant d'aller retour du carbone, entre les sols continentaux et les fonds marins d'un côté, et l'atmosphère de l'autre, a donné l'expression *cycle de carbone*. Celle-ci est encore employée dans le contexte du changement climatique actuel. Cela peut être trompeur. En effet, la notion de cycle comporte l'idée que dans le futur nous retrouverons les états passés. Or nous n'en savons rien. Un passage par les états antérieurs semble même improbable. La période de relative stabilité climatique, d'une durée de 2,6 millions d'années, a pris fin il y a deux siècles. Le climat a depuis lors amorcé un profond changement. Un jour, peut-être, le climat et le carbone trouveront à nouveau une relative stabilité, présentant éventuellement des variations cycliques. Mais cela ne se produira pas dans un avenir proche. De plus, cette relative stabilité serait très probablement de nature très différente de celle du Quaternaire. Toujours est-il qu'actuellement le climat et le carbone évoluent hors de tout cycle, hors du système qui a eu cours pendant 2,6 million d'années. Cela est illustré par la quantité de carbone présente dans l'atmosphère, d'une ampleur jamais atteinte depuis au moins 3,5 millions d'années.

Le cycle du carbone est frontalement percuté par certaines activités humaines : usage d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel), agriculture (élevage de ruminants dont notamment les bovins et les ovins, culture du riz sur des parcelles inondées, fumiers...), déforestations, cimenteries... Ainsi, le carbone n'est plus uniquement une source d'amplification des changements climatiques, comme c'était le cas depuis au moins 2,6 millions d'années : les Homo sapiens en ont

---

3. Un hydrate de méthane est une molécule de méthane emprisonnée dans une cage d'eau glacée. Lorsque l'une de ces cages fond, elle libère sa molécule de méthane.

fait la cause d'un réchauffement climatique global, dont l'amplification par le même carbone (et par le Monde du vivant) n'est, à ce jour, quasiment pas ou pas encore enclenchée.

## IV. Un système complexe

Le Monde du vivant, l'atmosphère, les océans, les sols continentaux et le climat sont les cinq composantes d'un **système complexe**, le système bio-Terre. Toute modification de l'une d'entre elles entraîne une modification de chacune des quatre autres. Ainsi, tout changement du climat se traduit par des adaptations du Monde du vivant, des modifications des taux de présence du dioxyde de carbone, du méthane et de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, des modifications de la composition de l'eau de mer, et des modifications des processus d'érosion des sols. En retour, la modification de chacune de ces quatre dernières entraîne des modifications de la première. Finalement, dès lors qu'une des composantes du système bio-Terre connaît un changement, s'opère alors une évolution de l'ensemble du système, sous l'effet d'interactions en cascade.

### Une révolution totale

La révolution de la pensée du complexe s'est amorcée au milieu du XXe siècle. Elle permet d'étudier des objets que le plus souvent les disciplines scientifiques n'ont pas vocation à aborder, par exemple le système bio-Terre ou encore l'humanité prise dans son ensemble. Elle se nourrit des résultats des sciences segmentées en disciplines, mais va au-delà. Elle est porteuse d'un changement de nos modes de pensée et constitue un outil puissant qui permet de modifier l'ensemble des représentations, y compris celles que chacun possède de lui-même, des autres et de ses groupes d'appartenance. Elle est indispensable à la conception et la mise en œuvre de réponses à de nombreux problèmes. Au-delà de la pensée et des représentations, la révolution du complexe se traduira dans l'agir, aux plans culturel, social et politique ; en ce sens, cette révolution en marche est une révolution totale. Cette révolution est indispensable – mais pas suffisante - pour adapter nos systèmes mentaux, nos comportements et notre agir collectif planétaire à la situation créée par le grand bouleversement du système bio-Terre.

Des approches et des développements de la pensée du complexe assez divers existent ; cela est en partie dû au fait que la pensée du complexe est souple et s'adapte à l'objet sur lequel elle se pose. Certains concepts lui sont associés. Par exemple ceux de **bifurcation**, de **boucle rétroactive** et d'**émergence**, que nous retrouverons ici à propos du système bio-Terre. Il y a aussi, et c'est le cœur de tout système complexe, les interactions qui fondent ces systèmes. Par ailleurs, des objets ou des systèmes extérieurs à un système complexe peuvent éventuellement agir sur celui-ci. Enfin, la plupart des systèmes complexes sont en évolution, le plus souvent lente, parfois cyclique, avec d'éventuels moments de rupture et de bifurcation.

Aujourd'hui, le système bio-Terre a amorcé une évolution profonde et rapide. Sorti de son état du Quaternaire, il empruntera une **bifurcation**, c'est à dire un passage d'un état à un autre état. Ce dernier devrait se présenter sous une nouvelle forme d'évolution lente ; mais pourrait aussi, à l'opposé, prendre la forme d'une dérive chaotique.

Cette bifurcation est nourrie de **boucles rétroactives**. Ainsi le réchauffement climatique global entraîne la fonte de pergélisol. Celle-ci s'accompagne d'émissions de méthane et de dioxyde de carbone. En retour, ces gaz à effet de serre se répandent dans l'atmosphère, d'où une intensification

du réchauffement climatique et de là une accélération de la fonte de pergélisol. Et ainsi de suite. La boucle rétroactive est ici dite positive, ce qui signifie qu'elle amplifie le phénomène de départ, le réchauffement climatique. Autre exemple de boucle rétroactive positive : le réchauffement climatique est un des facteurs de développement de zones mortes dans les mers et océans ; l'oxygène est absent ou quasi-absent de ces zones mortes et les archées méthanogènes (émettrices de méthane) y prolifèrent ; d'où ici aussi un effet retour sur le climat.

A la source de la bifurcation en cours du système bio-Terre, se trouve une *émergence* au sein du Monde du vivant : l'apparition d'Homo-sapiens dont le mode d'activité transforme ce système. Cette transformation ne cesse de s'accélérer, notamment depuis deux siècles, plus encore depuis le milieu du XXe siècle. La bifurcation actuelle du système bio-Terre est géologiquement fulgurante. Ce qui en émergera dans les quelques décennies à venir, qui plus est au-delà, est imprévisible.

## 2<sup>e</sup> partie

# L'hypothèse de l'éon Anthropozoïque

## I. Éons, ères, périodes...

Les géologues découpent l'histoire de la Terre en quatre éons : l'Hadéen (éon des enfers), l'Archéen (éon du commencement, de l'origine), le Protérozoïque (éon d'avant les animaux) et le Phanérozoïque (éon des animaux visibles). Les éons sont divisés en ères, lesquelles sont à leur tour divisées en périodes, puis celles-ci en époques, etc.

Les éons	Au commencement
Hadéen	Naissance de la Terre 4,55 milliards d'années
Archéen	Fin du Grand bombardement tardif 3,8 milliards d'années
Protérozoïque	Grand événement d'oxygénation 2,45 à 2,2 milliards d'années
Phanérozoïque	Explosion cambrienne 541 à 520 millions d'années

## II. L'Hadéen et l'Archéen

### 1. Instabilité

La Terre s'est formée il y a environ 4,55 milliards d'années. S'ouvrit alors le premier éon, l'Hadéen, éon des enfers, dont le nom renvoie à une planète Terre dont l'intérieur est bien plus chaud que de nos jours et dont la trajectoire croise celles d'une multitude d'objets divers du tout jeune système solaire. Ainsi, de 4,1 milliards à 3,8 milliards d'années, un bouleversement au sein du système solaire propulsa vers le centre de celui-ci un très grand nombre de comètes issues de la ceinture de Kuiper (dont la distance au soleil est plusieurs dizaines de fois supérieure à celle de la Terre au soleil). Une conséquence fut un gigantesque bombardement météorique de la surface de la Terre, le Grand bombardement tardif.

## 2. Vers l'apparition du vivant

À l'issue du Grand bombardement tardif s'ouvrit le deuxième éon, l'Archéen. La surface terrestre était enfin durablement stabilisée, grâce à une réduction de l'énergie interne de la Terre et à un espace interplanétaire bien moins encombré. Toutefois, l'activité volcanique était intense. Cette dernière émettait du dioxyde de carbone en très grande quantité auquel s'ajoutait de l'oxysulfure de carbone (COS), gaz à effet de serre extrêmement puissant, d'où un climat très chaud malgré un rayonnement solaire inférieur de 30 % au rayonnement actuel. Enfin, un océan couvrait quasiment l'ensemble de la surface de la Terre. Les conditions de l'apparition et du développement de la vie étaient réunies.

## 3. Un climat très chaud

Durant l'Archéen le taux de dioxyde de carbone amorça une longue décrue, en raison d'une baisse de l'activité volcanique et d'une captation de ce dioxyde par les cyanobactéries, auxquelles viendra s'ajouter une captation du dioxyde de carbone par érosion chimique des silicates des sols des premiers continents, formés vers 2,9 milliards d'années. Cependant, jusqu'à la fin de l'Archéen, il y a 2,45 milliards d'années, la température terrestre resta élevée (ou quasiment toujours élevée), au moins entre 30°C et 50°C, car le méthane produit par des archées méthanogènes, apparues il y a au moins 3,5 milliards d'années, avait pris le relais du dioxyde de carbone manquant. Ainsi le premier rôle déterminant du Monde du vivant sur le climat a été joué par des archées méthanogènes. Au même moment, dans les océans des cyanobactéries, apparues elles aussi il y a au moins 3,5 milliards d'années, émettaient de l'oxygène, grâce à la photosynthèse. Mais durant des centaines de millions d'années, et jusqu'à la fin de l'Archéen, cela n'eut pas d'impact sur le climat, car l'oxygène produit était pour l'essentiel capté par l'oxydation de roches océaniques.

## 4. Le premier stade du système bio-Terre

Avec la formation des premiers continents, il y a 2,9 milliards d'années, les cinq composantes du système bio-Terre étaient en place et interagissaient. Ce système était donc né. Il entra dans son premier stade. Dès lors le climat était largement déterminé par les quatre autres composantes :

- au sein du **Monde du vivant** (qui alors était exclusivement marin), les archées méthanogènes entretenaient un climat particulièrement chaud, tandis que les cyanobactéries absorbaient du dioxyde de carbone (par photo-synthèse), ce qui atténuait le caractère très chaud du climat ;
- au sein des **océans**, des roches absorbaient l'oxygène produit par les cyanobactéries, ce qui assurait la survie des archées méthanogènes (pour lesquelles l'oxygène est toxique), aussi par photosynthèse les cyanobactéries capturaient du ;
- quant aux **sols continentaux**, ils captaient du dioxyde de carbone ;
- enfin, la composition de l'**atmosphère** jouait bien sûr un rôle central dans le système climatique.

Réciproquement, le climat agissait sur les quatre autres composantes du système bio-Terre. Le climat et ses pluies déterminaient l'intensité de l'érosion des **sols continentaux** et l'intensité de la captation de dioxyde de carbone de l'atmosphère par ces mêmes sols. Ils influençaient donc le taux de dioxyde de carbone de l'**atmosphère**. Par ricochet ils influençaient le taux de dioxyde de carbone dans les **océans** (lequel est lié au taux de dioxyde de carbone de l'atmosphère) et de là



l'acidité des océans (voir Annexe 2), laquelle impacte le **vivant**. Vivant qui était par ailleurs directement soumis à l'influence du principal paramètre climatique, la température.

### III De l'Archéen au Protérozoïque

A la fin de l'Archéen, dès lors que le travail d'oxydation des roches océaniques fut achevé, se déclencha le Grand événement d'oxygénation, qui occasionna une métamorphose du Monde du vivant, un bouleversement du climat et une bifurcation du système bio-Terre. L'oxygène généré par les cyanobactéries se répandit dans l'océan et l'atmosphère. Dans l'océan, il intoxiqua mortellement la plupart des archées méthanogènes. Dans l'atmosphère, il réduisit la durée de vie du méthane. Il s'en suivit une forte baisse du taux de méthane dans l'atmosphère. En outre, l'oxysulfure de carbone, autre gaz à effet de serre, a été éliminé de l'atmosphère par l'oxygène. D'où au final un refroidissement global qui déboucha sur la première glaciation majeure, la glaciation huronienne.

Par ailleurs, le Grand événement d'oxygénation a ouvert la voie à la diversification et au développement de nouveaux organismes vivants, en premier lieu des eucaryotes dotés d'un système respiratoire qui capte de l'oxygène et rejette du dioxyde de carbone. Cette nouvelle composante du Monde du vivant constitue une étape majeure de l'évolution.

Le Grand événement d'oxygénation eut donc pour conséquence un nouvel état de chaque composante du système bio-Terre : le **Monde du vivant** (intoxication des archées méthanogène et déploiement des eucaryotes), l'**atmosphère** (oxygénation, chute du taux de méthane, disparition de l'oxysulfure de carbone), le **climat** (refroidissement), les **sols continentaux** (diminution des pluies et de là ralentissement de l'érosion, hausse de l'albédo en raison de l'apparition de calottes glacières), l'**océan** (oxygénation, modification des courants marins)

Un nouvel état du système bio-Terre avait pris forme. Chacune de ses composantes et les interactions entre celles-ci avaient subi des changements profonds. De nouvelles évolutions, le plus souvent relativement lentes, allaient se déployer. Le système bio-Terre était passé de l'éon Archéen à l'éon Protérozoïque.

#### Taux d'oxygène

A la fin du Grand événement d'oxygénation, le taux d'oxygène dans l'atmosphère n'avait opéré qu'une première étape de sa progression. Il est estimé qu'il était situé entre 5 % et 18 % de sa valeur actuelle.

#### Les Eucaryotes

Le Monde du vivant est classiquement divisé en six règnes. Quatre d'entre eux constituent les eucaryotes : les animaux, les végétaux, les champignons et les protistes. Les deux autres constituent les procaryotes : les archées et les bactéries. Les eucaryotes et les procaryotes sont parfois appelés les deux « empires du vivant ». Les cellules des eucaryotes sont pourvues d'un noyau, contrairement à celles des procaryotes. La plus ancienne trace d'eucaryote découverte par les humains date d'il y a 2,7 milliards d'années. Il s'agissait alors d'organismes unicellulaires. Ils prirent leur premier essor grâce au Grand événement d'oxygénation.

Procaryotes	Eucaryotes
Bactéries	Animaux
Archées	Végétaux (plantes et algues)
	Champignons
	Protistes

## IV Du Protérozoïque au Phanérozoïque

Le Protérozoïque prit fin avec le jaillissement de l'Explosion cambrienne, il y a 541 millions d'années. Selon Jean Vannier, directeur de recherche au CNRS: « *L'Explosion Cambrienne désigne l'apparition soudaine à l'échelle des temps géologiques d'anatomies entièrement nouvelles qui préfigurent déjà les grands groupes d'animaux actuels. Cet événement évolutif sans précédent, attesté par de nombreuses données paléontologiques et moléculaires, marque un tournant décisif dans l'évolution de la vie sur notre planète.* »<sup>ii</sup> S'ouvrit alors le Phanérozoïque. Cette approche des géologues met l'accent sur l'évolution du monde animal : zoïque vient d'un terme grec signifiant « de l'animal ». L'éon Protérozoïque signifie étymologiquement l'éon des premiers animaux (lesquels apparurent à la toute fin de cet éon qui dura près de deux milliards d'années). L'éon Phanérozoïque signifie étymologiquement celui des animaux visibles (par contraste avec les animaux du Protérozoïque qui étaient, sauf exceptions, de très petite taille).

Du point de vue de la pensée du complexe et du système bio-Terre, le passage entre le Protérozoïque et le Phanérozoïque ne se réalisa pas en un million d'année ni même sur le seul temps de l'explosion cambrienne, mais sur une durée de près de 200 millions d'années. Au départ il y a bien l'explosion cambrienne, de 541 millions à 520 millions d'années avant nos jours. A l'arrivée il y a la colonisation des continents par des plantes de grandes tailles ou plus exactement par des écosystèmes où plantes, animaux, champignons, bactéries, archées, protistes et virus sont interdépendants. Cette colonisation, qui s'effectua durant la période du Dévonien (419 millions à 359 millions d'années avant nos jours) modifia profondément les échanges de carbone entre l'atmosphère, le vivant, les sols continentaux et les océans, et plus généralement les interactions entre les cinq composantes du système bio-Terre, nous y reviendrons ci-dessous. Dès lors, la bifurcation vers le nouvel éon était achevée, et durant près de 360 millions d'années le Monde du vivant a conservé une forme générale relativement stable, organisée selon des lois d'équilibres naturelles, au sein et entre des écosystèmes qui intègrent des virus, des organismes unicellulaires, des champignons, des végétaux et des animaux, écosystèmes que nous qualifierons d'écosystèmes phanérozoïques. Certes, des évolutions du vivant se poursuivirent et il y eut plusieurs extinctions massives. Mais ces dernières ne se traduisirent guère par des bifurcations de premier ordre du Monde du vivant et du système bio-Terre, mais furent suivies du retour d'une organisation en écosystème phanérozoïques. Elles ne marquèrent donc pas un changement d'éon. Toutefois, deux d'entre elles correspondent aux changements d'ère du Phanérozoïque.

<b>Éon Phanérozoïque</b>		
<b>Nouvelle classification</b>	<b>Ancienne classification</b>	<b>Débuts</b>
Ère du Paléozoïque (anciens animaux)	Ère primaire	541 millions d'années Explosion cambrienne
Ère du Mésozoïque (animaux intermédiaires)	Ère secondaire	252,2 millions d'années Grande extinction
Ère du Cénozoïque (nouveaux animaux)	Ères tertiaire et quaternaire	66 millions d'années Grande extinction

L'ère du Cénozoïque est la réunion des ères tertiaire et quaternaire de l'ancienne classification. Selon l'ancienne classification, l'ère tertiaire s'arrêtait il y a 2,6 millions d'années, date où s'ouvrait l'ère quaternaire. Dans la nouvelle classification, le Quaternaire s'ouvre toujours il y a 2,6 millions d'années, mais son statut est maintenant celui d'une période, la dernière et troisième période du Cénozoïque.

### **Le Dévonien et la colonisation des continents**

Située entre 419 millions et 358,9 millions d'années avant nos jours, la période du Dévonien a connu un événement majeur, la colonisation des continents par les plantes vasculaires - c'est-à-dire les plantes qui possèdent racines, vaisseaux et sèves, notamment des fougères et des arbres dont les premiers spécimens apparurent au début du Dévonien. Cette colonisation fut aussi le fait d'animaux, dont la diversité était issue de l'explosion cambrienne. Finalement, il s'agissait d'une colonisation par des écosystèmes d'un genre nouveau et d'une complexité inédite. Cette colonisation - précédée de celles par divers espèces vivantes telles que des bactéries, des lichens, etc. - se fit progressivement. En ce qui concerne les plantes, il y eut tout d'abord celles de petite taille, puis des fougères géantes et enfin des arbres. Les effets furent majeurs sur la composition de l'atmosphère, sur l'érosion des sols et sur le climat. Les océans furent aussi impactés :

- les cours d'eau emportent à la mer une part importante de la matière issues de l'érosion des sols ;
- tout changement climatique se traduit par un changement de la température des océans et des modifications de courants marins ;
- la baisse du taux de CO<sub>2</sub> de l'atmosphère se traduit par une réduction de l'acidité des mers. Etc.

Sur le climat, deux effets opposés s'exprimèrent. Le premier, une chute du taux de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) dans l'atmosphère. En effet, en se développant le tapis végétal consomme du CO<sub>2</sub> pour se nourrir de son carbone et, de plus, favorise une érosion chimique des roches qui elle aussi consomme du CO<sub>2</sub>. Durant le Dévonien, en approximativement 60 millions d'années, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a été divisé par trois. Il est tombé de 3000ppm à 1000ppm<sup>4</sup>. Une forte baisse des températures aurait donc dû se produire à la surface de la

---

4. ppm : parties par million, en nombre de molécules. Un taux de dioxyde de carbone de 3000ppm signifie que parmi un million de molécules d'air sec (les molécules de vapeur d'eau ne sont pas prises en compte) se trouvent 3000 molécules de dioxyde de carbone.

Terre. Ce serait sans compter sur le second effet sur le climat de la colonisation des continents : le développement de la végétation a progressivement changé l'albédo. Au début du Dévonien, les continents avaient la couleur claire d'un sol désertique, qui réfléchit 30 % du rayonnement lumineux<sup>iii</sup>. A la fin, ils avaient la couleur foncée d'une couverture forestière, qui ne réfléchit que 10 % du rayonnement lumineux<sup>iv</sup>. Il a ainsi été mis un terme à un important albédo. Finalement, hormis durant quelques événements climatiques relativement bref, la période du Dévonien a connu un climat plutôt stable. La diminution du taux de dioxyde de carbone (refroidissement) a été compensé par une plus grande absorption de l'énergie solaire par la surface des continents (réchauffement). Puis la fin du Dévonien a été provoquée par le ralentissement du changement de couleur des sols, alors que le tapis végétal continuait à nettement s'étoffer. Si bien que la réflexion de la lumière ne diminuait plus que lentement, pendant que les forêts pompaient toujours abondamment le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Le facteur de réchauffement s'effaçait nettement devant le facteur de refroidissement. Il s'en est suivi un refroidissement climatique global.

## V Du Phanérozoïque à l'Anthropozoïque ?

### 1. Les bifurcations entre éons

Éon, ère, période, époque... ont été conçus par les géologues, sur la base de la stratigraphie. Nous sommes là dans le champ d'une discipline scientifique. La pensée du complexe se nourrit de la production de disciplines scientifiques, mais ne se réduit pas à l'une d'entre elles, ni à la simple juxtaposition de celles-ci. Appliquée au système bio-Terre, elle engendre une approche de l'histoire de la Terre où les passages d'un éon à un autre, d'une ère à une autre, d'une période à une autre ou d'une époque à une autre, correspondent à des bifurcations de ce système, et ne sont pas fondées sur les seules données issues de la géologie et de la stratigraphie. Ces bifurcations sont plus ou moins importantes et chacune ouvre un état inédit du système bio-Terre. Les plus conséquentes consacrent les passages entre éons.

Durant l'Archéen des populations d'organismes unicellulaires ont émergé, se sont développées et ont constitué un premier stade du Monde du vivant dont la transformation incessante mènera jusqu'à nos jours.

Le Protérozoïque s'ouvrit avec la Grande oxygénation, qui s'étendit sur 230 millions d'années, et l'intoxication d'une large part du vivant, puis sera caractérisé par le développement d'organismes eucaryotes multicellulaires, parmi lesquels des espèces consommant de l'oxygène à l'aide d'un système respiratoire.

Enfin, le Phanérozoïque, après une bifurcation qui s'étendit sur 182 millions d'années, sera caractérisé par un Monde du vivant organisé en écosystèmes phanérozoïque.

Depuis l'Archéen, chaque nouvel éon est caractérisé par l'émergence de nouveaux organismes vivants qui « *marquent un tournant décisif dans l'évolution de la vie sur notre planète* »<sup>5</sup>, transforme profondément et de façon irréversible le Monde du vivant et plus largement le système bio-Terre.

---

5. Propos de Jean Vannier, directeur de recherche au CNRS, au sujet de l'Explosion cambrienne. Confer bibliographie.

## 2. L'hypothèse de l'éon Anthropozoïque

Au sein de l'Union internationale des sciences géologiques (UISG), depuis 2012 la Commission internationale de stratigraphie étudie la proposition de reconnaître l'entrée dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. Cela fait débat. Une controverse est ouverte au sein de la discipline de la géologie. Du point de vue de la complexité, par contre, selon nous la question n'appelle pas débat : le système bio-Terre entre bien dans une nouvelle époque. Il entre même dans une nouvelle période et une nouvelle ère, nous y reviendrons. La seule interrogation nous semble être : le système bio-Terre est-il entre-t-il dans un nouvel éon ? Autrement dit, l'apparition de l'espèce humaine marque-t-elle « *un tournant décisif dans l'évolution de la vie sur notre planète* » qui se traduit par une modification profonde et durable du Monde du vivant et une bifurcation majeure du système bio-Terre ? Répondre à cette interrogation serait prématuré. En effet, à ce jour les connaissances scientifiques laissent ouverts différents scénarios, dont notamment trois que abordons brièvement :

- L'humanité pourrait finalement n'avoir qu'une existence éphémère, et disparaître au cours de la bifurcation du système bio-Terre qu'elle a elle-même enclenchée. Cette bifurcation pourrait alors déboucher sur une nouvelle ère (sans changement d'éon) où des écosystèmes, ne présentant pas de rupture avec les écosystèmes phanérozoïques, couvriraient à nouveau quasiment l'ensemble de la planète.

- L'humanité n'aurait qu'une existence éphémère, mais néanmoins la bifurcation en cours du système bio-Terre prendrait une ampleur de premier ordre et déboucher sur un Monde du vivant profondément et durablement nouveau. Un nouvel éon, post-humain, serait alors ouvert.

- Un tout autre scénario est celui d'un nouvel éon où l'humanité perdurerait avec une population nombreuse qui marquerait un tournant décisif dans l'évolution de la vie et jouerait un rôle central tout au long du nouvel éon.

Dès aujourd'hui, le Monde du vivant n'est plus organisés en écosystème phanérozoïques couvrant librement l'ensemble de la surface de la planète. Tout d'abord, des animaux et des végétaux sont de plus en plus massivement sortis des écosystèmes pour être soumis à l'humanité. Ensuite, les écosystèmes phanérozoïques ont accès à des surfaces de plus en plus restreintes, l'Homo-sapiens s'étant appropriés environ la moitié des surfaces continentales. Enfin, ces écosystèmes sont soumis à des contraintes inédites : extinction d'espèces, sinon réduction de leur population, notamment de prédateurs du haut de la chaîne alimentaire ; pollutions diverses...

Si l'hypothèse du troisième scénario se vérifiait, alors conformément aux noms donnés aux précédents éons, centrés sur les animaux, il conviendrait de parler de l'éon Anthropozoïque<sup>6</sup> (celui des animaux humains). L'Anthropocène (terme issu des mots grecs « anthropos », être humain, et « kainos », récent) en constituerait alors la première ère.

## 3. L'ère de l'Anthropocène

Durant les derniers douze mille ans, avec l'émergence de l'agriculture (élevage et culture) suivie de l'apparition des villes, chacune des cinq composantes du système bio-Terre a été modifiée du fait des activités humaines ; certaines - le vivant et les sols continentaux - profondément. Ces

---

<sup>6</sup> Le terme Anthropozoïque n'est pas un néologisme. Introduit en 1873 par le géologue italien Antonio Stoppani, il est aujourd'hui très peu utilisé et nomme la période du quaternaire.

modifications se poursuivent et s'accroissent de façon exponentielle. **Le vivant** subit une extinction massive, de plus en plus rapide, et les territoires de l'ensemble des espèces sont bouleversés. **Les sols continentaux** ont été largement remodelés (déforestation, agriculture, urbanisation...). **La composition de l'atmosphère** est déstabilisée. Tout au long des 66 millions d'années du Cénozoïque (ère qui conclut le Phanérozoïque), le taux de CO<sub>2</sub> poursuivait une tendance longue et lente à la baisse (avec des fluctuations de faible amplitude) ; il subit aujourd'hui un mouvement à la hausse, fulgurant sur l'échelle des temps géologiques. **Les océans** sont soumis à de fortes perturbations : acidification, zones mortes, pollutions diverses... Enfin, **le climat** amorce un réchauffement global particulièrement rapide. Le tout interagit de plus en plus intensément. Le système bio-Terre entre dans l'ère de l'Anthropocène.

#### **4. Une nouvelle composante du vivant**

L'hypothèse de l'éon Anthropozoïque, que nous ferons nôtre dans la suite de notre texte, est celle d'une composante du vivant nouvelle et singulière, l'Homo-sapiens, qui modifie profondément et de façon irréversible le Monde du vivant et l'ensemble du système bio-Terre. Il faut ici préciser ce en quoi cet acteur est singulier. Tout d'abord, l'Homo-sapiens est la seule espèce vivante qui présente certains caractères d'une société planétaire unique ; cela depuis quelques siècles et tout en conservant une certaine diversité en son sein. En effet, aucune espèce n'a développé à l'échelle planétaire un mode et un niveau d'échanges, d'interactions et d'interdépendances entre l'ensemble des individus qui la compose, qui soient similaires à ceux des humains. Une caractéristique de ce système social global est sa dynamique d'évolution et d'accumulation/assimilation/destruction (matérielle et immatérielle). De plus, chaque être humain est potentiellement capable de se représenter l'ensemble des humains, d'avoir conscience des périls qu'ils ont à affronter en commun et de se mobiliser à l'échelle planétaire. Enfin, l'Homo-sapiens possède une créativité, une capacité d'adaptation et une puissance d'action sur le système bio-Terre tout à fait inédites.

#### **5. Fulgurance**

Depuis la constitution du système bio-Terre, c'est-à-dire depuis la formation des premiers continents, il y a 2,9 milliards d'années, les bifurcations d'un éon à un autre sont des processus. Jusqu'à l'émergence de l'humanité, elles se déroulaient sur environ 200 millions d'années. Qu'en sera-t-il cette fois-ci ? La bifurcation vers l'éon Anthropozoïque débuta avec la naissance de l'agriculture, il y a 12 mille ans. Puis la révolution industrielle a ouvert une série d'accélération. Enfin, depuis le milieu du XXe siècle les changements sont fulgurants. L'histoire du système bio-Terre se précipite et se traduit par une réduction extrême des temps géologiques.

## 3<sup>e</sup> partie

### Libérer la complexité

Homo sapiens est apparu et s'est déployés dans le contexte du Quaternaire. Que sera son devenir alors que la bifurcation en cours du système bio-Terre le sort de ce contexte ? Le risque est grand qu'il sur-estime ses facultés et sous-estime sa fragilité. La bifurcation du système bio-Terre pourrait s'emballer et finalement occasionner la disparition de la plus grande part de l'humanité et le repli des survivants dans les zones les moins inhabitables. Un autre scénario pourrait être le refuge de l'humanité sous des bulles géantes, en raison d'un environnement où les êtres humains ne peuvent survivre (par exemple en raison d'un excès d'oxygène dans l'atmosphère ou au contraire d'un manque d'oxygène). Bien d'autres scénarios de survie de l'humanité à un emballement de la bifurcation en cours peuvent être envisager. Au-delà, la disparition de tout humain de la surface terrestre n'est pas à exclure. Plus de 99 % des espèces vivantes apparues sur Terre depuis 3,8 milliards d'années ont disparu. Le sort des Dinosaures, anéantis il y a 66 millions d'années, n'a rien d'exceptionnel. Le monde d'aujourd'hui prépare-t-il la fin de l'espèce humaine ? Le système bio-Terre est des plus complexes. Son histoire montre que dès lors qu'il est déstabilisé par une évolution majeure issue du Monde du vivant, ce qui prévaut, c'est l'inédit et l'imprévisible.

Au sein du système bio-Terre, l'humanité est elle-même d'une complexité extrême, sujette à l'inédit et à l'imprévisible. Une bifurcation dont elle est aujourd'hui l'objet s'accélère, ouvre le champ des possibles. L'hypothèse selon laquelle l'humanité parviendrait à une profonde auto-transformation et à un agir efficace sur le système bio-Terre n'est pas à exclure.

#### I. Géo-ingénierie

Le dos au mur, l'humanité se doit d'agir sur le devenir du système bio-Terre, mais avec humilité et lucidité, contrairement aux promoteurs de projets de géo-ingénierie visant une modification de la composition chimique de l'atmosphère ou des océans à coups de diffusions massives de produits chimiques. Personne n'est en capacité de connaître la réaction du Monde du vivant et plus largement la réaction du système bio-Terre que cela engendrerait. Cette fuite en avant favoriserait les basculements les plus imprévisibles. Les conséquences sur l'espèce humaine seraient tout aussi imprévisibles.

La promotion de tels projets s'inscrit dans un moment où l'humanité se soumet aveuglement à une succession de plus en plus rapide d'innovations technologiques.

#### II. Obscurantisme scientifique

Tout aussi redoutable, un repli sur une certaine connaissance scientifique, voire pseudo scientifique, laisse dans l'ombre la complexité et les dimensions imprévisibles des émergences et des bifurcations, que ce soient celles du système bio-Terre ou celles de l'humanité. Il s'en suit un aveuglement et une perte de lucidité qui nous amène à parler d'obscurantisme scientifique.

Ainsi, les écosystèmes complexes des océans, négligés par les promoteurs de la géo-ingénierie, le sont tout autant par les scénarios pour le XXI<sup>e</sup> siècle publiés dans le V<sup>e</sup> rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) (2013-2014). Or il est vraisemblable que les bouleversements de ces écosystèmes impacteront le climat, possiblement fortement, hormis peut-être si était rapidement mis fin aux émissions de gaz à effet de serre et plus généralement aux perturbations anthropiques des océans.

Quant à la complexité humaine, bien que présente et déterminante dans chaque individu, tout comme au niveau des groupes sociaux ou à l'échelle de l'humanité, elle est étrangement absente de nombreuses études à prétention scientifique.

Plus largement, l'obscurantisme scientifique a déposé son voile sur les esprits. Aujourd'hui, il accroît son emprise sur l'humanité par une quantification et une mathématisation de plus en plus envahissante du non quantifiable. Les savoirs, les rapports sociaux et les activités humaines en sont affectés. Ainsi, une quantification – sous la forme d'objectifs chiffrés et d'évaluations chiffrées – participe à une déshumanisation du travail (perte de valeurs et de sens), que ce soit celui des fonctionnaires, des agents des services publics ou d'un grand nombre de salariés d'entreprises privées. Cette quantification sert en outre une implication intégrale dans le travail, une soumission de la personne physique, mentale et morale du travailleur, dans le cadre d'une large autonomie accordée pour atteindre des objectifs chiffrés<sup>v</sup>.

Lever le voile obscurantiste et laisser libre cours à la complexité humaine est une clé pour relever les défis de la complexité de la bifurcation du système bio-Terre. Toute diffusion auprès des populations humaines de la conscience de la complexité de cette bifurcation, de son imprévisibilité, de son irréversibilité et des menaces qu'elle présente pour l'humanité, sans dans le même temps diffuser une représentation de l'humanité qui prend en compte la complexité de cette dernière, son imprévisibilité et sa puissante capacité de changement et de bifurcation, serait une démarche périlleuse, susceptible de précipiter l'humanité dans l'angoisse et finalement dans la paralysie inhérente à la croyance aux théories d'un effondrement inéluctable.

### **III. XXI<sup>e</sup> siècle, l'humanité entre en bifurcation**

Depuis son apparition, il y a au moins 315 mille ans<sup>vi</sup>, Homo-sapiens évolue culturellement, socialement et physiquement. Durant le XXI<sup>e</sup> siècle, cette évolution a été importante et rapide. Grâce à la médecine et à une évolution des modes et conditions de vie, la mortalité infantile a fortement baissé, plus généralement la durée de vie s'est allongée et les douleurs physiques ont été atténuées et ont perdu leur caractère de quasi-omniprésence. Toutefois, il faut noter, sur chacun de ces points, de fortes inégalités entre les pays riches et dominants et le reste de l'humanité. A l'opposé de ces progrès, auxquels s'ajoute notamment la progression de l'alphabétisation, il y a l'horreur et le traumatisme de la seconde guerre mondiale avec ses camps d'extermination et le largage d'une bombe atomique sur Hiroshima puis sur Nagasaki. Il y a de plus la violence et l'échec du soviétisme. Il faut aussi noter, évitant toute évaluation positive ou négative :

- le passage d'une humanité essentiellement rurale et agricole à une humanité majoritairement urbaine ;
- une première révolution de la communication et de l'information (radio, télévision, téléphone) et le déploiement massif des transports (automobile, avion...) ;



- la photographie, qui, dans la mesure de l'accès effectif à celle-ci, modifie le rapport que chaque humain entretient avec sa propre histoire, avec lui-même, avec ses proches... ;
- le cinéma et la musique enregistrée ;
- l'éclairage électrique, qui modifie le nature profonde de la nuit ;
- la machine à laver ;
- la pilule et, dans de nombreux pays, la légalisation et la médicalisation de l'Interruption volontaire de grossesse (IVG).

En outre, l'individualisme, la société de consommation et dans une certaine mesure celle des loisirs, se sont répandus dans les pays les plus riches et au sein d'une classe minoritaire dans les autres pays. Il faut aussi considérer les transformations des structures sociales, économiques et géopolitiques. La liste des changements n'est ici pas exhaustive.

Finalement, durant le XXe siècle, les sociétés et les cultures, les rapports de genre et la sexualité, les rapports au corps, à la mort, au religieux, à l'espace et au temps, au passé et au futur, à la vie, à la nuit et au jour, à l'humanité prise dans son ensemble et dans sa diversité... ont été l'objet d'une profonde transformation.

#### **IV. Accélération**

En ce début du XXIe siècle, cette métamorphose s'accélère. La seconde moitié du XXe siècle a vu l'émergence des outils numériques. Depuis lors, ceux-ci évoluent constamment, sont de plus en plus puissants et ouvrent la voie à des modes inédits de communication et de socialisation, d'influence, de domination et de totalitarisme ou au contraire d'émancipation et de démocratie... En ce début de XXIe siècle l'impact est devenu considérable. Demain il sera colossal. Sur les individus, leurs rapports au temps, aux autres, à la connaissance, sur la vie intérieure et les conditions de la pensée... Sur l'organisation du travail et plus largement sur l'ensemble des aspects de la vie en société. D'autant que ces outils numériques interagissent avec d'autres révolution technologiques, telles que celle des nanotechnologies, et se situent dans le contexte de prise de conscience – certes aujourd'hui encore trop confuse – de la bifurcation du système bio-Terre et de la menace post-humaniste, le tout avec en toile de fond le déclin de la domination de l'Occident. Le système hyper complexe que constitue l'humanité est entré en bifurcation. Le devenir de celle-ci est largement imprévisible. Personne n'est en capacité de savoir quelles en seront les futures émergences et ce que deviendra l'humanité. Tout ira très vite. Dans cinquante ans, l'humanité aura emprunté des voies inimaginées aujourd'hui.

#### **V. La force du sens**

La bifurcation du système bio-Terre provoquée par l'humanité pourrait être dramatique pour celle-ci, voire lui être fatale. Une mobilisation générale, planétaire et durable est indispensable. Son caractère d'urgence s'accroît. Nous entrons dans une période historique où un engagement individuel et collectif porteur de sens se présente à l'ensemble des humains : relever les défis planétaires et, pour ce faire, opérer une transformation de l'humanité, des relations en son sein, de ses relations avec le système bio-Terre, de ses activités, de ses modes de vie et de pensée... En particulier, il s'agit d'ériger un nouveau groupe d'appartenance pour les être humains, un groupe global, planétaire, à côté des groupes d'appartenance préexistants : familles, réseaux divers,

nations... Un groupe uni, organisé et conscient de lui même, de sa puissance et de sa fragilité, mobilisé pour la pérennité d'un système bio-Terre hospitalier, pour le bien vivre et l'épanouissement durables de toutes ses populations.

Cette profonde transformation de l'humanité inclura nécessairement une transformation des femmes et des hommes qui la composent. Chaque être humain est complexe. Chaque être humain est susceptible de bifurcations majeures, dès lors que le contexte dans lequel il se situe et que les contraintes qui s'exercent sur lui se modifient. L'aventure de toute vie humaine est imprévisible, tout comme celle de l'humanité. Face aux périls inédits des temps présents, chaque être humain est appelé à s'engager, à écrire sa propre histoire et à contribuer à celle, collective, de l'humanité.

Fin

## Addenda

### Point sur la bifurcation du système bio-Terre en ce début de XXI<sup>e</sup> siècle

#### I. Dioxyde de carbone et climat

Au cours du dernier million d'année, le taux de dioxyde de carbone variait entre 180 et 300 parties par million (ppm). Il est aujourd'hui, en 2020, supérieur à 400ppm. Durant les cent dernières années, il a fait un bond de plus de 100ppm. La situation est encore plus marquée pour le méthane. Au cours du dernier million d'années, le taux de méthane dans l'atmosphère variait entre 0,4 et 0,7ppm. Il est aujourd'hui aux environs de 1,9ppm. Quant à la température à proximité de la surface terrestre, elle a progressé d'environ 1°C en un siècle. Pour l'essentiel, l'augmentation de ces trois paramètres s'est produite durant les quatre dernières décennies. Ainsi, depuis 1974 le taux de CO<sub>2</sub> a effectué un bond d'au moins 70ppm. Sa progression ne cesse de s'accélérer. Depuis le début du XXI<sup>e</sup> siècle, elle dépasse en moyenne les 2ppm par an, et depuis 2011 les 2,5ppm. Soit un rythme fulgurant de 250ppm par siècle. Quant à la température terrestre, le record de sa moyenne annuelle (établie depuis l'année 1860) a été battu durant trois années consécutives, 2014, 2015 et 2016 ; puis les années 2017, 2018 et 2019 ont toutes connu une température moyenne supérieure à celle de 2014.

Cependant, la question du climat - indissociable de celle du système bio-Terre - est extrêmement complexe et ne peut être cernée par ces trois indicateurs : taux de dioxyde de carbone, taux de méthane, température moyenne à proximité de la surface terrestre. Nous y reviendrons.

#### II. Les forêts dévastées

Les forêts constituent le territoire de nombreuses espèces de chacun des six genres du vivant : animaux, plantes, champignons, bactéries, archées, protistes. Depuis 2500 ans, une large part d'entre elles a été détruite pour l'agriculture, l'exploitation du bois (chauffage, énergie, papier, bâtiment...), l'urbanisation, l'industrialisation et les réseaux de transports. Quant à celles qui n'ont pas été détruites, le plus souvent leur écosystème a été perturbé et appauvri par la chasse, par les pollutions de l'air ou de l'eau, par des espèces invasives ou des épidémies. Au XX<sup>e</sup> siècle en Europe, le champignon microscopique *Ophiostoma ulmi* (*sensu lato*) a occasionné la quasi disparition des ormes. En ce début de XXI<sup>e</sup> siècle, toujours en Europe, depuis 2008 le *Chalara fraxinea*, champignon microscopique d'Asie introduit par négligence humaine, se propage et décime la population des frênes. De nos jours, une perturbation supplémentaire - le réchauffement climatique - aggrave encore et toujours plus la situation des forêts. Dans l'hémisphère Nord, La

multiplication et l'ampleur des incendies dont elles sont la proie en constituent la face la plus visible.

### **III. Biodiversité**

L'effondrement en cours de la biodiversité est couramment qualifiée de « sixième grande extinction massive ». La focale est mise sur la disparition de nombreuses espèces vivantes et sur la perte que cela représente pour l'humanité en termes de « services écosystémiques ». Dans tous les domaines, le Monde du vivant met à la disposition des humains des richesses inestimables : médecine et pharmacopée, agriculture, assainissement de l'air et de l'eau, travaux de recherche basé sur le mimétisme d'organismes vivants.... Aujourd'hui, l'extinction massive et extrêmement rapide d'espèces vivantes a pour conséquence une réduction tout aussi massive et rapide de ces richesses. Cependant, le bouleversement du Monde du vivant provoquée par l'humanité n'est pas seulement une question d'extinction d'espèces vivantes et de perte de richesse. En effet, l'histoire de la Terre montre que les grands basculements du Monde du vivant présentent deux faces : ce qui disparaît, mais aussi ce qui apparaît. Le nouveau, l'inédit en constitue un aspect essentiel. Ce nouveau, cet inédit est, au demeurant, largement imprévisible. L'apparition ou le développement d'organismes vivants et d'écosystèmes néfastes au bien être de l'humanité, voire menaçant la survie de l'espèce humaine, pourrait demain devenir le principal enjeu du bouleversement actuel du Monde du vivant. D'où la nécessité de changer le point de vue et de porter autant l'attention sur ce qui émergera durant ce bouleversement, que sur ce qui disparaîtra : ce qui renvoie à la nécessité de ne pas négliger la part imprévisible de la bifurcation actuelle du système bio-Terre.

### **IV. Nitrates**

Une multitudes de déchets - issus de l'agriculture, de l'industrie, des transports et des villes - dont la toxicité est reconnue ou suspectée, sont présents dans les moindres recoins de la planète et diffusés au sein même du vivant. Parmi ceux-ci, citons les nitrates, les pesticides, les hormones, les perturbateurs endocriniens, les microparticules de plastique, les nano-particules.

Les nitrates sont particulièrement présents dans les cours d'eau et dans de nombreuses zones maritimes plus ou moins proches des côtes. Ils sont en outre désormais présents dans les grands réservoirs d'eaux douces souterraines de la planète<sup>vii</sup>. Le plus souvent, la pollution de ces réservoirs dépasse le seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 50 milligramme de nitrate par litre. Au-delà, selon l'OMS, l'eau n'est plus considérée comme potable. Certes, une réduction de la présence de nitrates sous ce seuil est de plus en plus souvent réalisée avant la mise en circulation de l'eau dans les canalisations qui alimentent les habitations humaines. Par contre, l'ensemble du vivant ne bénéficie pas de cette précaution. Si bien que la pollution par ce produit toxique se diffuse au sein du vivant. Elle est responsable de la mort d'animaux et de leur disparition de nombreux cours d'eau. Elle occasionne aussi des déformations physiques d'animaux ou/et des freins à leur développement. Elle est enfin responsable de phénomènes d'eutrophisation, c'est à dire d'un excès de nutriment dans des zones fluviales ou maritimes, avec pour conséquence une invasion d'algues, d'où la naissance de zones mortes où le développement d'archée méthanogènes contribue au réchauffement climatique.

L'humanité possède les moyens de remédier à cette situation. Ainsi, l'agriculture biologique n'utilise et ne rejette pas de nitrate et, selon une étude de la FAO (Organisation des Nations-unies sur l'agriculture et l'alimentation)<sup>viii</sup> publiée en 2007, sa généralisation est possible. De plus, cette généralisation réduirait notablement d'autres pollutions (pesticides...) et améliorerait durablement l'alimentation de l'humanité.

## **V. Perturbateurs endocriniens**

Les perturbateurs endocriniens, responsables de dysfonctionnements du système hormonal, sont disséminés par les humains (intrants agricoles, produits pharmaceutiques...) et sont présents partout dans le système bio-Terre : les eaux (eaux douces et eaux de mer), l'atmosphère, les sols et le vivant. Pour des organismes complexes tels que les poissons ou les mammifères (dont les humains), cette dissémination peut être particulièrement conséquente. Au sein de populations animales diverses, elle est responsable de la féminisation de mâles, de retards de développement (y compris intellectuel chez les humains) et d'une augmentation de la stérilité.

Ici aussi, la généralisation d'une agriculture de type biologique, qui n'utilise pas de pesticide chimique, constituerait une part conséquente de la solution.

## **VI. Microparticules de plastique**

Transportées jusqu'à la mer par les cours d'eau ou issues de la désagrégation en mer d'objets, notamment de sacs, les microparticules de plastique seraient présentes dans 88 % des eaux de surface des océans<sup>ix</sup>. Elles entrent dans la chaîne alimentaire et les écosystèmes des océans et sont présentes dans les fonds marins. En ce qui concerne leur impact sur le vivant en général et sur la santé humaine en particulier, peu d'études ont été menées. Il s'agit d'un sujet de recherche quasiment vierge. L'usage des plastiques est apparu durant les années 1950. Depuis il n'a cessé de s'amplifier et de s'étendre à toujours plus d'objets de consommation. Ces dernières décennies, il a pris une dimension titanesque. A l'échelle mondiale, il poursuit une croissance exponentielle qui accompagne la diffusion de la société de consommation. L'usure des pneus (en caoutchouc de synthèse) et le lavage des vêtements (synthétique ou contenant des composés synthétiques) sont deux sources substantielles de microparticules de plastiques présentes dans les océans<sup>x</sup>. Au final, les conséquences sur de nombreuses espèces et sur les écosystèmes pourraient être importantes, notamment dans les mers et les océans. Cependant, les espèces terrestres ne sont pas hors de danger. Les humains en particulier. Ces derniers absorbent des quantités de plus en plus grandes de ces microparticules de plastiques. En effet, elles sont toujours plus abondantes dans certaines composantes de l'alimentation humaine, en particulier les poissons, les fruits de mer et le sel de mer. Elles sont aussi présentes dans la plupart des « eaux du robinet » qualifiées de potable, plus particulièrement aux États-Unis<sup>xi</sup>. Certes, la quantité de microparticules de plastique présente dans ces eaux, est actuellement encore faible, mais l'eau ainsi polluée est bue en très grande quantité.

## **VII. Champignons, l'effet boomerang**

Des champignons et de nombreuses plantes sont en association symbiotique, sans laquelle ni l'un ni l'autre ne peuvent survivre. Par ailleurs, les champignons sont au cœur de la dégradation des résidus végétaux. Ils jouent un rôle majeur dans les écosystèmes. Dans le même temps, des

champignons sont responsables de maladies qui peuvent être particulièrement redoutables, nous l'avons vu à propos des ormes et des frênes sur le continent européen. Il est montré que ces maladies peuvent déboucher sur la disparition d'espèces végétales ou animales avec une probabilité bien plus importante que ce n'est le cas pour les maladies dues à des virus ou des bactéries. De plus, concevoir des remèdes sans endommager les cellules de leurs victimes, plantes ou animaux, peut parfois être particulièrement difficile, en raison de la proximité de leurs cellules avec celles de leurs victimes : champignons, végétaux et animaux sont des eucaryotes.

Or l'humanité modifie les conditions de vie du règne des champignons, ce qui entraîne une évolution de ce dernier avec pour conséquence une augmentation de son impact en termes de maladies infectieuses et d'érosion de la biodiversité. Cette situation est résumée dans un article<sup>xii</sup> de la revue Nature du 12 avril 2012 : « *Au cours des deux dernières décennies, on a observé une augmentation du nombre de maladies infectieuses virulentes. Tant chez les animaux que chez les plantes, un nombre sans précédent de maladies fongiques (dues à un champignon) ont récemment causé certaines mortalités et extinctions les plus graves jamais observées chez les espèces sauvages, et mettent en péril la sécurité alimentaire. L'activité humaine intensifie la dispersion des maladies fongiques en modifiant les milieux naturels et en créant ainsi de nouvelles possibilités d'évolution. Nous soutenons que les infections fongiques naissantes entraîneront une érosion croissante de la biodiversité, avec des implications plus larges pour la santé humaine et des écosystèmes, à moins que des mesures ne soient prises pour renforcer la biosécurité dans le monde entier.* ». Par ailleurs, dans cet article est noté une accentuation des émissions de dioxyde de carbone des plantes victimes de maladies fongiques. Il est complété par une publication<sup>xiii</sup> de la revue Science datée du 18 mai 2018. Cette dernière alerte sur les menaces pour la santé humaine et la sécurité alimentaire présentées par l'émergence à l'échelle mondiale de résistances aux substances antifongiques. La première cause est un usage massif de fongicides par les agriculteurs. Il en résulte un redoutable effet boomerang, une résistance à ces fongicides de champignons pathogènes pour des cultures, mais aussi une résistance de champignons pathogènes pour les humains. Ce qui rappelle certaines bactéries pathogènes pour les humains, devenues résistantes aux antibiotiques.

Le règne des champignons, soumis à un environnement en évolution rapide, est lui même en évolution rapide. Vu la dangerosité des champignons pathogènes pour les plantes et les animaux, dont les humains, l'humanité a ici un défi à relever. Le règne des champignons reste peu connu : la recherche qui lui est destinée a longtemps été marginale ; elle reste encore aujourd'hui trop peu soutenue.

## **VIII. Océans, la rupture des équilibres**

Les océans se réchauffent, s'acidifient, se chargent en nitrates, en microparticules de plastiques et en déchets de toutes sortes. Le système global des courants océaniques connaît ses premières perturbations. La pêche intensive de surface ou proche de la surface a perturbé et perturbe toujours plus les écosystèmes marins. Depuis les années 1990, s'est ajoutée la pêche en eaux profondes qui pénètre jusqu'à plus de mille mètres sous la surface. Or, les océans hébergent un nombre astronomique d'organismes vivants. Ils constituent le principal régulateur de la composition chimique de l'atmosphère et du climat. En leur sein, les équilibres et les cycles, tout à la fois

chimiques, biologiques et thermiques, en place depuis le début du Quaternaire, sont aujourd'hui perturbés, et leur devenir reste largement imprévisible.

Les océans et notamment la vie dans les océans présentent de nombreuses questions restées sans réponse scientifique ; par exemple les écosystèmes des zones profondes des océans restent très peu connus. Dans la situation inédite créée par les humains, le devenir de l'ensemble du vivant marin est grandement imprévisible.

### **Les bactéries SAR11 et les virus marins**

Les bactéries SAR11 ont été identifiées à la toute fin des années 1980. Elles ont donné lieu à une première publication scientifique en 1990<sup>xiv</sup>. Quant aux *virus marins*, leur existence était connue antérieurement, depuis le début des années 1950, mais leur étude n'a vraiment pu se développer que durant les années 1990, grâce à de nouvelles techniques<sup>xv</sup>. Les bactéries SAR11 représentent plus du quart des organismes monocellulaires des eaux de mer. Elles produisent l'essentiel des composés organiques et l'essentiel du CO<sub>2</sub> consommés par des algues qui, par photosynthèse, vont à leur tour produire environ la moitié de l'oxygène relâché par les océans dans l'atmosphère. En 2014, certaines souches qui produisent du méthane ont été découvertes<sup>xvi</sup>. Jusqu'alors, les seuls organismes vivants méthanogènes connus étaient des archées pour qui l'oxygène est toxique. La découverte des bactéries SAR11 méthanogènes a résolu une énigme, celle de l'origine de la présence abondante de méthane dans les eaux de surface océanique situées loin des côtes et donc en milieu océanique oxygéné.

Grâce à un certain nombre de caractéristiques originales, dont une extrême petite taille, les bactéries SAR11 sont particulièrement résistantes et dominantes. Toutefois, le développement de leur population rencontre une limite, car elles seraient victimes de l'attitude agressive de *virus marins*, parmi lesquels le virus HTVC010P<sup>xvii xviii</sup>. Cependant, l'étude des bactéries SAR11 est à ce jour très incomplète et de nombreuses questions restent sans réponse.

Que deviendrait le climat et le Monde du vivant si les interactions entre les bactéries SAR11 et *virus marins* venait à être modifiée ? Par exemple si, après mutation, des virus provoquaient la disparition d'une part notable des bactéries SAR11 ? Plus largement, que deviendrait le climat et le Monde du vivant si la population des bactéries SAR11 productrice de CH<sub>4</sub> ou de CO<sub>2</sub> et indirectement d'O<sub>2</sub> venait à fortement croître ou décroître en raison de perturbations dues à l'activité humaine ?

Les mutations de bactéries et de virus se diffusent à une vitesse sans commune mesure avec celle d'organismes tels que les mammifères, dès lors que ces mutations sont particulièrement adaptées aux évolutions du milieu. Sur le même sujet, Janine Guespin-Michel souligne « la rapidité » et « l'inventivité » avec lesquels « les bactéries sont capables d'acquérir des caractéristiques phénotypiques<sup>7</sup> nouvelles. »<sup>xix</sup>.

---

7 Le phénotype est l'ensemble des traits observables d'un organisme vivant, expressions combinées de facteurs génétiques et environnementaux.

Au sein d'un univers complexe tel que le Monde du vivant, en particulier en cas de situation inédite, l'imprévisibilité des émergences oblige à beaucoup d'humilité et à accepter notre incapacité à prévoir le scénario du futur qui sera effectivement suivi. Toutefois, cette incapacité à prévoir ne doit pas entraîner une absence de prise en compte des risques tels que celui d'une brusque évolution des bactéries SAR11 et de leurs populations. Suite à un tel événement, la bifurcation en cours du système bio-Terre connaîtrait une évolution dont, au stade actuel des connaissances scientifiques, nous ne pourrions prévoir ni le contenu ni l'ampleur. Il est donc indispensable de convoquer le principe de précaution et d'éviter - ou de mettre un terme à - toute intervention ou activité humaine qui nourrit ce risque.

L'imprévisibilité des évolutions des océans dans les décennies et les siècles à venir ne repose pas uniquement sur le vivant qu'ils hébergent. D'autres questions restent à ce jour largement sans réponse. Le méthane produit au cours du temps par des archées méthanogènes et stocké dans des hydrates des fonds océaniques seront-ils en partie relâchés. Si oui, quand et en quelle quantité ? Faute de réponse à ces questions, ici aussi il conviendrait de convoquer le principe de précaution. D'autant que, en 2010, une étude de l'International Arctic Research Center (IARC) de l'université de Fairbanks en Alaska, montrait que les fuites du méthane emmagasiné sous la forme d'hydrates sous les 2 millions de km<sup>2</sup> de l'océan Arctique étaient déjà enclenchées et « pourraient avoir à l'avenir un effet dramatique sur le réchauffement climatique » (Shakhova & al., 2010<sup>xx</sup>).

Selon une communication<sup>xxi</sup> du 2 février 2006 du département de géologie et de génie géologique de l'université de Laval au Québec « *On estime aujourd'hui que les hydrates de méthane des fonds océaniques contiennent deux fois plus en équivalent carbone que la totalité des gisements de gaz naturel, de pétrole et de charbon connus mondialement.* » Selon Gilles Ramstein<sup>xxii</sup> <sup>8</sup>, juin 2015, « *les estimations récentes ont proposé entre 0,5 et 2,5 x 10<sup>12</sup> tonnes pour le contenu (en méthane) des sédiments (marins)* » ; or « *La masse de méthane actuellement dans l'atmosphère atteint désormais près de 5 milliards de tonnes* », donc entre 100 et 500 fois moins que la masse de méthane piégée dans les fonds océaniques. Toutefois, cette masse est située dans le sous-sol marin jusqu'à une profondeur d'une centaine de mètres sous l'eau et semble ne pouvoir être relâchée que progressivement sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. En outre, lors de la remontée vers la surface des océans, une grande part du méthane serait vraisemblablement transformée en dioxyde de carbone. Une faible portion du stock de méthane est ainsi susceptible de se rejoindre l'atmosphère au cours du XXI<sup>e</sup> siècle. Son évaluation nécessite des études supplémentaires : " *Des énormes quantités de méthane pourraient être « relarguées » dans l'atmosphère en cas de réchauffement important des zones boréales ou des océans. Ce type de phénomène n'est actuellement pas pris en compte dans les modèles du climat car les processus de déstabilisation et l'ampleur des dégazages de méthane sont encore trop mal connus.* " (Masson-Delmotte, 2011<sup>xxiii</sup>, p. 99-100).

## **IX. Perméabilité et vulnérabilité des humains**

Nitrates, microparticules et nanoparticules, hormones, perturbateurs endocriniens..., ces substances polluent toujours plus les sols, l'atmosphère et les océans, et colonisent aujourd'hui le Monde du

---

8 p.134.



vivant : le corps des humains ne fait pas exception. Cancers, baisse de la fertilité, réduction du QI, nervosité et troubles comportementaux de l'enfance... en sont des conséquences. Celles-ci sont révélées par des études épidémiologique<sup>xxiv</sup> ou encore par la connaissance d'organes humains tels que la thyroïde dont le rôle déterminant dans le développement du cerveau<sup>xxv</sup>. Ces pollutions sont récentes, cinq ou six décennies pour les plus anciennes, et ne cessent de s'amplifier. Elles n'ont pas encore exprimé tous leurs effets. Parmi ceux-ci, certains pourraient se transmettre génétiquement, de génération en génération, voire ne s'exprimer que sur les générations descendantes. D'autres s'accroissent d'année en année.

Selon de nombreuses études, les perturbateurs endocriniens sont responsables ou tout au moins coresponsables d'une dégradation du sperme humain<sup>xxvi</sup> ; notamment dans les pays occidentaux où l'usage des pesticides agricoles est particulièrement important depuis des décennies. Dans les pays occidentaux, en quarante ans le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme humain a été divisé par deux. De plus, le taux de spermatozoïdes dont la morphologie est normale et la mobilité intacte, a lui aussi nettement baissé. Selon les résultats d'une recherche publiée en 2012<sup>xxvii</sup>, en seulement seize ans, en France les hommes de 35 ans ont subi « *une diminution significative et continue de la concentration du sperme atteignant 32,2 %* ». La concentration moyenne est passé de 73,6 millions de spermatozoïdes par millilitre (ml) de sperme en 1989 à 49,9 millions/ml en 2005. Durant cette période, chaque année la baisse était à peu près identique à celle de l'année précédente. Selon cette même étude, simultanément le pourcentage de spermatozoïdes ayant une morphologie normale a diminué d'un tiers, passant de 60,9 % à 39,2 %. Si bien que le score de 2005 équivaut à 33 millions de spermatozoïdes par millilitre, au lieu de 73,6 millions. Or, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2010) le seuil de fertilité est de 15 millions/ml. Finalement, si la dégradation du sperme se poursuivait, la France pourrait rapidement rencontrer un problème massif d'infertilité des hommes. Cette situation n'est pas spécifique à la France, avec toutefois des différences selon les pays. Cependant, l'infertilité des hommes ne signifierait pas nécessairement la fin de l'humanité. Des recherches scientifiques en cours pourraient déboucher sur des remèdes à un tel scénario. Il y a par exemple les recherches sur la technique de la fécondation in vitro des ovules, grâce aux cellules mères des spermatozoïdes (situées dans les glandes génitales des hommes), et donc en se passant de spermatozoïde naturel. Cependant, cette technique – dont la fiabilité à venir n'est pas assurée - pourrait être onéreuse et réservée aux populations les plus riches.

## **X. Instabilité du vivant**

A la diversité et la complexité du monde des bactéries, des archées, des protistes et des virus, se sont ajoutées, dès le Protérozoïque et plus encore lors du Phanérozoïque, celles des organismes pluricellulaires. Au final, les différentes complexités sont en relation et interagissent dans un ensemble hyper complexe. Ainsi, chaque mammifère héberge des milliards de bactéries, d'archées et de virus - dont il est entièrement dépendant – qui jouent un rôle majeur dans la digestion, dans le système immunitaire ou encore dans l'apparition, le développement ou la prévention de cancers, d'inflammations, d'abcès... Cet ensemble hyper complexe que constitue le Monde du vivant est soumis à des conditions inédites. Il est pris dans un tourbillon de plus en plus puissant. L'histoire du vivant montre que nous avons là les conditions favorables à l'apparition de phénomènes émergents,

inédits et imprévisibles. La sensibilité et la créativité du vivant pourraient donner lieu à des émergences qui bouleverseraient rapidement l'ensemble du Monde du vivant. En effet, les évolutions peuvent être particulièrement rapides chez des organismes unicellulaires telles que les bactéries - plus encore chez les virus. Tout d'abord, les mutations bactériennes sont fréquentes. Ensuite, toute innovation génétique au sein d'une population bactérienne peut se propager à grande vitesse par échange de gènes entre individus, y compris entre individus d'espèces différentes<sup>xxviii</sup>. Enfin, la vitesse de reproduction des organismes unicellulaires peut être très élevée.

## **XI. Choc frontal**

De la complexité globale du vivant, vieille de centaines de millions d'années, a émergé l'humanité, système social inédit hyper complexe. Nous assistons aujourd'hui au choc frontal entre la complexité du système bio-Terre telle qu'elle était avant l'apparition de l'Homo sapiens, d'un côté, et, de l'autre, la complexité de l'humanité. Ce choc a débuté il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Il a pris de l'ampleur avec la naissance de l'agriculture, il y a douze mille ans, puis avec les déforestations massives. Un nouveau seuil a été franchi avec la révolution industrielle, il y a deux siècles. Enfin, il y a 50 ou 60 ans, se sont propagés à grande échelle l'agriculture industrielle et ses intrants (pesticides, nitrates, etc.), l'automobile, l'usage de plastiques... Depuis lors, la puissance du choc s'amplifie de façon exponentielle.

# Annexe 1. Les paramètres de Milankovitch

## L'excentricité

La Terre effectue le tour du soleil en un an, selon une orbite en forme d'ellipse. Cette ellipse varie tout en restant constamment presque circulaire. Il arrive même qu'elle soit circulaire. Le premier des paramètres orbitaux de la Terre est l'excentricité de son orbite, laquelle mesure la distance de celle-ci avec un cercle. L'excentricité d'une ellipse est un nombre situé entre 0 et 1. Si elle est égale à zéro, alors l'ellipse est un cercle. L'excentricité de l'orbite de la Terre varie au cours des temps entre 0 et 0,06. Sa valeur actuelle est de 0,016. Il est heureux que cette excentricité soit constamment très faible. Avec une excentricité élevée, la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre varierait fortement au cours d'une même année, au détriment de la vie.

## L'obliquité

Le second paramètre orbital de la Terre est l'obliquité. C'est un angle. L'orbite de la Terre est située dans un plan, appelé le plan orbital. La Terre possède un axe, c'est la droite autour de laquelle elle tourne chaque jour. Cet axe rejoint les deux pôles. L'obliquité est l'angle entre l'axe de la Terre et une perpendiculaire à son plan orbital. Si l'axe de la Terre était perpendiculaire au plan orbital de la Terre, alors l'obliquité serait de  $0^\circ$ . L'obliquité de la Terre varie, mais peu. Elle reste constamment située entre  $22^\circ$  et  $24,5^\circ$ . L'obliquité est la cause des saisons alternée entre hémisphère Nord et hémisphère Sud. Si l'obliquité était nulle, les cycles météorologiques annuels ne dépendraient que de l'excentricité et ne différencieraient pas le Nord et le Sud.

## La précession

Le soleil est l'un des deux foyers de l'orbite ellipsoïdale de la Terre, si bien que selon la période de l'année la Terre est plus ou moins proche du soleil. En ce XXI<sup>e</sup> siècle, la Terre est au plus proche du soleil (périhélie) au début du mois de janvier. Elle passe par son point le plus éloigné (aphélie) début juillet.

La place du périhélie sur le calendrier varie selon un cycle d'une durée située entre 19 000 et 23 000 ans. Dans dix mille ans, le périhélie devrait se situer vers le début du mois de juillet, et non plus début janvier. Les variations de cette position sur le calendrier influencent le climat terrestre. Ainsi, et c'est le cas depuis plus de mille ans, les hivers et les étés de l'hémisphère nord sont atténués par cette influence, puisque durant l'hiver du Nord, la Terre est plus proche du soleil, et durant l'été du Nord elle est plus éloignée. Tandis que dans l'hémisphère sud, c'est le contraire, les saisons sont accentuées.

La position du périhélie sur le calendrier est liée au troisième paramètre de Milankovitch, appelé la précession ou précession des équinoxes. L'axe de la Terre tourne autour d'un cône dont l'axe est perpendiculaire au plan orbital de la Terre, sur une durée qui varie entre 19 000 et 23 000 ans. La précession donne la position de l'axe de la Terre sur ce cône.

## Annexe 2. L'acidification des océans

Entre les océans et l'atmosphère s'effectuent des échanges de dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ ). De nos jours, une partie des rejets anthropiques de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est ainsi absorbée par les océans. Par ailleurs, la présence de  $\text{CO}_2$  dans l'eau de mer s'accompagne de la présence d'acide carbonique  $\text{H}_2\text{CO}_3$ . Plus précisément, la plupart des molécules de  $\text{CO}_2$  restent stable dans l'eau, tandis qu'une faible part d'entre elles fusionnent avec une molécule d'eau ( $\text{H}_2\text{O}$ ) et donne une molécule d'acide carbonique ( $\text{H}_2\text{CO}_3$ ). C'est pourquoi, de nos jours et en raison d'une augmentation du taux de dioxyde de carbone, l'acidité des océans augmente. Cette acidité fait peser une menace de disparition sur la grande part des coraux, d'autant que se développent d'autres perturbations, modifie la croissance de certaines espèces de poissons, etc., avec des conséquences irréversibles sur les écosystèmes marins.

## Remerciements

Mes remerciements vont tout d'abord à Bertrand Bocquet, mon directeur de thèse, et Jean-Claude Ruano Borbalan, mon codirecteur, pour leur confiance et leur soutien, pour leur ouverture d'esprit indissociable de la vivacité de leur esprit critique.

Mes remerciements vont ensuite à Valérie Lilette, docteur en anthropologie, pour m'avoir convaincu de mettre par écrit et d'approfondir ma réflexion sur les évolutions du vivant et leur impact sur le système-Terre, puis pour ses questionnements qui ont permis des enrichissements essentiels.

Mes échanges avec Anne-Frédérique Paul Antoine, enseignante-chercheuse en biologie, et Janine Guespin-Michel, professeure honoraire de microbiologie, m'interdisent de prétendre être un autodidacte dans le domaine de la biologie. En outre, les collaborations avec Janine Guespin-Michel, depuis dix ans, et la lecture d'ouvrages dont elle est l'auteure ont motivé la place centrale donnée à la pensée du complexe.

**i Influence des variations d'insolation sur le climat global : modèles climatiques**

Auteur : Gilles Delaygue. Université de Chicago, Département de Géosciences  
Publié sur le site de l'école normale supérieure de Lyon. Mai 2001.

<http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/variations-insolation.xml>

**ii L'explosion Cambrienne**

Auteur : Jean Vannier. CNRS. Université Claude-Bernard, Lyon I.  
Publié par le site du CNRS.

<http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/decouv/articles/chap2/vannier.html>

**iii Climat, modéliser pour comprendre et anticiper**

Comité de rédaction : Pascale Braconnot (IPSL), Christophe Cassou (CERFACS),  
Serge Planton (CNRM, Centre de recherche de Météo-France, Didier Swingedouw  
(IPSL), Laurent Terray (CERFACS), Aurore Voldoire (CNRM).

Réaliser dans le cadre du projet MISSTERRE qui rassemble les les laboratoires  
français de modélisation climatique (CNRM, Centre de recherche de Météo-  
France, Cerfacs et IPSL).

Publié sur le site de Météo-France : <http://www.meteofrance.fr/publications/nos-collections/climat/climat-modeliser-pour-comprendre-et-anticiper>

**iv Climat, modéliser pour comprendre et anticiper**

Comité de rédaction : Pascale Braconnot (IPSL), Christophe Cassou (CERFACS),  
Serge Planton (CNRM, Centre de recherche de Météo-France, Didier Swingedouw  
(IPSL), Laurent Terray (CERFACS), Aurore Voldoire (CNRM).

Réaliser dans le cadre du projet MISSTERRE qui rassemble les les laboratoires  
français de modélisation climatique (CNRM, Centre de recherche de Météo-  
France, Cerfacs et IPSL).

Publié sur le site de Météo-France : <http://www.meteofrance.fr/publications/nos-collections/climat/climat-modeliser-pour-comprendre-et-anticiper>

**v La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012 - 2014)**

Auteur : Alain Supiot

Editions Fayard. Poids et mesures du monde. Juin 2015.

**vi The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age**

Auteur : Daniel Richter, Rainer Grün, Renaud Joannes-Boyau, Teresa E. Steele, Fethi  
Amani, Mathieu Rué, Paul Fernandes, Jean-Paul Raynal, Denis Geraads,  
Abdelouahed Ben-Ncer, Jean-Jacques Hublin et Shannon P. McPherron.

Publié par la revue scientifique Nature, numéro 546. 8 juin 2017.

**vii La pollution par les nitrates**

Site du CNRS. Octobre 2017

[http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/07\\_pollution.htm](http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/07_pollution.htm)

**viii Conférence internationale sur l'agriculture biologique et la sécurité alimentaire**

Conférence organisée par la FAO par l'intermédiaire du Groupe de travail  
interdépartemental sur l'agriculture biologique, en association avec l'Associazione  
italiana agricoltura biologica, le CIHEAM, le FIBL, l'IFOAM, RAFI-USA, The  
Third World Network (TWN), le Worldwatch Institute et le WWF.

Rome, 03 - 05 mai 2007

Consultable sur le site Internet de la FAO :  
[http://www.fao.org/organicag/ofs/index\\_fr.htm](http://www.fao.org/organicag/ofs/index_fr.htm)

**ix Plastic debris in the open ocean**

Auteur : Andrés Cózar, Fidel Echevarría, J. Ignacio González-Gordillo, Xabier Irigoien, Bárbara Úbeda, Santiago Hernández-León, Álvaro T. Palma, Sandra Navarro, Juan García-de-Lomas, Andrea Ruiz, María L. Fernández-de-Puelles and Carlos M. Duarte.

Publié par le journal de l'académie des sciences des Etats-Unis d'Amérique (PNAS). Vol.111. N°28. 30 juin 2014.

**x Primary microplastics in the ocean. A Global Evaluation of Sources**

Auteurs : Julien Boucher, Damien Friot.

Rapport de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN). 22 février 2017.

**xi Invisibles. The plastic inside us**

Auteurs : Chris Tyree et Dan Morrison

Publié sur le site orb one world one story. 2017.

**xii Emerging fungal threats to animal, plant and ecosystem health**

Auteurs : Matthew C Fisher, Daniel A Henk, Cherie Briggs, John S Brownstein, Lawrence C Madoff, Sarah L McCraw, Sarah Gurr

Publié par la revue Nature. Avril 2012

**xiii Worldwide emergence of resistance to antifungal drugs challenges human health and food security**

Auteurs : Matthew C. Fisher, Nichola J. Hawkins, Dominique Sanglard, Sarah J. Gurr

Publié par la revue Science. 18 mai 2018. Vol. 360, pp. 739-742.

**xiv Genetic diversity in Sargasso Sea bacterioplankton**

Auteurs : Stephen J. Giovannoni, Theresa B. Britschgi, Craig L. Moyer et Katharine G. Field

Publié par la revue Nature, le 3 mai 1990

**xv Les virus: un élément important de la boucle microbienne dans l'Océan**

Compte-rendu de la réunion du JSC / WCRP - Le Cap, Afrique du Sud, 16-20 mars 1998.

Publié par La Lettre du Changement global. Emanation du CNFCG (Comité national français du changement global), en relation avec l'Académie Numéro. 9 avril 1999. Site du CNRS.

**xvi SAR11, oceans' most abundant organism, has ability to create methane**

Auteur : Mark Floyd. Source : une publication de Angel White et Steve Giovannoni. Publié par Oregon State University (OSU). News and Research Communications. 7 juillet 2014.

**xvii Abundant SAR11 viruses in the ocean**

Auteurs : Yanlin Zhao, Ben Temperton, J. Cameron Thrash, Michael S. Schwalbach, Kevin L. Vergin, Zachary C. Landry, Mark Ellisman, Tom Deerinck, Matthew B. Sullivan et Stephen J. Giovannoni  
Publié par la revue *Nature*, 494, pages 357–360. 21 février 2013.

xviii **SAR11 viruses and defensive host strains**

Auteurs : Selina Våge, Julia E. Storesund et T. Frede Thingstad  
Publié par la revue *Nature* 499. 25 juillet 2013.

xix **Les bactéries, leur monde et nous**

Auteure : Janine Guespin-Michel, Université de Rouen.  
Édition Dunod, Paris, 2011.

xx **Extensive Methane Venting to the Atmosphere from Sediments of the East Siberian Arctic Shelf**

Shakova N., Semiletov I., Salyuk A., Yusupov V., Kosmach D., Gustafsson Ô.  
*Science*. 5 mai 2010.

xxi **Les hydrates de méthane : une réserve énergétique énorme, mais une bombe écologique en puissance »**

2 février 2006. Consultable sur le site Internet :

<http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/hydrates.methane.htm>.

xxii **Voyage à travers les climats de la Terre**

Auteur : Gilles Ramstein. Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). France.  
Éditions Odile Jacob. Juin 2015.

xxiii **Climat : le vrai et la faux**

Auteure : Valérie Masson Delmotte. Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement. CEA-Saclay.  
Editions le Pommier. Paris. 2011.

xxiv **Prenatal Exposure to Nonpersistent Endocrine Disruptors and Behavior in Boys at 3 and 5 Years**

Auteurs : Claire Philippat, Dorothy Nakiwala, Antonia M. Calafat, Jérémie Botton, Maria De Agostini, Barbara Heude, Rémy Slama, and the EDEN Mother–Child Study Group.  
Publié par *Environmental Health Perspectives*. Septembre 2017.

xxv **Thyroid Hormone Signaling Acts as a Neurogenic Switch by Repressing Sox2 in the Adult Neural Stem Cell Niche**

Auteurs: Alejandra López-Juárez, Sylvie Remaud, Zahra Hassani, Pascale Jolivet, Jacqueline Pierre Simons, Thomas Sontag, Kazuaki Yoshikawa, Jack Price, Ghislaine Morvan-Dubois, Barbara A. Demeneix.  
Publié par la revue scientifique *Cell Stem Cell*. Volume 10, Issue 5, p531–543, 4 May 2012.

xxvi **Semen quality trends in French regions are consistent with a global change in environmental exposure**



Auteur : Jacques De Mouzon, Matthieu Rolland, Sarah Gorla, Véréne Wagner, Perrine De Crouy-Chanel, Annabel Rigou, et Dominique Royère  
Publié par la revue scientifique REPRODUCTION, The Journal of the Society for Reproduction and Fertility. 24 février 2014

xxvii **Decline in semen concentration and morphology in a sample of 26 609 men close to general population between 1989 and 2005 in France**  
M. Rolland, J. Le Moal, V. Wagner, D. Royère, J. De Mouzon  
*Human Reproduction*, Volume 28, Issue 2, 1 February 2013, Pages 462–470.

xxviii **Espèces de bactéries !**  
Auteure : Patricia Léveillé  
Publié sur le site de l'Institut national de recherche agronomique (INRA), INRA SCIENCE ET IMPACT. Publié le 18 mars 2010. Mis à jour le 13 mai 2013.