

Natural course of rotator cuff syndrome in a French working population

**J Bodin¹, C Ha², A Petit^{1,3}, A Descatha⁴, M Goldberg⁴,
A Leclerc⁴, Y Roquelaure^{1,3}**

¹ LUNAM University, University of Angers, Laboratory of Ergonomics and Epidemiology in Occupational health, Angers, France

² French Institute for Public Health Surveillance, Department of Occupational Health, Saint-Maurice, France

³ CHU Angers, Angers, France

⁴ University of Versailles St-Quentin, UMRS 1018, Population-Based Epidemiological Cohorts' Research Platform, Villejuif, France



PREMUS 2013 – Busan, Korea, 8-11 July 2013




Context: Rotator cuff syndrome

- Common upper-extremity musculoskeletal disorder (MSD) in the working population
- In France (2011), shoulder disorders represented 37% of MSD compensated as occupational diseases
- Prognosis of rotator cuff syndrome (RCS):
 - In general practice: 54% recovered after one year (Van Der Windt et al, 1996)
 - In industrial and services workers: 50% recovered after 10 months (Bonde et al, 2003)

Objectives

- To assess the persistence of RCS in workers several years after diagnosis
- And to study associations between the persistence of RCS and personal and work-related factors and change of exposure since baseline
- Using the data of the surveillance program for MSD in the French Pays de la Loire region



Methods

■ Baseline: 2002-2005

- Network of 83 occupational physicians (18% of OP of the region)
 - 3,710 workers randomly selected
 - **Self-administered Questionnaire**
 - Individual factors
 - Work-related factors (work organization, biomechanical and psychosocial factors)
 - **Physical examination**
- ## ■ Follow-up: 2007-2010
- **Physical examination**

Methods

■ Case definition

- Rotator cuff syndrome defined following the recommendations of the Criteria document for evaluating the work-relatedness of MSD¹

Case definition 2: rotator cuff syndrome, based on symptoms and physical examination signs

- Time rule:
- Symptoms present now or on at least 4 days during the last 7 days

AND

- Symptoms:
- At least intermittent pain in the shoulder region without paresthesias; pain worsened by active elevation movement of the upper arm as in scratching of the upper back

AND

- Signs:
- At least one of the following tests positive:
 - ▲ resisted shoulder abduction, external rotation, or internal rotation
 - ▲ resisted elbow flexion
 - ▲ painful arc on active upper arm elevation

¹Sluiter JK, Rest KM, Frings-Dresen MH. Criteria document for evaluating the work-relatedness of upper-extremity musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health. 2001;27 Suppl 1:1–102.


Methods

- Workers with RCS at baseline
- 3 groups
 - RCS recovery: workers without shoulder symptoms and RCS
 - Shoulder symptoms without clinically diagnosed RCS
 - No recovery RCS: workers with clinically diagnosed RCS


Statistical methods

- Associations between recurrence of RCS and
 - Baseline characteristics
 - Personal and work-related factors (organizational, biomechanical and psychosocial factors)
 - Follow-up characteristics
 - Change of physical load, postural load, psychological load and time constraints during the preceding 12 months
 - Separately for men and women
- Chi-square, Fisher and Mann-Withney tests


Results




Physical examination at follow-up among workers with RCS in 2002-2005



Characteristics at baseline according to health group in men




Characteristics at baseline according to health group in women



Characteristics at follow-up according to health group

■ Men



- No differences for psychological load and times constraints

■ Women: No differences

Discussion

- RCS clinically diagnosed by trained OPs
- Low follow-up rate
 - Only workers still at work considered
 - Unemployed people and retired people excluded
- Exposure data self-reported
- Extra-occupational physical activities and individual psychological factors not assessed

Conclusion

- High level of recovery from RCS
 - 62% for men and 51% for women
- Factors associated with no recovery:
 - Men: work-related factors
 - Women: personal factors
- It would be interesting to act on these factors to prevent them, and to identify workers in whom RCS might become chronic.

**Thank you for your
attention**

Working postures and biomechanical constraints


	Men				Women					
	Recovery RCS (n=48)		RCS without recovery (n=23)		p-value*	Recovery RCS (n=37)		RCS without recovery (n=26)	p-value*	
	n	%	n	%		n	%	n		
Working postures and biomechanical constraints										
High repetitiveness of tasks (≥ 4 h/day)	11	22.9	11	47.8	0.034	17	47.2	14	53.9	0.607
High perceived physical exertion†	13	27.7	13	56.5	0.019	9	24.3	5	19.2	0.632
Posture with the arms above the shoulder level (≥ 2h/day)	11	22.9	6	26.1	0.770	6	16.2	6	24.0	0.521**
Posture with the arms abducted (60° to 90°) (≥ 2h/day)	8	16.7	6	26.1	0.359**	8	21.6	7	28.0	0.565
Holding hand behind the trunk (≥ 2 h/day)	3	6.3	2	8.7	0.656**	4	10.8	3	12.0	1.000**
Biomechanical exposure‡					0.053					0.565
0	21	44.7	5	21.7		12	33.3	8	32.0	
1	16	34.0	7	30.4		11	30.6	5	20.0	
2-5	10	21.3	11	47.8		13	36.1	12	48.0	
Use of hand tools (≥ 2 h/day)	28	58.3	14	60.9	0.839	17	47.2	14	53.8	0.607
Use of vibrating hand tools (≥ 2 h/day)	11	22.9	9	39.1	0.155	4	10.8	0	0.0	0.136**
Pushing or pulling load (≥ 2 h/day)	11	22.9	7	31.8	0.429	3	8.1	5	19.2	0.257**
Working seated (≥ 4 h/day)	9	18.8	3	13.0	0.739**	21	56.8	9	34.6	0.083

RCS: rotator cuff syndrome.

* χ^2 test. **Fisher exact test. †Rating Perceived Exertion Borg scale ≥ 15 for men and ≥ 14 for women. ‡Included variables: high repetitiveness of tasks (≥ 4 h/day), high perceived physical exertion (≥ 15 for men and ≥ 14 for women), posture with the arms above the shoulder (≥ 2 h/day), posture with the arms abducted (60° to 90° , ≥ 2 h/day) and holding hand behind the trunk (≥ 2 h/day).


Work characteristics at follow-up according to health group in men

	Recovery RCS (n=48)	No recovery RCS (n=23)		p	
		n	%		
Job change in the same company	13	27.1	5	22.7	0.699
Company change	4	8.3	5	22.7	0.128



Work characteristics at follow-up according to health group in women

	Recovery RCS (n=37)		No recovery RCS (n=26)		p
	n	%	n	%	
Job change in the same company	7	18.9	9	34.6	0.159
Company change	6	16.2	0	0.0	0.038



Photo**1****Type de test**

Mouvement actif de circumduction de l'épaule, pour le syndrome de la coiffe des rotateurs dans le plan de l'omoplate

Position de départ du sujet

Debout avec les bras pendants, les pouces dirigés vers l'avant

Position de départ de l'examineur


Debout, face au sujet, il positionne les membres supérieurs du sujet à 30° en avant du plan frontal

Consigne donnée au sujet

« Levez les bras jusqu'à hauteur des épaules, tournez les paumes vers le haut et levez les bras jusqu'à ce que vos mains se touchent au-dessus de la tête »

Positif si

Douleur au cours du mouvement (entre 60 et 120° d'abduction)

**1**


Test de l'élévation active de l'épaule
1. abduction / rotation externe
Comparaison D / G

Photo	2
Type de test	Mouvement actif de l'épaule, pour le syndrome de la coiffe des rotateurs
Position de départ du sujet	Debout
Position de départ de l'examineur	Debout, derrière le sujet
Consigne donnée au sujet	<i>« Placez votre main derrière la tête et essayez de toucher le haut de l'omoplate du bout des doigts »</i>
Positif si	Douleur locale de l'épaule au cours ou à la fin du mouvement



2

Photo	3
Type de test	Mouvement actif de l'épaule pour le syndrome de la coiffe des rotateurs
Position de départ du sujet	Debout
Position de départ de l'examineur	Debout, derrière le sujet
Consigne donnée au sujet	<i>« Placez votre main derrière le dos et essayez de toucher le bas de votre autre omoplate du bout des doigts »</i>
Positif si	Douleur locale de l'épaule au cours ou à la fin du mouvement



Photo**4**

Mouvement actif de l'épaule pour le syndrome de la coiffe des rotateurs

Type de test

Debout

Position de départ du sujet

Debout, face au sujet

Position de départ de l'examineur*« Empaumez le sommet de votre autre épaule »***Consigne donnée au sujet**

Douleur locale de l'épaule au cours ou à la fin du mouvement

Positif si

4

Photo**5****Type de test**

Résistance isométrique pour le syndrome de la coiffe des rotateurs

Position de départ du sujet

Assis, avec le bras D en abduction de 10-20°

Position de départ de l'examineur

Debout à D du sujet. La main G stabilise le sommet de l'épaule, la main D appuie pour s'opposer à l'abduction du bras.

Consigne donnée au sujet*« Maintenez le bras dans cette position et résistez contre ma force »***Positif si**

Douleur locale de l'épaule (muscle supra-épineux / sus-épineux)



Photo**6****Type de test**

Résistance isométrique pour le syndrome de la coiffe des rotateurs

Position de départ du sujet

Assis, bras D contre le corps, coude D fléchi à 90°, poignet D en position neutre

Position de départ de l'examineur et réalisation du test

Debout à D du sujet. La main G contrôle la position du coude, la main D empaume la face dorsale de l'avant-bras D et appuie pour entraîner l'épaule en rotation interne

Consigne donnée au sujet*« Maintenez le coude contre votre corps et résistez contre ma force »***Positif si**

Douleur locale de l'épaule (muscle infra-épineux / sous-épineux)

**6**

Nom du test	Rotation interne contrariée de l'articulation gléno-humérale
Photo	7
Type de test	Résistance isométrique pour le syndrome de la coiffe des rotateurs
Position de départ du sujet	Assis, bras D contre le corps, coude D fléchi à 90°, poignet D en position neutre
Position de départ de l'examineur	Debout, face au sujet. La main G contrôle la position du coude, la main D empaume la face ventrale de l'avant-bras et appuie pour empêcher la rotation interne de l'épaule.
Consigne donnée au sujet	<i>« Maintenez le coude contre votre corps et résistez contre ma force »</i>
Positif si	Douleur locale de l'épaule (muscle sub-scapulaire / sous-scapulaire)



Photo**8****Type de test**

Résistance isométrique pour le syndrome de la coiffe des rotateurs

Position de départ du sujet

Assis, bras D à 90° d'antéflexion, avant-bras D en supination (paume vers le haut), coude D légèrement fléchi

Position de départ de l'examineur et réalisation du test

Debout à G du sujet. La main D stabilise l'articulation gléno-humérale, la main G empaume la face ventrale de l'avant-bras D et appuie pour étendre le coude

Consigne donnée au sujet*« Maintenez le bras dans cette position et résistez contre ma force »***Positif si**

Douleur locale au-dessus de l'insertion du tendon du biceps brachial

