



HAL
open science

Enseigner les nombres rationnels au cycle 3? Une proposition didactique

Claire Margolinas

► **To cite this version:**

Claire Margolinas. Enseigner les nombres rationnels au cycle 3? Une proposition didactique. Grand N, Revue de mathématiques, de sciences et technologie pour les maîtres de l'enseignement primaire, 2020, 106, pp.5-30. hal-02981512

HAL Id: hal-02981512

<https://hal.science/hal-02981512v1>

Submitted on 6 Dec 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

ENSEIGNER LES NOMBRES RATIONNELS AU CYCLE 3 ? UNE PROPOSITION DIDACTIQUE

Claire MARGOLINAS¹

Laboratoire ACTé, Université Clermont-Auvergne

INSPE Clermont-Auvergne, 36 av Jean-Jaurès, CS 20001, 63407 Chamalières CEDEX

Résumé : L'ingénierie de Guy Brousseau (Brousseau & Brousseau, 1987) sur les rationnels et les décimaux dans la scolarité obligatoire est le point de départ de ce travail. Le rationnel-mesure est introduit dans la première partie de cette ingénierie en deux temps, dont la première situation fondamentale est mise en scène dans des situations de désignation de l'épaisseur de feuilles de papiers. Les pratiques ordinaires d'enseignement des fractions (terme usuel) reposent, quant à elles exclusivement sur le fractionnement de l'unité. Dans cet article, nous décrivons une proposition didactique argumentée qui repose sur des bases assez similaires à celle de Brousseau & Brousseau, mais qui pourrait être plus compatible avec les instructions officielles des programmes de mathématiques.

Mots-clés: Nombre rationnel, partage, guide-âne, fraction, théorie des situations.

INTRODUCTION

1. Le contexte

L'ingénierie de Guy Brousseau (Brousseau & Brousseau, 1987) sur les rationnels et les décimaux dans la scolarité obligatoire a été, pour moi comme pour beaucoup d'autres chercheurs, un élément essentiel pour une compréhension de la théorie des situations didactiques et de l'ingénierie didactique. J'ai d'ailleurs analysé dans ma thèse les articulations de cette ingénierie (Margolinas, 1993).

Dans les années 1986-1987, j'ai eu aussi l'occasion d'enseigner à des adultes qui reprenaient des études à un niveau fin d'école primaire et passaient le Brevet des Collèges en trois ans en m'appuyant sur cette ingénierie. J'ai pu en éprouver en pratique la puissance sur les apprentissages de mes étudiants et aussi en comprendre mieux les subtilités en position d'enseignante. L'étude de cette ingénierie m'a en fait permis de mieux comprendre les rationnels eux-mêmes, et pas seulement leur enseignement.

Formatrice à l'IUFM puis l'ESPE, puis l'INSPE Clermont-Auvergne j'interviens depuis 2007 dans la formation des Professeurs des Écoles (PE). Dans ce cadre, nous devons prendre en compte les textes officiels et il n'est pas vraiment possible de trop s'écarter de ces cadres alors que nos étudiants doivent passer un concours ou bien être titularisés.

En 2019, intervenant dans la formation des Référents Mathématiques dans le cadre de la mission Villani-Torossian (Villani & Torossian, 2018), j'ai réfléchi à une proposition didactique qui pourrait permettre de respecter une partie de l'ingénierie didactique de Brousseau tout en étant plus proche des textes officiels et des documents d'accompagnement (Barilly & Le Poche, 2012;

¹ claire.margolinas@uca.fr

Ministère de l'Éducation nationale, 2016a, 2016b) . Cet article est le résultat de cette réflexion.

Si je parle ici de « proposition didactique » c'est que je considère qu'il faut réserver le terme d'ingénierie didactique à une proposition ayant fait l'objet de mises en œuvre et d'observations en classe ce qui n'est pas le cas en ce qui me concerne, à l'heure actuelle.

2. Quelques mots sur l'ingénierie de Brousseau & Brousseau (1987)

Guy Brousseau a montré dans l'ingénierie la plus importante pour son travail théorique (G. Brousseau, 1980; Guy Brousseau, 1980, 1981, 1990; Guy Brousseau & Brousseau, 1987) récemment publiée en anglais (Brousseau, Brousseau, & Warfield, 2014) qu'il est possible, dans des conditions expérimentales, d'enseigner les rationnels par des situations. Les 65 leçons de la séquence ont été reproduites, aux niveaux CM1-CM2, pendant 25 ans dans le cadre du COREM² (Salin & Greslard, 1998). Sans rentrer dans les détails, le projet théorique de la théorie des situations didactiques (Guy Brousseau, 1998) est de modéliser les différentes significations des savoirs mathématiques par des situations « fondamentales » (Bessot, 2011) qui peuvent, par un jeu de variables, engendrer des situations didactiques qui permettent de construire les connaissances relatives à ces savoirs.

Ce travail s'appuie sur l'idée d'introduire d'abord les rationnels comme des mesures de longueurs impossibles à distinguer facilement et à mesurer avec des instruments traditionnels : la mesure de l'épaisseur d'une feuille de papier, ce qui permet d'introduire le rationnel-mesure. La situation fondamentale du rationnel-mesure consiste à trouver un moyen de communiquer à autrui l'épaisseur d'une feuille de papier pour reconnaître un paquet de feuilles d'une qualité donnée parmi d'autres paquets de feuilles de même couleur et de même format, un pied à coulisse rudimentaire étant disponible. Les élèves comprennent facilement qu'il faut communiquer deux nombres : le nombre de centimètres correspondant à un nombre de feuilles, ce qui conduit dans un premier temps à diverses écritures d'un couple (ex : 2cm pour 17 f.). L'écriture conventionnelle $\frac{2}{17}$ est alors introduite dans ce contexte de mesure de l'épaisseur d'une feuille de papier. La question « est-ce que ce sont des nombres ? » est posée explicitement une fois que l'usage initial est stabilisé. Cette première partie de la séquence permet d'introduire tout ce que l'on peut faire avec des rationnels-mesure : relation fondamentale³ $\frac{a}{b} \times b = a$, propriété fondamentale $\frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times c}$, comparaison, addition et donc multiplication par un entier. Une deuxième partie, qui introduit une autre situation fondamentale (l'agrandissement), permet d'introduire un processus qui conduit à la multiplication de deux rationnels, ce qui n'est pas possible dans un contexte de rationnels-mesure et permet de construire les rationnels comme des nombres à part entière, en se détachant du contexte de mesure (Guy Brousseau, 1981). Dans les années 70-80 ces deux aspects étaient pertinents à l'école élémentaire puisque la multiplication de fractions et de décimaux y était étudiée.

Il n'est pas utile ici de décrire plus avant cette séquence expérimentale. Son intérêt repose à la fois sur l'étude historique et didactique de l'enseignement des rationnels et des décimaux (Brousseau, 1980) et sur l'étude mathématique et didactique des rationnels et des décimaux (Brousseau, 1981).

Une précision est importante ici puisqu'elle motive notre texte : comme Guy Brousseau l'a plusieurs fois affirmé, la séquence des 65 leçons des rationnels et décimaux dans la scolarité

² Centre pour l'Observation sur l'Enseignement des Mathématiques, impulsé par Guy Brousseau, qui a fonctionné au sein d'une école primaire (Jules Michelet, Talence) de 1973 à 2000.

³ Le terme de « fondamentale » associé à la relation qui permet de définir un rationnel et à la propriété dont découlent toutes les autres propriétés des rationnels est une façon d'insister sur leur importance dans la conception de la séquence de Brousseau (et également celle qui sera décrite plus loin).

obligatoire, même si elle a été utilisée comme base de l'enseignement dans ce domaine pendant 25 ans à l'école Jules Michelet, n'a jamais été destinée à une reproduction telle quelle dans les classes non expérimentales. On n'en trouve d'ailleurs de trace dans aucun des documents d'accompagnement des programmes, même anciens.

Un très grand nombre d'études internationales montrent par ailleurs que les rationnels, souvent désignés par le terme « fractions » (voir ci-dessous) sont très mal compris par les élèves et entraînent de très nombreuses erreurs. Leur compréhension est pourtant essentielle pour la suite de la scolarité en mathématiques, car les nombres rationnels sont omni-présents en algèbre, notamment dans les résolutions d'équations du premier degré (solutions des équations $ax + b = 0$, $a \neq 0$). Ces résultats coïncident avec le ressenti quotidien des professeurs, non seulement ceux qui enseignent au niveau auquel les « fractions » sont introduites (fin d'école élémentaire), mais aussi aux niveaux suivants (collège et lycée). Il suffit d'introduire un nombre en écriture fractionnaire dans un exercice d'algèbre pour faire chuter la réussite, même au lycée...

Il semble donc d'une grande actualité de revenir sur l'enseignement des nombre rationnels. Cet article a pour but de poser les bases d'une séquence d'enseignement des rationnels-mesures qui s'appuie sur une situation fondamentale qui semble *a priori* assez compatible avec les attentes institutionnelles du cycle 3, en restant proche au plan épistémologique de l'ingénierie de Brousseau.

3. Quelques remarques sur les pratiques ordinaires observées

Avant de parler des pratiques ordinaires, une précision de lexique s'impose entre « nombres rationnels » et « fractions ».

Les nombres rationnels sont définis en mathématiques en tant qu'élément du corps \mathbb{Q} .

Le terme de « fraction » est plus ambigu. Il désigne parfois : une fonction (prendre les deux-tiers de) ; une écriture de forme numérateur/dénominateur ; un nombre. Par exemple, dans wikipedia, article fraction (math)⁴ l'ambiguïté est assez nette : « une fraction est un certain nombre de parts considérés après la division d'un nombre entier en parties égales ». Le terme de fraction réfère à un fractionnement en plusieurs parts, le plus souvent d'une unité.

Dans ce texte, le mot « fraction » n'est utilisé que quand il réfère aux programmes et aux pratiques ordinaires, car c'est le terme usuel, le mot « nombre rationnel ou rationnel » sera utilisé au sens mathématique, pour désigner des nombres du corps \mathbb{Q} , avec la définition usuelle :

« Un réel q est un nombre rationnel si et seulement s'il existe deux entiers relatifs a et b avec $b \neq 0$ tels que $q = \frac{a}{b}$ » (Bouvier et al., 1979, p. 628)

D'après mes observations en tant que formatrice, les fractions sont introduites la plupart du temps dans un contexte qui présente plusieurs caractéristiques :

On introduit d'abord un fractionnement d'une unité de mesure, cette « unité » est assez grande pour pouvoir être fractionnée physiquement ;

Cette unité est déjà fractionnée dans un schéma qui est souvent circulaire et parfois rectangulaire (bande) ou d'autres formes ;

On introduit alors une fraction, par exemple $\frac{1}{4}$ pour parler d'un morceau (une fraction) qui correspond à une partie du schéma, qui est souvent définie comme une part d'une unité que l'on a coupée en 4 parts égales ;

Les élèves sont appelés à mesurer des grandeurs (le plus souvent longueur ou aire) en utilisant des fractions, pour cela ils doivent compter le nombre de parts qui divisent l'unité puis le

⁴ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_(math%C3%A9matiques))

nombre de parts coloriées (par exemple) ;

Dans beaucoup de documents à destination des élèves, l'unité qui est partagée est implicite (voir annexes).

Jusque-là, les élèves ont eu très peu de choses à faire : ils doivent compter en combien de parts est divisée l'unité, la seule difficulté est donc de comprendre ce qui, dans le schéma, représente une unité (ce qui est plus ou moins explicite dans les pratiques ordinaires). Ils doivent ensuite compter le nombre de parts. Ces nombres étant assez petits, il n'y a aucune difficulté particulière pour réaliser cette tâche de dénombrement. Bien sûr il peut arriver que les élèves ne mettent pas ces deux nombres au bon endroit dans l'écriture fractionnaire (inversion du numérateur et du dénominateur), mais après tout ce n'est qu'une question de convention d'écriture.

Les difficultés sérieuses commencent notamment :

quand on cherche à comparer des fractions qui n'ont pas le même dénominateur ;
quand il faut représenter des fractions supérieures à l'unité.

En 2018-2019, des étudiants de 1^e année du Master MEEF⁵ de l'ESPE⁶ Clermont-Auvergne ont recueilli de nombreuses erreurs d'élèves au sujet des fractions durant leurs stages en classe. Arrêtons-nous un instant sur deux de ces documents.

Dans le document en annexe 1, Zoé (CM1) montre qu'elle sait répondre à presque toutes les questions de l'évaluation. Dans les exercices 1, 2 et 3, il fallait pour réussir compter le nombre total de parts, inscrire ce nombre au dénominateur puis inscrire le nombre de parts coloriées au numérateur ou inversement à partir de l'écriture donnée, colorier le nombre de parts de disques ou de bandes déjà partagés. Dans l'exercice 5, il fallait savoir que $\frac{n}{n} = 1$ et que si $a < b$ alors $\frac{a}{b} < 1$. Zoé est donc une élève qui apprend ses leçons et qui montre qu'elle a des connaissances. Cependant tout se gâte dans l'exercice 4 (Figure 1).




Figure 1 : Erreur recueillie au CM1

Comme dans l'exercice 2, les subdivisions sont déjà faites : la plaque de chocolat est subdivisée en 8 rectangles identiques mais, contrairement à l'exercice 2 (réussi), ces subdivisions ne correspondent pas toujours au nombre inscrit au dénominateur.

Evan, au CM2 (annexe 2), sait lui aussi répondre à des questions qui n'impliquent pas une

⁵ Métiers de l'Enseignement de l'Éducation et de la Formation

⁶ Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation

connaissance de ce que représente une fraction : il sait en particulier traduire en mots les écritures mathématiques des fractions et opérer cette traduction dans l'autre sens (dictée). Cependant, il produit exactement la même erreur que Zoé.




Figure 2. Erreur recueillie au CM2

Pour réussir plus ou moins les évaluations, les élèves n'ont besoin que de quelques connaissances qui parfois, même quand elles sont fausses, se révèlent souvent efficaces (si l'on compte la proportion de réponses fausses sur l'ensemble des réponses, on obtient seulement 7,5% pour Zoé et 12% pour Evan, autrement dit, ils ont bien réussi l'évaluation...). Cependant, la compréhension des fractions n'est pas assurée pour autant.

4. Objectifs de la proposition didactique

Les objectifs de cette proposition didactique pour le cycle 3, qui nous allons détailler dans tout le texte, sont :

- De définir des rationnels par le partage comme un prolongement de la division, en s'appuyant sur un dispositif (le guide-âne) présent dans des textes officiels, des documents d'accompagnement et des documents contemporains destinés aux enseignants (voir infra) ;*
- De construire une situation fondamentale pour les rationnels-mesure en s'appuyant sur le milieu du partage ;*
- De définir de nouveaux nombres dans un contexte de mesure ;*
- D'établir la relation fondamentale et la propriété fondamentale des rationnels, qui n'ont pas d'équivalent pour les entiers ;*
- D'étudier les comparaisons et l'addition des rationnels.*

La multiplication des rationnels ne peut être abordée dans un tel contexte, ce qui sera fait ultérieurement (conformément aux programmes de 2015). Dans l'ingénierie initiale de Brousseau, la multiplication des rationnels étaient travaillée en s'appuyant sur une autre situation fondamentale.

5. La division

La division est étudiée dans des situations de partage, implicitement aux cycles 1 et 2 et explicitement au cycle 3. La division, en tant qu'opération qui à deux nombres fait correspondre un troisième nombre n'est pas toujours possible dans \mathbb{N} . En effet, on peut diviser 12 par 3, ce qui a pour résultat 4 car $12=3 \times 4$, ce que l'on peut écrire $12 \div 3 = 4$, mais par contre on ne peut obtenir un nombre entier en divisant 10 par 3.

On a donc des égalités suivantes

$$12 \div 3 = 4 \text{ car } 12 = 3 \times 4, \text{ et aussi } 12 \div 4 = 3$$

La « division » euclidienne est une réponse possible à ce problème, elle permet un partage avec reste. Cependant la division euclidienne ce n'est pas une opération au sens strict puisqu'à deux nombres, la division euclidienne fait toujours correspondre deux nombres et non pas un seul.

C'est dans l'ensemble des rationnels \mathbb{Q} que l'on trouve une réponse à ce problème : pour tout entiers a et b (avec b non nul) il existe un nombre rationnel q tel que $q \times b = a$, que l'on note $q = \frac{a}{b}$

I. RATIONNELS ET RELATION FONDAMENTALE

1. Situation fondamentale

Il s'agit de considérer qu'un rationnel est le nombre q qui vérifie la relation $b \times q = a$ (a et b sont des entiers, $b \neq 0$). Cette *relation fondamentale* est mise en scène ici dans un dispositif de partage de longueur. Dans ce cadre, a et q sont des mesures de longueurs dans une unité u donnée, b est un nombre entier (non nul) qui définit le partage de a unités en b parties égales. Nous construisons donc des rationnels-mesure, comme le fait Brousseau dans la première partie de son ingénierie⁷.

Par rapport à la situation fondamentale mise en scène dans la situation des feuilles de papier, il y a une différence importante. Dans la situation des feuilles de papier, il n'y a pas de partage et d'ailleurs la mesure de l'épaisseur d'une feuille est implicite, au départ au moins. Il y a une relation (une fonction) entre le nombre de feuilles et l'épaisseur du paquet, relation qui caractérise la qualité du papier (par son épaisseur). Dans ce contexte, dans la relation $b \times q = a$, b représente le nombre de feuilles de papier (c'est donc bien un nombre sans dimension), q est la mesure de l'épaisseur d'une feuille en centimètre et a est la mesure de l'épaisseur du tas de feuilles en centimètres. Tant que q reste implicite (dans les premières séances), (a, b) représente un couple de nombres dont le premier est une mesure en centimètres qui permet de désigner un tas de feuilles pour le distinguer des autres.

Pour désigner la mesure de l'épaisseur d'une feuille de papier, les élèves sont souvent amenés à considérer un assez grand nombre de feuilles (par exemple 1cm pour 31 feuilles du tas A). L'avantage est de considérer d'emblée de nombreux couples comme légitimes et en même temps d'en rejeter certains : si d'autres élèves écrivent que les feuilles du tas A peuvent se désigner par 2 cm pour 40 feuilles, par exemple, les élèves peuvent dire qu'il y a une erreur et le vérifier. Par contre le contexte : mesure de l'épaisseur d'une feuille de papier en centimètres, conduit uniquement à des mesures plus petites que 1. Dans la proposition développée dans ce texte, les nombres naturels en jeu dans les mesures de longueur ne sont pas très grands (autour 10 et 12 au début) et les partages non plus (pas plus de 8), par contre les mesures rencontrées sont d'emblées plus grandes que 1.

Cependant, il s'agit de propositions assez proches dans la mesure où elles s'appuient au départ uniquement sur la relation fondamentale (dans le milieu des feuilles de papier, la mesure de l'épaisseur d'une feuille (q) multipliée par le nombre de feuilles d'un tas (b) est égale à la mesure de l'épaisseur du tas) et sur la propriété fondamentale des rationnels (dans le milieu des feuilles de papier, si la mesure de l'épaisseur d'un tas de 17 feuilles mesure 2cm alors la mesure de l'épaisseur d'un tas de 2×17 feuilles mesure 2×2 cm). Dans les deux propositions, la valeur 1 de l'unité ne joue aucun rôle particulier et l'on n'introduit pas au départ le fractionnement de l'unité. Dans les deux cas, on n'utilise pas le vocabulaire des fractions (demi, tiers, etc.), le fractionnement de l'unité n'étant introduit que dans un second temps (Ratsimba-Rajohn, 1982).

Dans la théorie des situations, « ce qui est fondamental ce n'est donc pas une situation, mais un

⁷ Je m'excuse auprès des lecteurs qui ne connaîtraient pas l'ingénierie de Brousseau (Guy Brousseau & Brousseau, 1987), pour lesquels la comparaison entre ce qui est présenté ici et la situation fondamentale des feuilles de l'épaisseur d'une feuille de papier pourrait être obscure et je les invite à passer au paragraphe suivant.

ensemble de situations et leur articulation, situations générées dans le paradigme que représente une situation fondamentale. » (Bessot, 2011, p. 40). « Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie » (*Ibid.* p. 39).

Une situation fondamentale n'est donc pas une « introduction » qui, une fois passée, sera vite mise de côté au profit d'une formalisation et de calculs, c'est au contraire une situation qui va rendre possible, la construction des connaissances qui participent à un savoir visé pendant une durée importante.

2. Un dispositif de partage (le guide-âne)

Le guide-âne sert comme dispositif de partage, ce qui est une proposition courante au cycle 3 (Anselmo et al., 1999; Anselmo & Zucchetta, 2018; Barilly & Le Poche, 2012; Ministère de l'Éducation nationale, 2016a, 2016b). Nous avons choisi d'utiliser à la fois une règle graduée en unités entières informable (sur laquelle on peut écrire au feutre effaçable) et des bandes de papier de différentes longueurs (qui peuvent être découpées avant l'activité). Le partage matériellement réalisé avec le guide-âne doit pouvoir contribuer à la validation, sachant qu'une mesure est toujours liée à une précision plus ou moins grande. Il est normal, dans le cadre d'un travail sur les nombres rationnels, de trouver un lien avec les grandeurs et les mesures, qui sont toujours associées à une précision (voir à ce sujet les cours de Michèle Arthaud et de Floriane Wozniak donnés lors de la vingtième été de didactique des mathématiques à paraître en 2021).

Les questions posées, dans différentes situations, reviennent à produire, comparer, additionner les mesures de longueurs résultant de partages ou bien à trouver le partage à faire pour produire une mesure de longueur donnée.

3. Installation du milieu « 12 en 3 »

Le dispositif matériel de partage est introduit d'abord dans le cas d'une bande de 12 unités. Une règle informable *ad hoc* a été fabriquée, il faut en effet disposer d'une règle sur laquelle seule les unités entières sont indiquées, ce qui n'est jamais le cas dans les règles du commerce. L'unité à laquelle nous nous référons dans ce texte correspond donc à l'unité de cette règle informable, qui sera toujours la même au cours des différentes situations.

La technique du guide-âne doit sembler fiable aux élèves (qui, au cycle 3, ne peuvent pas justifier mathématiquement des propriétés de cette technique) et cette technique doit être entraînée car elle joue un rôle indispensable dans la validation par le milieu de toutes les situations.

Il s'agit d'un point délicat : comme avec toute technique matérielle de mesurage, la mesure obtenue relève d'une approximation. Cependant si la technique n'est pas suffisamment entraînée et raisonnablement fiable, cela risque de conduire les élèves à rejeter la validation par le milieu, ce qui conduirait à une impasse des situations suivantes. C'est pourquoi il peut être judicieux à la fois d'entraîner et de vérifier la fiabilité de la technique avec des partages conduisant à des résultats entiers facilement vérifiables sur la règle graduée informable.

Des bandes de papier qui sont toutes de longueur 12u sont disponibles et peuvent être pliées. Le guide-âne s'utilise de la manière suivante :

On pose la bande dont la longueur mesure 12u sur le guide-âne en faisant correspondre une extrémité de la bande avec la ligne 0

On fait correspondre l'autre extrémité de la bande avec la ligne 3 du guide-

On marque au crayon les intersection entre les lignes du guide-âne et la bande

On plie la bande suivant ces marques et on obtient une bande pliée en 3 parties égales




Figure 3. La technique du guide-âne pour « 12 en 3 »

Lors des premières utilisation, il est judicieux d'utiliser aussi la règle graduée informable avec la technique du guide-âne pour vérifier que la technique fonctionne

On pose le repère 0 (l'origine de la mesure) de la règle sur la ligne 0 du guide-âne et le repère 12 de la règle sur la ligne 3

On marque les intersections entre les lignes du guide-âne

Le dispositif du guide-âne de « 12 en 3 » conduit à marquer les repères 4 et 8 sur la règle, qui sont distants de $4u$

La bande pliée lors d'expérience précédente a bien une longueur qui mesure $4u$ sur la règle



Figure 4. La technique du guide-âne pour « 12 en 3 » sur la règle graduée informable

Les opérations matérielles correspondent à deux égalités connues :

En partageant $12u$ en 3 on obtient 3 parties de $4u$

$$12u \div 3 = 4u$$

En mettant bout à bout les 3 parties de 4u on obtient la bande totale de 12u

$$3 \times 4u = 12u$$

À ce stade, il ne s'agit que d'une expérience amusante, qui permet de partager en 3 une bande de 12 unités. Il est important de montrer que le résultat ne change pas avec des guide-ânes avec des réseaux de parallèles plus ou moins resserrés. C'est ici l'appropriation et l'usage de la technique, essentielle à la séquence, qui est travaillée.

Le dispositif matériel introduit n'a bien entendu aucune raison de fonctionner seulement pour une bande de 12u. Il n'induit pas non plus que l'on ne puisse faire qu'un partage en 3, puisque le dispositif du guide-âne permet de nombreux partages, seulement limités par le nombre de parallèles effectivement représentées. Ce sont ces possibilités que nous allons exploiter maintenant.

4. Une situation de communication

Comme dans la séquence des rationnels-mesure de Brousseau, nous introduisons alors une situation de communication. Il s'agit pour les élèves de se rendre compte qu'il faut deux nombres entiers pour désigner la longueur d'une bande pliée.

Des bandes non marquées, déjà découpées, de 10u, 11u, 12u et 13u sont disponibles en nombre suffisant pour avoir une bande de chaque type pour chaque groupe d'élèves. Chaque groupe d'élèves dispose d'un guide-âne et d'une règle graduée informable. On organise une communication écrite entre un groupe d'émetteurs et un groupe de récepteurs. Pour éviter les communications orales intempestives, les élèves ne savent pas qui va recevoir leur message, qui est transmis par le PE (Professeur des Ecoles).

« PE : Vous allez choisir une bande et la plier comme vous le souhaitez en utilisant la technique du guide-âne. Vous écrivez le nom de votre groupe sur la bande et vous la gardez. Vous devez ensuite écrire un message pour que le groupe qui va lire votre message puisse fabriquer une bande pliée qui aura la même longueur que la vôtre.

On vérifiera ensuite si la longueur des bandes pliées est bien la même dans les deux groupes. »

Pour réussir, il faut donner deux informations : longueur de la bande choisie et nombre à atteindre sur le guide-âne. À la suite de cette situation, le PE propose une désignation orale sur le modèle suivant : « dix unités en trois » désigne la mesure de la longueur de la bande de dix unités pliée en 3.

5. Introduction d'un questionnement « 10 en 3 »

En utilisant la technique du guide-âne pour une longueur de 10u partagée en 3 sur la règle graduée informable, plusieurs constatations peuvent être faites.

Dans la situation précédente, personne n'a eu de difficulté à partager sur bande de 10u en 3. En utilisant la règle informable, on constate que le dispositif du guide-âne de « 10 en 3 » conduit à marquer deux repères qui ne tombent pas sur des unités entières.

En reportant ces marques sur la bande de 10u et en pliant, on obtient bien un partage de la bande en 3 parties égales.




Figure 5. La règle marquée par le partage de 10 en 3 avec le guide-âne

Les opérations matérielles réalisées pour le partage de $10u$ en 3 correspondent à des égalités inconnues :

En partageant $10u$ en 3 on obtient 3 parties mais on ne sait pas désigner par un nombre la mesure de la longueur de ces parties

Quand nous avons partagé $12u$ en 3, le résultat : $4u$, correspondait bien à la division de $12u$ par 3.

la division de $10u$ par 3 ne tombe pas juste mais, en en mettant bout à bout les 3 parties obtenues par le guide-âne on obtient la bande totale

Si l'on savait écrire la mesure de la longueur en unité u de ces parties alors le produit de cette mesure par 3 serait $10u$

Cette introduction est basée sur l'idée intuitive (admise) qu'à toute marque dans le repère de la règle graduée ou à toute mesure de longueur dans une unité donnée (ce qui revient au même) correspond un nombre. Remarque : mathématiquement, la correspondance entre la droite réelle et les nombres réels conduit à la construction de \mathbb{R} , dans le cas de l'obtention de points sur la droite réelle par le dispositif du guide-âne appliqué à des segments de mesures entières, on n'obtient que des rationnels.

Notre expérience montre qu'il y a des nombres (dans ce sens) qui ne sont pas entiers. Le choix de « 10 en 3 » est stratégique : la longueur de la bande pliée n'est pas entière (elle n'est même pas décimales), cela montre bien qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à « 12 en 3 ».

Contrairement à ce que l'on rencontre le plus souvent, notre situation n'est pas basée sur le partage de « l'unité ». Toutes les bandes mesurent des longueurs différentes et de ce fait il y a bien *deux* nombres qui sont nécessaires pour définir la longueur de la bande pliée. De plus, nous travaillons avec une unité qui est proche des unités usuelles (sur les photos, une unité mesure 2 cm mais l'on pourrait prendre tout aussi bien le centimètre comme unité, même si l'on ne peut pas utiliser les règles usuelles à cause de la présence de millimètres, qui correspondent à des décimaux), alors que pour travailler sur le « partage de l'unité », l'on est contraint d'introduire comme « unité » une bande suffisamment grande qui, de ce fait, ne sert pas d'unité pour mesurer mais est une construction *ad hoc* à partager.

Par ailleurs, la relation avec la multiplication est le point nodal de la séquence : quand on prend trois fois la longueur de la bande pliée en trois, on retrouve la bande totale (ce qui, matériellement,

correspond à déplier la bande).

6. Une écriture conventionnelle correspondant à « 10 en 3 »

Nous concluons cette phase en introduisant une écriture conventionnelle. Pour désigner la mesure en unité u de la longueur de la bande de $10u$ partagée en 3, nous ne pouvons pas écrire $10 \div 3 u$ pour les raisons déjà évoquées, pourtant il existe un nombre d'unités u qui résulte du partage de $10u$ en 3.

Nous écrivons ce nombre « $\frac{10}{3}$ ». Dans le contexte du guide-âne ce nombre est lu « dix en trois » et de même, $\frac{10}{3} u$ se lit « dix en trois u », puisqu'il s'agit bien du nombre (dix en trois) d'unités u .

Introduire ici le mot « tiers » pourrait conduire à une impasse car nous ne savons pas ce qu'est *un* « tiers » dans cette situation, *puisque nous n'avons pas partagé l'unité*. De plus les élèves connaissent ces mots et y attachent parfois des connaissances erronées qu'il n'est pas nécessaire de traiter maintenant, le mot « tiers » sera utilisé par l'enseignant seulement quand nous partagerons une unité, en toute fin de séquence.

Si des élèves proposent la lecture « dix-tiers », l'enseignant pourra indiquer que la relation entre « dix en trois » et « dix tiers » sera faite à la fin de la séquence. Si besoin, pour les élèves qui savent de le tiers de l'unité correspondent à une unité partagée en trois et que dix tiers c'est prendre dix tiers d'unités, l'enseignant peut faire remarquer que l'unité n'a pas été partagée en trois dans notre expérience du guide-âne.

Sur le guide-âne, nous avons disposé une bande de mesure $10u$ de la ligne 0 jusqu'à la ligne 3, ce qui nous a permis de partager 10 en 3 et d'obtenir une longueur que nous appelons donc « 10 en 3 ». Les opérations matérielles correspondent donc à la relation fondamentale :

En partageant $10u$ en 3 on obtient 3 parties de $\frac{10}{3} u$

En mettant bout à bout les 3 parties de $\frac{10}{3} u$ on obtient la bande totale

$\frac{10}{3} u \times 3 = 10u$ c'est la relation fondamentale des rationnels-mesures




Figure 6. Schéma du partage de 10 en 3. Relation fondamentale

Notre proposition est donc d'emblée appuyée sur la relation fondamentale, que nous ne voyons pas apparaître dans les pratiques usuelles, car celle-ci est masquée par le décompte des subdivisions. Nous ne pensons pas à ce stade de la séquence que beaucoup d'élèves vont s'approprier l'égalité de la relation fondamentale. Ils vont petit à petit s'acculturer à la dénomination « 10 en 3 ; 11 en 3 ; 10 en 4, etc. » pour parler de la mesure de longueur d'une bande de $10u$ pliée en 3, etc. Ils vont progressivement utiliser l'écriture $\frac{10}{3}$ pour écrire « dix en trois ». Les allers-et-retours entre le dispositif matériel, les schémas et les écritures numériques vont rester constants pendant toute la séquence : il ne faut perdre personne en route...

7. Renforcement de la technique du guide-âne et autres questionnements : « 10 en 4 »

Le partage de $10u$ en 4 est demandé à tous les élèves⁸. Il s'agit à la fois de vérifier le maniement du dispositif, de susciter de nouvelles questions et de continuer à s'accoutumer aux nouvelles écritures.

L'observation collective de la règle graduée informable disposée sur le guide-âne semble montrer qu'une des marques est un entier : le deuxième. Il faut donc se demander pourquoi c'est le cas. Plusieurs réponses sont possibles, notamment :

C'est au milieu sur la bande pliée ;

Je sais plier une bande en 4 sans guide-âne : il faut plier en 2 (on obtient le pli du milieu) puis en 2 (on obtient les deux autres), le résultat est bien le même qu'avec le guide-âne.

On peut produire des schémas correspondant à cette expérience.

On peut aussi écrire de nouvelles relations :

En partageant $10u$ en 4 on obtient 4 parties de $\frac{10}{4}u$

En mettant bout à bout les 4 parties de $\frac{10}{4}u$ on obtient la bande totale

$\frac{10}{4}u \times 4 = 10u$ c'est la relation fondamentale

En partageant $10u$ en 2 on obtient 2 parties de $\frac{10}{2}u$

$\frac{10}{2}u = 10u \div 2 = 5u$

En mettant bout à bout les 2 parties de $\frac{10}{2}u$ on obtient la bande totale

$\frac{10}{2}u \times 2 = 10u$ c'est la relation fondamentale des mesures

Au cours du travail, on a aussi rencontré d'autres résultats :

$2u < \frac{10}{4}u < 3u$

$\frac{10}{4}u \times 2 = \frac{10}{2}u$

Ces résultats ne sont pas institutionnalisés mais ils peuvent être enregistrés dans un « journal » (Sensevy, 1998; 1997) ou bien plus classiquement dans un cahier de résultats. La relation fondamentale des rationnels mesure est continuellement institutionnalisée et commence à être mémorisée.

Il est possible de traiter d'autres exemples (« 11 en 3 », « 12 en 5 », par exemple).

Dans cette partie de la séquence, il est surtout important :

*D'ancrer les nombres rationnels dans une situation qui permet une rétro-action d'un milieu ;
D'appuyer cette connaissance implicite par la production de schémas (qui n'ont pas à être institutionnalisés) ;*

De permettre la compréhension en situation et la mémorisation de la relation fondamentale.

Remarque : la situation du guide-âne n'est pas destinée à être abandonnée au profit d'écritures de nombres ou de schémas. En effet, son rôle est essentiel dans la compréhension, et aussi dans la suite de la séquence.

⁸ Nous ne nous intéressons pas, dans ce texte, aux aspects organisationnels : travail en groupe, par deux, individuel, etc. Il ne s'agit pas ici de décrire une mise en œuvre en classe mais les propriétés d'une séquence. D'autres travaux expérimentaux suivront qui, eux, seront basés sur l'analyse de résultats empiriques.

8. Rationnel-mesure et nombre rationnel

Dans cette séquence, comme dans celle de Brousseau, mais aussi (souvent implicitement) comme le font tous les manuels à propos des « fractions », les nombres rationnels sont introduits dans le contexte des mesures, il y a bien un nombre d'unités (et donc un nombre) mais ce nombre n'est pas conçu indépendamment de sa mesure, ce que Brousseau appelle le rationnel-mesure.

Les nombres rationnels ont pour raison d'être de représenter mesures de grandeurs dont les rapports sont entiers et plus largement, les nombres sont toujours impliqués dans la proclématique des grandeurs (Chambris, 2012).

Le problème didactique se pose alors de considérer des opérations sur des nombres et non pas des opérations sur des mesures. Les préconisations des programmes ont beaucoup varié à ce sujet (*Ibid.*). À l'heure actuelle, et tout particulièrement aux cycles 3 et 4, il est recommandé d'être très attentifs aux unités de mesure et à l'homogénéité des calculs. C'est dans cette perspective que dans ce texte j'ai indiqué les unités dans les calculs de relations entre mesures.

C'est d'autant plus pertinent dans les calculs dans lesquels il y a à la fois une mesure et un nombre sans dimension comme dans la relation fondamentale des rationnels-mesure $\frac{10}{4}u \times 4 = 10u$.

Cependant, les nombres rationnels vont modéliser cette réalité, qui en fait ne dépend pas de l'unité u (qui pourrait être d'ailleurs aussi bien une unité de longueur qu'une unité d'aire, par exemple).

Le professeur sait bien que l'égalité $\frac{10}{4} \times 4 = 10$ est vraie également.

Dans le contexte des rationnels-mesure, cela ne peut pas être montré formellement car on n'a introduit la multiplication que par addition répétée, ce qui fait que l'on ne sait multiplier une mesure que par un entier, cette « multiplication » représente l'ajout successif de longueurs de mesures égales mais on ne sait pas ce que représente la multiplication par $\frac{10}{4}$. Dans l'ingénierie de Brousseau, une autre situation fondamentale était introduite ensuite (l'agrandissement) qui permettait d'introduire les rationnels comme des coefficients d'agrandissement (des coefficients de fonctions linéaires) et donc comme des nombres⁹. Dans les programmes actuels, cette stratégie n'est pas possible puisque la multiplication des rationnels n'est pas étudiée avant le cycle 4.

La conséquence de cette réflexion n'est pas évidente.

Il est possible de faire le choix d'indiquer systématiquement les unités, car cela permet d'être le plus proche de la réalité des mesures. Cependant, c'est parfois délicat et de plus les programmes visent certaines opérations sur des fractions simples.

Il est donc possible aussi, dès le départ, de faire le choix de ne jamais indiquer l'unité, sachant que tant que l'on n'a qu'une seule unité dans le calcul cela n'introduit pas d'erreur de calcul.

Il est possible enfin d'écrire au départ les égalités sur les mesures et donc avec les unités et de passer ensuite à des égalités sur des nombres toutes les fois où cela ne semble pas poser problème. Remarquons que cette difficulté n'apparaît ici que parce que ce texte cherche à modéliser avec rigueur la réalité des situations qui sont présentées aux élèves. Si elle n'apparaît pas dans les manuels les plus courants, c'est parce que l'unité est en fait gommée d'emblée, ce qui produit les erreurs montrées dans l'introduction, cependant les mesures des aires de parties de disques-unité coloriées dans les manuels ne sont jamais des nombres sans dimension, même si les unités sont gommées.

⁹ Remarque mathématique : il s'agit d'une forme de passage au dual des applications linéaires, ce qui permet de définir la multiplication des rationnels *via* la composition des applications linéaires

Dans ce texte, j'ai fait le choix d'écrire les égalités sur les mesures et d'indiquer qu'on admettra l'égalité sur les nombres, de manière à alerter l'attention du lecteur sur le fait qu'il s'agit d'un glissement qui, dans le contexte des mesures, ne peut pas être justifié.

Par exemple :

$$\frac{10}{4}u \times 4 = 10u \text{ c'est la relation fondamentale des rationnels-mesure}$$

$$\text{On admet que } \frac{10}{4} \times 4 = 10 \text{ qui est la relation fondamentale des rationnels}$$

II. PROPRIÉTÉ DES RATIONNELS, UN NOMBRE ET DES ÉCRITURES

1. Situation d'action : anticipation

Jusqu'à présent, nous avons fait en sorte que les élèves rencontrent des connaissances implicites en situation et qu'ils soient acculturés à une écriture culturelle, celle des nombres rationnels ainsi qu'à une relation fondamentale qui fonde les rationnels-mesure. Nous adoptons pour ce faire une ostension assumée (Matheron & Salin, 2002, p. 40), même si celle-ci est produite dans un contexte favorable à la compréhension de la nécessité de nouveaux nombres et de nouvelles désignations basée sur la donnée de deux paramètres (la mesure en unité u de la longueur de la bande et le nombre de parties de longueurs égales à la bande pliée résultant du partage au guide-âne).

Nous allons maintenant pouvoir introduire une situation d'action, dans laquelle un enjeu est donné dans le milieu qui est maintenant installé.

« PE : « Voici une bande de $10u$ pliée en 3. Combien mesure la longueur de la bande pliée ? ». À ce moment de la séquence, presque tous les élèves doivent savoir dire que la bande pliée mesure 10 en 3 unités (ou $10u$ en 3) que le PE va écrire $\frac{10}{3}u$.

« PE : « Je vous distribue des bandes bleues de longueur $20u$. Vous devez trouver comment utiliser le guide-âne pour plier cette bande bleue pour obtenir exactement la même longueur que $10u$ en 3 [le PE montre la bande de $10u$ pliée en 3] ». Le PE précise qu'il faut bien utiliser uniquement la technique du guide-âne, qui est maintenant bien connue.

« Quand vous pensez avoir trouvé, je viendrai avec la bande de $10u$ pliée en 3 pour vérifier. »

La solution consiste à partager $20u$ en 6. Certains élèves vont peut-être essayer de partager $20u$ en 3 mais le résultat est bien trop grand ! Des ajustements perceptifs sont possibles (par exemple partager en 8 par pliages en 2 successifs) mais ils ne résisteront pas à la validation par superposition et ne pourront être expliqués.

On a donc trouvé deux nombres égaux :

Nous avons fabriqué une bande dont la longueur mesure $\frac{20}{6}u$

$$\frac{10}{3}u = \frac{2 \times 10}{2 \times 3}u = \frac{20}{6}u \text{ c'est une propriété des rationnels-mesure}$$

$$\text{On admet que } \frac{10}{3} = \frac{2 \times 10}{2 \times 3} = \frac{20}{6} \text{ c'est une propriété des nombres rationnels}$$




Figure 7. Le partage de $10u$ en 3 et de $20u$ en 6. Propriété des rationnels-mesure

Certains élèves commencent peut-être à comprendre cette propriété, cependant des répétitions de cette situation sont nécessaires pour ne pas perdre en route des élèves moins rapides. Comme précédemment, le choix est de commencer par se placer dans un cas qui, parce que le résultat n'est pas décimal (ce que les élèves ignorent), est un cas plus général et d'utiliser ensuite des répliques de la situation dans des cas qui vont fournir des cas particuliers.

2. Variations de la situation d'action

On peut répliquer la situation avec 12u en 4. Comme partager en 4 a été automatisé par le guide-âne, certains élèves ne s'apercevront pas nécessairement que le résultat est une bande pliée dont la longueur est une mesure entière. Dans tous les cas, le passage obligatoire par le guide-âne impose de considérer 12u en 4 comme une mesure rationnelle, même si c'est aussi une mesure entière.

Nous avons fabriqué la bande pliée dont la longueur mesure $\frac{24}{8}u$

On peut résumer cette fabrication en écrivant les calcul suivants

$$\frac{12}{4}u = \frac{2 \times 12}{2 \times 4}u = \frac{24}{8}u$$

$$\frac{12}{4}u = 12u \div 4 = 3u$$

$$\frac{24}{8}u = 24u \div 8 = 3u$$

On admet que $\frac{12}{4} = \frac{2 \times 12}{2 \times 4} = \frac{24}{8}$ on admet que $\frac{12}{4} = 12 \div 4 = 3$

Les entiers peuvent être aussi des rationnels

Les rationnels sont parfois des entiers

Il y a donc une cohérence entre les nombres que nous connaissons depuis longtemps (les entiers) et les nouveaux nombres (les rationnels).

On peut répliquer la situation d'action en faisant varier la relation multiplicative entre les deux bandes à comparer (par exemple 10u en 3 et 30u en ?) et avec les autres nombres en jeu précédemment (10u en 4, 11u en 3, 12u en 5 etc.). Cependant, on va vite atteindre les limites matérielles de la situation, ce qui va conduire à modifier le rôle du schéma.

3. Modification du rôle du schéma

Le schéma qui était pour l'instant un outil pour représenter à l'écrit l'action avec le guide-âne va devenir progressivement un moyen pour réfléchir à des questions que l'on ne peut pas réaliser concrètement mais que l'on peut faire par la pensée. Cependant, il est très important de ne pas perdre le fil et, toutes les fois où c'est possible, de procéder au pliage en se servant du guide-âne (ou de pliages déjà marqués dans les bandes).

« PE : Expliquez par quelle méthode vous pouvez délimiter un segment dont la longueur mesure 10u en 3 dans une bande de 20u, de 30u, de 40u, de 100u ? Justifiez votre réponse par un raisonnement et/ou un schéma. »

$$\frac{10}{3}u = \frac{2 \times 10}{2 \times 3}u = \frac{3 \times 10}{3 \times 3}u = \frac{4 \times 10}{4 \times 3}u = \frac{10 \times 10}{10 \times 3}u$$

Les propriétés précédentes nous permettent aussi d'écrire directement les relations sur les

$$\text{nombre} \frac{10}{3} = \frac{2 \times 10}{2 \times 3} = \frac{3 \times 10}{3 \times 3} = \frac{4 \times 10}{4 \times 3} = \frac{10 \times 10}{10 \times 3}$$

Les nombres rationnels ont plusieurs écritures ! Ils sont différents des nombres entiers qui, même s'ils ont plusieurs écritures aussi (01 et 1, par exemple), en ont une que l'on utilise presque toujours

C'est une propriété essentielle des nombres rationnels

Cette propriété est institutionnalisée et mémorisée.

4. Jeux de renforcement de la propriété des rationnels et exercices

On a admis et institutionnalisé précédemment les relations entre les nombres rationnels, que l'on a appuyé sur l'étude systématique des rationnels-mesure. Il devient possible de s'interroger sur les nombres rationnels, et de revenir au rationnel-mesure pour fonder le raisonnement. Suivant l'avancée des élèves, le retour systématique au contexte de la mesure peut être plus ou moins nécessaire : schéma, technique du guide-âne.

Écritures multiples d'un rationnel

Écrire rapidement sur son ardoise plusieurs nombres rationnels égaux à un nombre donné écrit au tableau.

Intrus

Trouver rapidement l'intrus (à écrire sur l'ardoise) parmi des nombres rationnels qui sont tous égaux à un nombre rationnel donné sauf l'intrus.

Exemple : parmi les nombres $\frac{14}{8}$; $\frac{20}{8}$; $\frac{20}{14}$; $\frac{100}{40}$ lesquels sont égaux à $\frac{10}{4}$? Écrire les égalités et expliquer les non égalités par un schéma ou un raisonnement.

$\frac{14}{8}$ et $\frac{20}{14}$ ont été choisis car ils représentent des procédures additives fausses (ajouter 6 au numérateur et au dénominateur). Ils ont été choisis aussi car il est possible de raisonner à leur sujet. Si je sais que $\frac{10}{4} = \frac{20}{8}$ (relation fondamentale) alors ce n'est pas possible qu'en faisant 14 en 8 cela fasse la même longueur que 20 en 8 car la bande que l'on plie est plus longue. De même ce n'est pas possible non plus qu'en prenant 20 en 14 cela fasse la même longueur que 20 en 8 car on plie la même bande en 14 au lieu de la plier en 8.

Il est pertinent de vérifier au guide-âne tout en expliquant si au moins un élève ne semble pas suivre le raisonnement. À ce stade de la séquence, on ne peut laisser personne en chemin.

Écritures égales sous contraintes

Exercices visant à produire des écritures égales à un nombre rationnel donné et respectant certaines contraintes.

$$\frac{10}{3} = \frac{40}{?}$$

Fais un schéma pour trouver ou pour expliquer ta réponse

$$\frac{10}{3} = \frac{?}{18}$$

Fais un schéma pour trouver ou pour expliquer ta réponse

Certains élèves sont maintenant capables d'essayer de répondre à ce type de question, posée directement dans le cadre numérique, c'est bien mais il ne faut pas qu'ils rentrent dans un jeu purement formel qui n'aurait rapidement plus de sens : ils doivent faire un schéma pour expliquer leur réponse, même s'ils n'en ont pas besoin pour produire cette réponse.

D'autres élèves ont besoin d'un schéma pour trouver la réponse. Ils peuvent dessiner des segments de 10u bout-à-bout (en ligne ou non) partagés en 3, ils dessinent donc 4 segments pour arriver à 40u et peuvent compter les subdivisions : il y en a 3 et encore 3 et encore 3 et encore 3, ce qui fait 12u. Remarque : ils schématisent alors à la fois le numérateur représenté par une longueur et le dénominateur représenté par un nombre de partages, contrairement aux schéma à compléter que nous avons rencontrés dans l'introduction qui, le plus souvent, représentent déjà l'unité partagée. Lors de la correction de l'exercice, s'ils ne l'ont pas vu avant, ils feront le rapport avec 4×10 et

4x3.




Figure 8. Égalités entre nombres rationnels

III. COMPARER DES RATIONNELS

Si les rationnels sont bien des nombres, alors on doit pouvoir savoir, sans recourir toujours au guide-âne, quand deux nombres donnés sont plus petits ou plus grands. Il faut expliciter l'objectif de cette nouvelle partie de la séquence aux élèves, car ils ne sont toujours pas sûrs que ces objets sont des nombres : pour l'instant ils ont surtout des propriétés jamais rencontrées ! Dans cette partie, on inverse en fait le propos : au lieu de modéliser la mesure de la longueur des bandes pliées par un nombre, on va chercher des propriétés sur les nombres en s'appuyant sur la modélisation des bandes pliées. Je n'aurais recours aux unités de mesure que quand cela semblera nécessaire pour la signification de l'égalité.

1. Des rationnels que l'on peut comparer assez facilement

Nous allons comparer $\frac{10}{3}$ et $\frac{13}{3}$ en utilisant les bandes pliées. Pouvez-vous anticiper le résultat ? Expliquez votre réponse.

Le raisonnement est simple : $10 < 13$, on a plié une bande moins longue et une bande plus longue en trois, le résultat est donc $\frac{10}{3} < \frac{13}{3}$.

Remarque : nous n'avons pas encore fait la relation entre $\frac{10}{3}$ et $10 \times \frac{1}{3}$, on ne peut donc pas raisonner de cette manière. Cette relation sera faite le plus tard possible dans notre séquence.

Nous allons comparer $\frac{10}{3}$ et $\frac{10}{4}$ en utilisant les bandes pliées. Pouvez-vous anticiper le résultat ? Expliquez votre réponse.

Là aussi le raisonnement est simple : on a plié la même bande en parts égales, quand on fait un partage avec plus de parts alors les parts sont plus petites, le résultat est donc $\frac{10}{4} < \frac{10}{3}$.

On s'aperçoit donc que, dans quelques cas au moins, on sait comparer deux rationnels.

2. Les premiers problèmes de comparaison

a. Même partage

Nous allons comparer $\frac{10}{3}$ et $\frac{13}{6}$ en utilisant les bandes pliées. Pouvez-vous anticiper le résultat ? Expliquez votre réponse.

Le raisonnement n'est pas évident puisque $10 < 13$ mais $3 < 6$, ce qui a été établi précédemment n'est donc d'aucune utilité. Dans cette situation, pour la première fois, les élèves vont être amenés à utiliser la propriété qui permet de trouver une autre écriture d'un rationnels comme une connaissance utile (Conne, 1992).

Dans ce cas particulier (6 est multiple de 3), la solution est de se ramener à un même partage.

$$\frac{10}{3} = \frac{20}{6}$$

$$\text{Conclusion } \frac{13}{6} < \frac{10}{3}$$

b. Bandes de même longueur

Nous allons comparer $\frac{10}{3}$ et $\frac{20}{7}$ en utilisant les bandes pliées. Pouvez-vous anticiper le résultat ? Expliquez votre réponse.

Le raisonnement n'est pas évident puisque $10 < 20$ mais $3 < 7$. Dans ce cas particulier (20 est multiple de 10), la solution est de se ramener à une bande de même longueur.

$$\frac{10}{3} = \frac{20}{6}$$

$$\text{Conclusion } \frac{20}{7} < \frac{10}{3}$$

Il est théoriquement possible d'aborder alors la comparaison dans le cas général, cependant il ne me semble pas pertinent, au CM, d'automatiser ces calculs, ils le seront en fin de cycle 3 et au cycle 4, au collège. Le risque de la perte de sens augmente avec la complexité des calculs.

En conclusion de cette recherche plusieurs conclusions peuvent être tirées

On peut comparer les rationnels, ce qui est important pour qu'ils puissent bien être considérés comme des nombres

Cette comparaison est parfois facile parfois difficile, il faut utiliser la propriété pour obtenir des égalités de rationnels

3. Comparaison entre rationnels et entiers

Jusqu'à présent, nous n'avons pas considéré les entiers de manière particulière, en particulier, $\frac{12}{4}$ et $\frac{12}{3}$, qui sont des entiers, n'ont pas été traités de façon différente que $\frac{10}{4}$ et $\frac{10}{3}$ qui ne sont pas des entiers et, dans le dernier cas, n'est pas un décimal. En effet, dans le contexte du partage égal des bandes par le procédé du guide-âne, les entiers n'ont pas de statut particulier.

Cependant, depuis le début, sur la règle graduée informable, nous avons marqué les points correspondant aux intersections avec les lignes du guide-âne et nous avons pu comparer la position de ces points dans le repère de la règle, par rapport aux graduations entières. Il s'agissait jusque-là d'une simple constatation.

Nous allons maintenant poser la question de façon explicite.

Nous voulons encadrer $\frac{10}{3}$ entre deux nombres entiers en utilisant les bandes pliées. Pouvez-vous anticiper le résultat ? Expliquez votre réponse.

Deux solutions sont possibles.

a. Relation fondamentale et division

Nous savons que $\frac{10}{3} \times 3 = 10$ c'est la relation fondamentale. Si nous faisons la division euclidienne de 10 par trois, nous obtenons $10 = 3 \times 3 + 1$. On peut en déduire que $\frac{10}{3}$ est plus grand que 3 ($3 \times 3 = 9$) et plus petit que 4 ($4 \times 3 = 12$).

b. Propriété des rationnels et division

Nous avons déjà rencontré la relation entre des entiers et des rationnels (12 en 3, 12 en 4) et la division. Nous pouvons donc écrire des entiers sous une forme rationnelle.

$$3 = 9 \div 3 = \frac{9}{3}$$

$$4 = 12 \div 3 = \frac{12}{3}$$

Nous pouvons donc en déduire que

$$\frac{9}{3} < \frac{10}{3} < \frac{12}{3}$$

C'est-à-dire

$$3 < \frac{10}{3} < 4$$

Remarque : nous pouvons dire que $\frac{10}{3} = \frac{3 \times 3 + 1}{3}$, mais nous ne savons pas quoi en déduire. Nous n'avons pour l'instant aucun moyen de savoir ce qui se « distribue » ou pas. On ne peut pas encore faire le rapport avec la multiplication par $\frac{1}{3}$, qui ne sera étudiée qu'au collège. Il est important de ne pas considérer comme « évident » ce qui ne peut pas se justifier dans le contexte de la situation fondamentale.

IV. ADDITION DES RATIONNELS

Il s'agit de la dernière partie de la séquence, conformément aux programmes de 2015. Si les rationnels sont des nombres alors on peut les additionner. Le raisonnement va être très proche de celui de la partie précédente, ce qui va renforcer les techniques à l'œuvre.

1. Des rationnels que l'on peut additionner facilement

Une situation de communication

Pour introduire l'addition, nous pouvons engager les élèves dans une situation de communication. En effet, nous n'avons pas encore fait le rapport entre $\frac{10}{3}$ et $\frac{1}{3} \times 10$. Il faut donc trouver un autre moyen pour comprendre le résultat. Cela va nous permettre de rencontrer la relation fondamentale comme une connaissance utile. Un rationnel-mesure est défini dans notre cadre par la mesure d'une longueur (un nombre dans un système d'unité donné) et un nombre qui définit le partage sur le guide-âne.

Des bandes déjà découpées de différentes longueurs (10u, 11u, 12u, 13u), toutes pliées en 3, sont disponibles en nombre suffisant pour chaque groupe d'élèves. Chaque groupe d'élèves dispose d'un guide-âne. On organise une communication écrite entre un groupe d'émetteurs et un groupe de récepteurs. Pour éviter les communications orales intempestives, les élèves ne savent pas qui va recevoir leur message, qui est transmis par le PE.

« PE : « Vous allez mettre bout-à-bout deux bandes pliées. Vous devez écrire un message pour que le groupe qui va le lire puisse fabriquer une bande pliée qui aura la même longueur que celle que vous avez fabriquée en mettant bout à bout vos deux bandes pliées. Vous pouvez découper les bandes pliées si besoin »

Pour trouver la longueur de la bande qu'il faut plier, il faut retravailler sur la relation fondamentale des rationnels. Si l'on a choisi par exemple de mettre bout à bout une bande de 10u pliée en 3 et une bande de 11u pliée en 3, il faut réorganisant physiquement ou schématiquement les morceaux de bande pliées, dont la longueur totale mesure 21u. Le schéma ou le découpage et la recomposition permettent de constater qu'il faut désigner une bande de 21u pliée en 3.




Figure 9. Addition de rationnels

$$\frac{10}{3} + \frac{11}{3} = \frac{10+11}{3} = \frac{21}{3}$$

Certains élèves peuvent se laisser entrainer par les nombres en jeu et penser que le résultat doit être $\frac{10}{3} + \frac{11}{3} = \frac{10+11}{3+3} = \frac{21}{6}$. Ils ont tort, ce qu'ils peuvent comprendre à la fois par le raisonnement et par la validation dans le milieu : le dépassement de cette erreur fait partie de l'apprentissage, non seulement pour ceux qui l'ont commise mais aussi pour les autres élèves. En effet, dans le contexte des bandes et du guide-âne, certains élèves ne feront pas cette erreur mais ils pourront la faire dans un contexte purement numérique. Ils doivent pouvoir se souvenir que c'est faux et pourquoi c'est faux.

2. Multiplication d'un rationnel par un entier

Nous voulons multiplier $\frac{10}{4}$ par 3 en mettant bout à bout des bandes pliées. Pouvez-vous anticiper le résultat ? Expliquez votre réponse.

Il faut mettre bout à bout 3 bandes pliées. On peut remarquer au passage que cela sera en tout cas plus petit que 10, car il y faut une bande pliée de plus pour faire 10 (relation fondamentale).

Nous savons additionner les rationnels quand ils représentent un partage par le même nombre.

$$3 \times \frac{10}{4} = \frac{10}{4} + \frac{10}{4} + \frac{10}{4} = \frac{10+10+10}{4} = \frac{3 \times 10}{4}$$

Il n'est peut-être pas pertinent au CM de systématiser cette propriété, surtout hors d'un contexte dans lequel elle a du sens. Comme c'était le cas pour l'addition (non répétée) la même erreur peut se produire pour les mêmes raisons et certains élèves peuvent répondre :

$$3 \times \frac{10}{4} = \frac{3 \times 10}{3 \times 4}$$

Ils ont tort et cela fait aussi partie de l'apprentissage que de le savoir et aussi de comprendre les raisons qui fondent le résultat correct.

CONCLUSION

1. Relation avec les fractions

Même si notre séquence n'est pas à proprement parler sur les « fractions », puisque nous n'avons pas fractionné l'unité, nous sommes en fait restés au plan numérique dans le domaine de ce qui peut être modélisé par des « fractions simples » au sens du document d'accompagnement de programme, en prenant toujours un petit nombre de parts (Ministère de l'Éducation nationale, 2016a) : « lors que le partage de l'unité se fait en un petit nombre de parts (2, 3, 4, ...) et que l'on prend un petit nombre de telles parts, on parle de fraction simple : $\frac{2}{3}, \frac{5}{4}, \frac{3}{10}$, etc. [en note de bas de page : la notion de « fraction simple » n'est pas définie de manière précise en mathématiques] » (p.1).

La relation avec les fractions demande de fractionner l'unité, c'est-à-dire de partager une bande dont la longueur mesure 1 unité. Sur les photos, la longueur de l'unité choisie mesure 2cm, ce qui permet le partage en 4 avec un guide-âne avec des parallèles espacées d'au plus 0,5cm.

Il est alors possible de faire la relation entre ce que l'on appelle d'habitude un quart et le rationnel $\frac{1}{4}$ (un en 4) et de même pour les autres fractions « usuelles ». Puisque les élèves connaissent la multiplication par un entier, il est alors possible de retrouver la relation avec $10 \times \frac{1}{4} = \frac{10}{4}$. On pourra donc lire $\frac{10}{4}$ dix quarts pour satisfaire à l'usage, sans oublier toutefois que dix quarts (10 quarts d'unité) est aussi dix en quatre (10 unités partagées en 4).

2. Rôle de la situation fondamentale

Mon ambition dans cet article, même si la séquence est assez détaillée, est de montrer comment un enseignant pourrait s'appuyer sur la situation fondamentale du guide-âne pour fonder un enseignement des fractions correspondant aux objectifs mathématiques qui sont ceux du début du cycle 3 (CM1 et CM2). Il y a d'autres solutions possibles, cette description n'est pas un « carcan ».

Cependant, il me semble très important, contrairement à ce qui se produit très souvent dans les classes, de ne pas considérer la situation du guide-âne comme une « manipulation » qui ne sert qu'à une introduction et qui peut être écartée rapidement. Dans ce texte, je me suis toujours référée à la situation de partage permise par le guide-âne et la référence à la mesure de longueur est restée essentielle jusqu'à la fin de la séquence.

La situation fondamentale du partage et, dans celle-ci, la validation par le milieu du guide-âne, est indispensable pour comprendre les propriétés des objets étranges que l'on a construit. Plus la référence à la situation fondamentale est forte pour les élèves et plus ils auront, plus tard, la possibilité de remédier eux-mêmes aux erreurs qu'ils pourraient être tentés de faire.

Abandonner trop vite la validation par le milieu pourrait compromettre les apprentissages des élèves les plus fragiles : ceux qui ont un rapport délicat avec l'écrit, ceux qui sont plus lents, ceux qui ont tendance à penser qu'il n'y a rien à comprendre en mathématiques. Il vaut mieux attendre que les élèves, même les plus fragiles, soient exaspérés par le retour constant au milieu pour la validation et qu'ils interdisent au professeur d'y avoir recours...

3. Un travail en cours

Ce texte représente une ébauche, même si la réflexion qui le nourrit est plus ancienne et provient tout particulièrement de la nécessité, en formation des enseignants, de trouver un compromis entre les instructions officielles et les ingénieries les plus originales et les plus fécondes.

Ce travail a été rendu possible et nécessaire dans le contexte de la conception de la formation des référents mathématiques circonscription de l'Académie de Clermont-Ferrand, dont la responsable, Stéphanie Tinayre (IEN) a conçu le dispositif et encouragé un travail de qualité dans d'excellentes conditions. Dans cette formation, l'association de formateurs de statuts variés : premier degré (PE, PEMF, conseillers pédagogiques) et second degré, a permis la conduite d'une réflexion à la fois concrète et rigoureuse dont cet article est, je l'espère, le reflet. C'est à la demande des référents mathématiques que je l'ai écrit car sur un sujet délicat, il est important de disposer d'un écrit.

Peut-être que ce texte inspirera des déclinaisons en classe, c'est son ambition. En l'état, ce n'est qu'une proposition didactique.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Anselmo, B., Bonnet, M., Colonna, A., Combier, G., Latour, J., & Planchette, P. (1999). *La sixième entre fractions et décimaux*. IREM de Lyon.
- Anselmo, B., & Zucchetta, H. (Éd.). (2018). *Construire les nouveaux nombres au cycle 3. Fractions et décimaux*. Réseau Canopé/ IREM de Lyon.
- Artaud, M. (à paraître). Besoins praxéologiques de la profession : Le cas des grandeurs et de leur mesure. In H. Chaachoua (Éd.), Actes de la 20e école d'été de didactique des mathématiques—Titre provisoire. La Pensée Sauvage.
- Barilly, B., & Le Poche, G. (2012). Les fractions. In J.-L. Durpaire & M. Mégard (Éd.), *Le nombre au cycle 3* (p. 82-96). Paris: SCÉRÉN CRDP-CNDP.
- Bessot, A. (2011). L'ingénierie didactique au coeur de la théorie des situations. In C. Margolinas, M.

- Abboud-Blanchard, L. Bueno-Ravel, N. Douek, A. Fluckiger, P. Gibel, & F. Wozniak (Éd.), *En amont et en aval des ingénieries didactiques* (p. 29-56). Grenoble: La pensée sauvage.
- Brousseau, G. (1980). Problèmes de didactique des décimaux : première partie. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 1(1), 11-59.
- Brousseau, G. (1981). Problèmes de didactique des décimaux : deuxième partie. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 2(1), 37-127.
- Brousseau, G., & Brousseau, N. (1987). *Rationnels et décimaux dans la scolarité obligatoire*. Consulté à l'adresse <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00610769/fr/>
- Brousseau, G., Brousseau, N., & Warfield, G. (2014). *Teaching Fractions through Situations: A Fundamental Experiment*. Dordrecht Heidelberg New-York London: Springer.
- Conne, F. (1992). Savoir et connaissance dans la perspective de la transposition didactique. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 12(2-3), 221-270.
- Margolinas, C. (1993). *De l'importance du vrai et du faux dans la classe de mathématiques*. Grenoble: La pensée sauvage.
- Matheron, Y., & Salin, M.-H. (2002). Les pratiques ostensives comme travail de construction d'une mémoire officielle de la classe dans l'action enseignante. *Revue Française de Pédagogie*, 141, 57-66.
- Ministère de l'Éducation nationale. (2016a). *Fractions et nombres décimaux au cycle 3*. Consulté à l'adresse http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf
- Ministère de l'Éducation nationale. (2016b). *Fractions et nombres décimaux au cycle 3/ Annexe 5: le guide-âne*. Consulté à l'adresse http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/42/4/RA16_C3_MATH_frac_de_c_annexe_5_673424.pdf
- Ratsimba-Rajohn, H. (1982). Éléments d'étude de deux méthodes de mesures rationnelles. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 3(1), 65-113.
- Salin, M.-H., & Greslard, D. (1998). La collaboration entre chercheurs et enseignants dans un dispositif original d'observation de classes, et lors de la préparation d'une séquence de classe, le Centre d'Observation et de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (COREM). Consulté 11 novembre 2014, à l'adresse Les liens entre la pratique de la classe et la recherche en didactique des mathématiques, 50e Rencontre de la CIEAM website: <http://guy-brousseau.com/wp-content/uploads/2010/08/Collaboration-entre-chercheurs-et-enseignants.pdf>
- Sensevy, G. (1998). *Institutions didactiques: étude et autonomie à l'école élémentaire*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Sensevy, G. (1997). Un prototype d'ingénierie didactique: le Journal des Fractions. *Publications de l'institut de recherche mathématiques de Rennes, fascicule 3*(Fascicule de didactique des mathématiques et de l'E.I.A.O). Consulté à l'adresse http://www.numdam.org/article/PSMIR_1997-1998__3_45_0.pdf
- Wozniak, F. (à paraître). « Grandeurs et mesures » un domaine connexe à la statistique : Impact sur le curriculum. In H. Chaachoua (Éd.), Actes de la 20e école d'été de didactique des mathématiques—Titre provisoire. La Pensée Sauvage.

ANNEXE 1

DOCUMENTS RECUEILLIS PAR DES GROUPES D'ÉTUDIANTS DE M1 MEEF – ESPE CLERMONT-AUVERGNE EN 2018-2019

CM1

Zoé

Exercice n°1 : Quelle fraction de chaque figure représente la partie grise ?

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{7}{16}$

Exercice n°2 : Colorie ce qui représente chaque fraction.

$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{6}$

$\frac{2}{7}$	$\frac{3}{10}$

Exercice n°3 : Colorie la fraction demandée.

$\frac{4}{8}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{3}{6}$

Exercice n°4 : Petite problèmes

Trois enfants ont reçu chacun une plaque de chocolat identique :

Paméo a mangé $\frac{1}{2}$ de sa plaque.

Mario a mangé les $\frac{4}{9}$ de la sienne.

Sarah les $\frac{2}{3}$.

Colorie les colonnes comme il convient.

Qui est le plus gourmand ? Le plus gourmand est Mario

Exercice n°5 : Colorie les fractions égales à 1.

$\frac{5}{2}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{9}{11}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{10}{4}$	$\frac{100}{100}$	$\frac{7}{5}$	$\frac{3}{3}$
---------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------	---------------

Exercice n°6 : Compare les fractions en utilisant les signes : > ou <

$\frac{3}{2} > \frac{1}{2}$	$\frac{7}{2} > \frac{3}{2}$	$\frac{1}{5} < \frac{4}{5}$	$\frac{5}{4} > \frac{3}{4}$	$\frac{4}{6} < \frac{5}{6}$
$\frac{7}{8} > \frac{2}{8}$	$\frac{2}{5} < \frac{7}{5}$	$\frac{3}{10} < \frac{5}{10}$	$\frac{8}{10} > \frac{4}{10}$	$\frac{76}{99} > \frac{50}{99}$

Exercice n°7 : Complète avec les signes : > ou <

$\frac{2}{3} < 1$	$\frac{4}{8} < 1$	$\frac{7}{5} > 1$	$\frac{6}{5} > 1$	$\frac{12}{10} > 1$
$\frac{8}{9} > 1$	$\frac{4}{4} = 1$	$\frac{6}{8} < 1$	$\frac{3}{10} < 1$	$\frac{8}{7} < 1$

CM2



Nombres ⑤



Exercice n° 1
 Écris en lettres



a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{7}{3}$ c) $\frac{2}{6}$ d) $\frac{9}{9}$ e) $\frac{1}{4}$ f) $\frac{3}{7}$ g) $\frac{12}{15}$ h) $\frac{8}{2}$ i) $\frac{50}{100}$

quatre cinquièmes sept tiers deux sixièmes
 sept trois sur trois un quart deux septièmes
 deux quatrièmes huit dixième cinquante centièmes

Exercice n° 2
 Colorie la partie correspondant à chaque fraction

a) $\frac{1}{4}$  d) $\frac{1}{3}$ 

b) $\frac{2}{5}$  e) $\frac{1}{2}$ 

c) $\frac{6}{10}$  f) $\frac{7}{7}$ 

Exercice n° 3
 Écris les fractions dictées par le maître

$\frac{3}{2}$ $\frac{6}{3}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{12}{2}$ $\frac{3}{100}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{7}{4}$