



HAL
open science

Remarks on the spectrum of the Dirac operator

Nicolas Ginoux

► **To cite this version:**

Nicolas Ginoux. Remarks on the spectrum of the Dirac operator. *Comptes Rendus. Mathématique*, 2003, 337 (1), pp.53-56. 10.1016/S1631-073X(03)00278-4 . hal-03117215

HAL Id: hal-03117215

<https://hal.science/hal-03117215>

Submitted on 21 Jan 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Remarques sur le spectre de l'opérateur de Dirac

Nicolas Ginoux

21 janvier 2021

Résumé : Nous décrivons une nouvelle famille d'exemples d'hypersurfaces de la sphère satisfaisant le cas d'égalité de la majoration extrinsèque de C. Bär de la plus petite valeur propre de l'opérateur de Dirac.

Remarks on the spectrum of the Dirac operator

Abstract : We describe a new family of examples of hypersurfaces in the sphere satisfying the limiting-case in C. Bär's extrinsic upper bound for the smallest eigenvalue of the Dirac operator.

Soit (M^m, g) une hypersurface riemannienne compacte orientée (de dimension m) de l'espace-modèle $(\widetilde{M}^{m+1}(c), g)$, où $\widetilde{M}^{m+1}(0) := \mathbb{R}^{m+1}$ (l'espace euclidien), $\widetilde{M}^{m+1}(1) := S^{m+1}$ (la sphère ronde à courbure sectionnelle 1), et $\widetilde{M}^{m+1}(-1) := \mathbb{H}^{m+1}$ (l'espace hyperbolique à courbure sectionnelle -1). Soit λ_1 la plus petite valeur propre de l'opérateur de Dirac sur M associé à g et à la structure spinorielle induite. Il est en général impossible de donner une expression explicite pour cette valeur propre. Il a cependant été démontré que la courbure moyenne H ainsi que la courbure ambiante la majorent de manière naturelle; plus précisément, C. Bär a montré dans [2] que

$$\lambda_1^2 \leq \frac{m^2}{4\text{Vol}(M)} \int_M H^2 v_g \quad \text{si } \widetilde{M} = \mathbb{R}^{m+1}, \quad (1)$$

$$\lambda_1^2 \leq \frac{m^2}{4\text{Vol}(M)} \int_M (H^2 + 1)v_g \quad \text{si } \widetilde{M} = S^{m+1}, \quad (2)$$

et l'auteur a prouvé dans [11, 10] que

$$\lambda_1^2 \leq \frac{m^2}{4} (\sup_M H^2 - 1) \quad \text{si } \widetilde{M} = \mathbb{H}^{m+1}. \quad (3)$$

Si (1) et (2) (resp. (3)) montrent une forte analogie avec les majorations de R.C. Reilly [16] (resp. de E. Heintze [12]) pour la première valeur propre non nulle du laplacien scalaire, on peut se demander jusqu'où va cette ressemblance, et si en particulier l'égalité dans (1), (2) ou (3) n'est atteinte que lorsque M est *minimalement* immergée dans une sphère géodésique, comme c'est le cas pour le laplacien [16, 12, 6]. Il a été démontré dans [2] (resp. dans [11]) que, si (1) ou (2) (resp. (3)) est une égalité, alors la courbure moyenne H est constante, et que l'égalité a lieu si M est une sphère géodésique; néanmoins, le problème de savoir si cette hypersurface est *la seule* à jouir de cette propriété est à ce jour demeuré ouvert.

Nous montrons dans cette note que l'égalité dans (2) lorsque M n'est pas une sphère géodésique n'entraîne pas la minimalité de M dans S^{m+1} . Nous exhibons une famille d'exemples à cet effet.

Ce travail a été effectué à l'Institut Max-Planck pour les Mathématiques dans les Sciences de Leipzig, que l'auteur tient à remercier pour son soutien et son hospitalité. C'est aussi un plaisir de remercier Oussama Hijazi pour son soutien et pour sa lecture critique de l'article.

1 Structures spinorielles sur les sous-variétés

Pour les préliminaires sur la géométrie spinorielle, on se reportera par exemple à [13, 5, 4, 8].

Nous commençons par rappeler quelques éléments de base sur la restriction de structures spinorielles (cf. aussi [2, 15, 10]). Tout d'abord, si E et F sont deux fibrés vectoriels riemanniens sur une variété donnée, la présence d'une structure spinorielle sur deux des fibrés E , F , $E \oplus F$, induit une structure spinorielle sur le troisième ([14] et [13], Prop. 2.15 p. 90). Cela a deux conséquences importantes dans les exemples que nous allons étudier.

D'une part, tout produit riemannien de deux variétés spinorielles porte une structure spinorielle naturelle appelée *structure spinorielle produit*. On peut même montrer que toute structure spinorielle sur un produit riemannien est en fait une structure spinorielle produit.

D'autre part, toute sous-variété riemannienne à fibré normal *trivial* d'une variété riemannienne spinorielle porte une structure spinorielle induite. Nous insistons ici sur le fait que cette structure spinorielle dépend de la trivialisatation du fibré normal choisie [3]. C'est pourquoi nous précisons toujours ce choix.

Nous aurons également besoin de l'observation suivante. Soient $E_1 \rightarrow M'$ et $E_2 \rightarrow M'$ deux fibrés vectoriels réels triviaux sur une variété M' , de rangs respectifs n_1 et n_2 . Soit (X_1, \dots, X_{n_1}) (resp. $(X_{n_1+1}, \dots, X_{n_1+n_2})$) une trivialisatation de E_1 (resp. de E_2) et supposons la variété M' spinorielle. Toute trivialisatation d'un fibré vectoriel munissant celui-ci de la structure spinorielle triviale, (X_1, \dots, X_{n_1}) (resp. $(X_{n_1+1}, \dots, X_{n_1+n_2})$) induit d'après ce qui précède une structure spinorielle sur le fibré $TM' \oplus E_1$ (resp. sur $TM' \oplus E_2$). De même, la trivialisatation $(X_1, \dots, X_{n_1+n_2})$ de $E_1 \oplus E_2$ induit une structure spinorielle sur $TM' \oplus (E_1 \oplus E_2)$. Mais $TM' \oplus (E_1 \oplus E_2) = (TM' \oplus E_1) \oplus E_2$, donc $TM' \oplus (E_1 \oplus E_2)$ porte aussi la structure spinorielle induite par celle de $TM' \oplus E_1$ et par $(X_{n_1+1}, \dots, X_{n_1+n_2})$. La remarque est que ces deux structures *coïncident*. Cela s'applique en particulier à la restriction de structures spinorielles à une sous-variété à fibré normal trivial (voir ci-dessous).

2 Une famille d'exemples d'hypersurfaces non minimales satisfaisant l'égalité dans (2)

Nous décrivons maintenant les exemples cités en introduction. Soient p, q deux entiers naturels non nuls, et r, r' deux réels strictement positifs. Considérons la variété $M := S^p(r) \times S^q(r')$, où $S^k(R)$ désigne la sphère ronde de dimension k et de rayon R . Notons g la métrique produit sur M , et munissons M de la structure spinorielle produit. Rappelons que, lorsque $k > 1$, il n'existe qu'une seule structure spinorielle sur $S^k(R)$, alors que si $k = 1$, la variété $S^k(R)$ porte deux structures spinorielles non équivalentes, une triviale et une non triviale. Cette dernière est celle qui est induite par le plongement standard $S^1(R) \subset \mathbb{R}^2$. Nous choisirons toujours lorsque $k = 1$ la structure spinorielle *non triviale* sur $S^k(R)$.

Pour la structure spinorielle produit que l'on a fixée sur M , le spectre du carré de l'opérateur de Dirac D_M de (M, g) est l'ensemble des $\mu_k^2 + \mu_{l'}^2$, où μ_k (resp. $\mu_{l'}$) décrit le spectre de l'opérateur de Dirac sur $S^p(r)$ (resp. sur $S^q(r')$) (cela est une propriété générale des produits riemanniens, cf. [1]). En utilisant [17], le spectre de D_M^2 est donc


$$\left\{ \frac{1}{r^2} \left(\frac{p}{2} + n \right)^2 + \frac{1}{r'^2} \left(\frac{q}{2} + n' \right)^2, \quad n, n' \in \mathbb{N} \right\}.$$

En particulier, la plus petite valeur propre de D_M^2 est $\lambda_1^2 = \frac{p^2}{4r^2} + \frac{q^2}{4r'^2}$.

Pour un réel u dans $]0, \frac{\pi}{2}[$, posons $r := \cos(u)$, $r' := \sin(u)$, et notons $M_u := S^p(\cos(u)) \times S^q(\sin(u))$. La variété (M_u, g) se plonge alors canoniquement et isométriquement dans $S^{p+q+1}(1)$. De plus, la structure spinorielle induite par ce plongement coïncide avec la structure spinorielle produit que l'on a fixée sur M_u . Pour montrer cela, distinguons deux cas.

a) Si $p > 1$ et $q > 1$, la structure spinorielle de M_u est unique car M_u est simplement connexe.

b) Si $p = 1$ (le raisonnement sera identique si $q = 1$), la situation est un peu plus compliquée puisque M_u porte plusieurs structures spinorielles. Considérons le diagramme commutatif suivant dans lequel les flèches sont les inclusions standard :



Nous devons déterminer si la structure spinorielle induite par $S^{p+q+1}(1)$ sur M_u se restreint à son tour sur $S^1(r)$ en une structure spinorielle triviale ou non, cette dernière restriction étant réalisée au moyen de la trivialisaton naturelle (compatible avec les orientations) du fibré normal de $S^1(r)$ dans M_u . Par définition, la structure spinorielle induite par $S^{p+q+1}(1)$ sur M_u est donnée par la trivialisaton du fibré normal de M_u dans $S^{p+q+1}(1)$; par suite (cf. paragraphe 1), celle induite par M_u sur $S^1(r)$ est également induite par $S^{p+q+1}(1)$ sur $S^1(r)$ au moyen de la trivialisaton de son fibré normal dans $S^{p+q+1}(1)$. Or la structure spinorielle de $S^{p+q+1}(1)$ provient elle-même de la structure spinorielle de \mathbb{R}^{p+q+2} par l'inclusion canonique $S^{p+q+1}(1) \subset \mathbb{R}^{p+q+2}$; la structure spinorielle induite par M_u sur $S^1(r)$ est donc aussi celle induite sur $S^1(r)$ par l'inclusion canonique $S^1(r) \subset \mathbb{R}^{p+q+2}$ au moyen de la trivialisaton naturelle du fibré normal de ce plongement.

Mais cette dernière trivialisaton est également obtenue en juxtaposant les trivialisatons des fibrés normaux respectifs de $S^1(r)$ dans \mathbb{R}^2 et de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R}^{p+q+2} (où $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2 \times \{0\} \subset \mathbb{R}^{p+q+2}$); comme \mathbb{R}^2 porte évidemment la structure spinorielle induite par la trivialisaton canonique de son fibré normal dans \mathbb{R}^{p+q+2} , et que le plongement naturel $S^1(r) \subset \mathbb{R}^2$ induit une structure spinorielle *non triviale* sur $S^1(r)$, la structure spinorielle induite sur M_u induit donc à son tour une structure spinorielle non triviale sur chacun des facteurs de dimension 1.

Par conséquent, la première valeur propre λ_1 de l'opérateur de Dirac de M_u pour la structure spinorielle induite satisfait

$$\lambda_1^2 = \frac{p^2}{4 \cos(u)^2} + \frac{q^2}{4 \sin(u)^2}.$$

Or un calcul élémentaire du carré de la courbure moyenne de M_u dans $S^{p+q+1}(1)$ donne

$$H^2 = \frac{1}{(p+q)^2} \left(p \tan(u) - \frac{q}{\tan(u)} \right)^2,$$

d'où

$$\lambda_1^2 = \frac{(p+q)^2}{4} (H^2 + 1),$$

ce qui n'est rien d'autre que l'égalité dans (2).

Nous obtenons donc une situation radicalement différente de celle du laplacien scalaire, puisqu'il n'existe qu'un seul u dans $]0, \frac{\pi}{2}[$ pour lequel la première valeur propre non nulle du laplacien scalaire de (M_u, g) satisfait l'égalité dans la majoration de R.C. Reilly [16], à savoir celui pour lequel M_u est *minimale* dans $S^{p+q+1}(1)$. Cette dissemblance, qui vient s'ajouter à celle déjà observée par l'auteur [11] sur la question d'une possible amélioration de (3) en une majoration L^2 optimale (cf. aussi [9]), semblerait indiquer une plus grande diversité de résultats pour l'opérateur de Dirac dans les problèmes d'estimations extrinsèques des petites valeurs propres. Ce dernier point rejoint par ailleurs la différence observée pour l'étude du cas d'égalité dans la minoration (intrinsèque) de T. Friedrich [7] de la plus petite valeur propre de l'opérateur de Dirac en fonction de la courbure scalaire (voir [5, 8] pour ces questions).

Références

- [1] M.F. Atiyah, *Eigenvalues of the Dirac operator*, Lect. Notes in Math. **1111** (1985), 251–260.
- [2] C. Bär, *Extrinsic Bounds for Eigenvalues of the Dirac Operator*, Ann. Glob. Anal. Geom. **16** (1998), 573–596.
- [3] ———, discussions privées.
- [4] H. Baum, T. Friedrich, R. Grunewald, I. Kath, *Twistor and Killing Spinors on Riemannian Manifolds*, Teubner-Texte zur Mathematik **124** (1991), Teubner-Verlag Stuttgart/Leipzig.

- [5] J.-P. Bourguignon, O. Hijazi, J.-L. Milhorat, A. Moroianu, *A Spinorial approach to Riemannian and Conformal Geometry* (en préparation).
- [6] A. El Soufi, S. Ilias, *Une inégalité de type Reilly pour les sous-variétés de l'espace hyperbolique*, Comment. Math. Helv. **67** n^o2 (1992), 167–181.
- [7] T. Friedrich, *Der erste Eigenwert des Dirac-Operators einer kompakten riemannschen Mannigfaltigkeit nichtnegativer Skalar­krümmung*, Math. Nach. **97** (1980), 117–146.
- [8] ———, *Dirac operators in Riemannian geometry*, Graduate Studies in Mathematics **25** (2000), American Mathematical Society.
- [9] N. Ginoux, *Reilly-type spinorial inequalities*, Math. Zeit. **241** n^o3 (2002), 513–525.
- [10] ———, *Opérateurs de Dirac sur les sous-variétés*, Thèse de doctorat (2002), Université Henri Poincaré, Nancy.
- [11] ———, *Une nouvelle estimation extrinsèque du spectre de l'opérateur de Dirac* (soumis).
- [12] E. Heintze, *Extrinsic upper bound for λ_1* , Math. Ann. **280** (1988), 389–402.
- [13] H.B. Lawson, M.-L. Michelsohn, *Spin Geometry*, Princeton University Press (1989).
- [14] J. Milnor, *Remarks concerning spin manifolds*, Princeton University Press (1965), 55–62.
- [15] B. Morel, *Eigenvalue Estimates for the Dirac-Schrödinger Operators*, J. Geom. Phys. **38** (2001), 1–18.
- [16] R.C. Reilly, *On the first eigenvalue of the Laplacian for compact submanifolds of Euclidean space*, Comment. Math. Helv. **52** (1977), 525–533.
- [17] S. Sulanke, *Berechnung des Spektrums des Quadrates des Dirac-Operators auf der Sphäre und Untersuchungen zum ersten Eigenwert von D auf 5-dimensionalen Räumen konstanter positiver Schnittkrümmung*, Dissertation (1981), Humboldt-Universität, Berlin.

Nicolas GINOUX

Universität Hamburg, FB Mathematik - SPAD, Bundesstraße 55 D-20146 Hamburg
 fmcw191@math.uni-hamburg.de