



HAL
open science

Contribution de l'ovalisation des racines à l'ancrage du Pin maritime en sol sableux

Clément Saint Cast, Pauline Defossez, Céline Meredieu, Loïc L. Pages, Ming
Yang, Frédéric Danjon

► **To cite this version:**

Clément Saint Cast, Pauline Defossez, Céline Meredieu, Loïc L. Pages, Ming Yang, et al.. Contribution de l'ovalisation des racines à l'ancrage du Pin maritime en sol sableux. 5èmes journées du GDR 3544 " Sciences du bois ", Nov 2016, Bordeaux, France. hal-03152098

HAL Id: hal-03152098

<https://hal.science/hal-03152098>

Submitted on 25 Feb 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Contribution de l'ovalisation des racines à l'ancrage du Pin maritime en sol sableux

SAINT CAST Clément^{1,2}, DEFOSSEZ Pauline², MEREDIEU Céline¹,
PAGES Loïc³, YANG Ming², DANJON Frédéric¹

¹BIOGECO, INRA, Univ. Bordeaux, 33610 Cestas, France

²ISPA, INRA, Bordeaux Science Agro, 33140 Villenave d'Ornon, France

³PSH, INRA, 84914 Avignon, France

clement.saint-cast@u-bordeaux.fr

Mots clefs : Architecture racinaire, stabilité mécanique, *Pinus pinaster*, acclimatation, biomécanique, ABAQUS, modèle de développement

L'architecture racinaire des arbres présente une diversité importante entre espèces (systèmes racinaires pivotants, traçants,...). Au cours du développement de l'arbre, l'architecture racinaire se complexifie en fonction des stades de croissance et des conditions pédologiques (texture, humidité, richesse...). De plus, le système racinaire subit indirectement les contraintes exercées par le vent sur les parties aériennes. Il répond à ces stimuli mécaniques par des modifications structurelles (ovalisation, croissance radiale, propriétés mécaniques du bois...). Cette acclimatation au vent permet à l'arbre d'augmenter sa résistance au déracinement (Danjon et al., 2005).

Depuis une trentaine d'années, des modèles de croissance racinaire sont développés (Dunbabin et al., 2013). Parallèlement, des modèles de biomécanique (Dupuy et al., 2007 ; Yang et al., 2014) ont été créés afin de modéliser la mécanique de la structure d'un système ramifié. Or, pour comprendre les mécanismes en jeu dans la stabilité des arbres au cours de leur développement, il faut simuler conjointement les dynamiques de développement des racines soumises à des sollicitations externes et leur comportement mécanique.

Notre objectif final consistera à coupler deux modèles, l'un décrivant la croissance racinaire et l'autre la mécanique du système tronc-sol-système racinaire. Notre espèce modèle est le pin maritime, en sols sableux, pour laquelle nous disposons d'une grande base de données de systèmes racinaires numérisés en 3D (Danquechin Dorval et al., 2016), un modèle de croissance racinaire (Root Typ ; Pagès et al., 2004) et un modèle biomécanique (RootAnchor ; Yang et al., 2014, 2016). Ce dernier a déjà été calibré pour cette espèce et la possibilité d'utilisation de section ovale a été implémentée. Il s'agira de calculer des distributions de paramètres à partir de la base de données (BDD) de système racinaire structurée en chronoséquence afin de calibrer le modèle de croissance racinaire pour le pin maritime, puis d'examiner le comportement mécanique des systèmes racinaires simulés dans le modèle biomécanique.

Dans cette première étude, nous nous sommes intéressés au gain en résistance apporté par l'ovalisation des racines. Pour cela, des maquettes simplifiées de systèmes racinaires de pins maritimes de 13 ans, ont été construites à partir de données d'arbres semés de 10 m de haut (Danquechin Dorval et al. 2016). Nous avons décrit la distribution spatiale de l'ovalisation au niveau du système racinaire (Fig. 1) en utilisant les données de la BDD.

Le gain de résistance de cette acclimatation a été quantifié en réalisant des treuillages virtuels dans la direction du vent dominant en comparant les maquettes avec et sans ovalisation à volume de racines constant.




Fig. 1 : Représentation graphique du pourcentage d'ovalisation pour un système racinaire de pin maritime de 13 ans, vue de dessus.

Références

Danjon F., Fourcaud T., Bert D. (2005) Root architecture and wind-firmness of mature *Pinus pinaster*, *New Phytologist*, 168, 387-400

Danquechin Dorval A., Meredieu C., Danjon F. (2016) Anchorage failure of young trees in sandy soils is prevented by a rigid central part of the root system with various designs, *Annals of Botany*, doi:0.1093/aob/mcw098

Dunbabin V. M., Postma J. A., Schnepf A., Pagès L., Javaux M., Wu L., Leitner D., Chen Y. L., Rengel Z., Diggle A. J. (2013) Modelling root-soil interactions using three-dimensional models of root growth, architecture and function, *Plant Soil*, 372, 93-124

Dupuy L. X., Fourcaud T., Lac P., Stokes A. (2007) A generic 3d finite element model of tree anchorage integrating soil mechanics and real root system architecture, *American Journal of Botany*, 94, 9, 1506-1514

Pagès L., Vercambre G, Drouet JL, Lecompte F, Collet C, Le Bot J (2004) Root Typ: a generic model to depict and analyse the root system architecture, *Plant Soil*, 258, 103-119

Yang M., Défossez P., Danjon F., Fourcaud T. (2014) Tree stability under wind: simulating uprooting with root breakage using a finite element method. *Tree stability under wind: simulating uprooting with root breakage using a finite element method*, *Annals of Botany*, 114, 695-709

Yang M., Défossez P., Danjon F., Dupont S., Fourcaud T. (2016) Which root architectural elements contribute the best to anchorage of *Pinus* species? Insights from in silico experiments, *Plant Soil*, doi:10.1007/s11104-016-2992-0