



1 – Évaluation de l'efficacité et de la tolérance du lanréotide LP 90 mg versus placebo dans la diminution de la lymphorrhée post-curage axillaire dans les cancers du sein

T. Gauthier, A. Garuchet-Bigot, J. Mollard, O. Loum, Y. Aubard

► To cite this version:

T. Gauthier, A. Garuchet-Bigot, J. Mollard, O. Loum, Y. Aubard. 1 – Évaluation de l'efficacité et de la tolérance du lanréotide LP 90 mg versus placebo dans la diminution de la lymphorrhée post-curage axillaire dans les cancers du sein. 33^e Journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire (SFSPM), Marseille, 2011. Cancer du sein : surdiagnostic, surtraitement. A la recherche d'un nouvel équilibre, Nov 2011, Marseille, France. pp.238. <hal-03575668>

HAL Id: hal-03575668

<https://hal.science/hal-03575668v1>

Submitted on 15 Feb 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

1

Évaluation de l'efficacité et de la tolérance du lanréotide LP 90 mg *versus* placebo dans la diminution de la lymphorrhée post-curage axillaire dans les cancers du sein

T. Gauthier*, A. Garuchet-Bigot, J. Mollard, O. Loum et Y. Aubard
Institut du Sein, CHU Dupuytren, Hôpital Mère Enfant, 87000 Limoges

Objectifs

Objectif principal : Évaluer l'efficacité du lanréotide dans la diminution de l'abondance de la lymphorrhée entre H0 et H0 + 96H après curage axillaire (H0 = mise en aspiration du drain).

Objectifs secondaires : Évaluer l'efficacité du lanréotide dans la prévention des lymphocèles post curage axillaire lors des consultations systématiques à J15, J30 et M6.

Méthodes

Étude prospective randomisée monocentrique en double aveugle contre placebo.

Critères d'inclusion : toute patiente âgée de plus de 18 ans qui a signé le formulaire de consentement et devant subir un curage axillaire :

- curage associé à une tumorectomie ;
- ou curage associé à une mastectomie ;
- ou curage isolé.

Injection la veille de l'intervention de lanréotide LP 90 mg ou placebo en sous-cutané et évaluation de la lymphorrhée dans les deux bras de l'essai.

Résultats

148 patientes incluses :

- 74 patientes dans le groupe lanréotide ;
- 74 patientes dans le groupe lanréotide ;
- début de l'étude en avril 2008 ;
- fin d'inclusion en décembre 2010 ;
- clôture de l'étude en juin 2011.

* Auteur correspondant.