Comparaison des programmes de statistique bayesienne Oxcal et ChronoModel pour préciser la datation de l'éruption des ponces d'Avellino (Vésuve)

J.C. Lefevre, Philippe Lanos, Claude Albore Livadie, Philippe Dufresne, C. Oberlin

▶ **To cite this version:**

J.C. Lefevre, Philippe Lanos, Claude Albore Livadie, Philippe Dufresne, C. Oberlin. Comparaison des programmes de statistique bayesienne Oxcal et ChronoModel pour préciser la datation de l'éruption des ponces d'Avellino (Vésuve). 24th Radiocarbon - 10th 14C & Archaeology Conferences, Sep 2022, Zurich, Suisse. . hal-03641359

HAL Id: hal-03641359
https://hal.science/hal-03641359

Submitted on 14 Apr 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Comparaison des programmes de statistique bayesienne Oxcal et ChronoModel pour préciser la datation de l'éruption des ponces d'Avellino (Vésuve)

JC Lefèvre, P Lanos, C Albore Livadie, P Dufresne, C Oberlin

1)Programmation

L'éruption







Dépôts éruptifs d'Avellino et protohistoriques sur le site de Croce del Papa

Le modèle

Afin de mieux contraindre la datation de l'éruption des ponces d'Avellino, nous avons défini un modèle avec huit phases temporelles : trois géologiques et cinq archéologiques. Les phases géologiques correspondent à l'éruption d'Avellino et aux deux éruptions protohistoriques ultérieures, traditionnellement dénommées AP1 et AP2 . Ces phases éruptives sont contraintes par une durée inférieure à dix années. Les phases archéologiques correspondent à différentes cultures de l'âge du Bronze en Campanie. Nous avons ainsi distingué des cultures archéologiques antérieures à l'éruption d'Avellino : Cetina , au passage du Chalcolithique au Bronze ancien, Palma Campania et des cultures postérieures à l'éruption, l'une que nous avons appelé "Palma Campania tardif" et l'autre "Protoapenninique". Ces dernières correspondent respectivement à une phase avancée du faciès archéologique de Palma Campania (BA2B) et, semble-t-il, à un moment initial du Bronze moyen (Protoapenninique ancien/récent sans distinction BM1-2A). La phase "Palma Campania tardif" est sans aucun doute antérieure à l'éruption AP2, comme sur le site d'Ariano Irpino (La

Les programmes

Oxcal : (version 4.3)
Le modèle se présente sous une forme d'une séquence de phases archéologiques ou éruptives. Les phases AP1 et AP2 sont déclarées en variables globales, puisqu'elles sont en relation avec plusieurs phases archéologiques(Palma Campania tardif, Protoapenninique et Avellino). Le modèle de boundary est "Sigma-Boudary", parce que le modèle "Boundary" ne permet pas le calcul car trop contraignant. Le modèle d'outlier est " (General, T(5),U(0.4),"t")"

Chonomodel : (version 2.0)
Le programme se présente sous deux fenêtres "Events" et "Phases". Les phases AP1 et AP2 sont en multirelations dans le diagramme phase. Les datations sur les artéfacts géologiques légèrement pré et post avellino sont en relation stratigraphique dans le diagramme"events" mais n'appartiennent à aucune phase.
Pour les deux programmes un TPQ et un TAQ ont été mis en place et les phases éruptives ont été limitées à 10 ans de durée.

Chronomodel







Oxcal



2)Résultats

Culture Palma Campania à Croce del Papa (Nola)





Résultats des dates de début et de fin de phase pour Chronomodel



Résultats des dates de début et de fin de phase pour Oxcal





Conclusions