



Dos nuevas especies del género *Hestimoides* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae) de Islas Salomón

Sergi Trócoli

► To cite this version:

| Sergi Trócoli. Dos nuevas especies del género *Hestimoides* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae) de Islas Salomón. Faunitaxys, 2023, 11 (6), pp.1-4. hal-03947364

HAL Id: hal-03947364

<https://hal.science/hal-03947364v1>

Submitted on 19 Jan 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

Faunitaxys

*Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique
morphologique et moléculaire*



Volume 11
Numéro 6

Janvier 2023

ISSN : 2269 - 6016
Dépôt légal : Janvier 2023

Faunitaxys

***Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique
morphologique et moléculaire***

ZooBank : <http://zoobank.org/79A36B2E-F645-4F9A-AE2B-ED32CE6771CC>

Directeur de la publication, rédacteur, conception graphique et PAO:

Lionel Delaunay

Cette revue ne peut pas être vendue

Elle est distribuée par échange aux institutions (version papier)
et sur simple demande aux particuliers (format PDF)

à l'adresse suivante:

AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore)
28, rue Voltaire, F- 42100 Saint Etienne
E-mail: faunitaxys.journal@gmail.com

Elle est disponible librement au téléchargement à partir du site:

<http://faunitaxys.fr/>

La parution de *Faunitaxys* est apériodique

Faunitaxys est indexé dans / *Faunitaxys* is indexed in:

- **Zoological Record**

Articles and nomenclatural novelties are referenced by:

- **ZooBank** (<http://zoobank.org>)

Online Archives:

- **HAL** (<https://hal.archives-ouvertes.fr>)

- **Internet Archive** (<https://archive.org>)

Imprimée sur les presses de SPEED COPIE, 6, rue Tréfilerie, F- 42100 Saint-Etienne

Imprimé le 19 janvier 2023

Dos nuevas especies del género *Hestimoides* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae) de Islas Salomón

SERGI TRÓCOLI

Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Laboratori de Natura. Collecció d'artròpodes. Passeig Picasso, s/n. E-08003 Barcelona.

- sergitrocoli@gmail.com - ZooBank: <http://zoobank.org/C52BC4D4-E8F6-4FAD-A7B4-65906891473A>

Palabras clave:

Coleoptera; *vivesi*;
Cerambycidae; *brosi*;
Lamiinae; nuevas especies;
Hestimoides; Islas Salomón.

Resumen. – Se describe dos nuevas especies del género *Hestimoides* Breuning, de las Islas Salomón: *Hestimoides vivesi* n. sp. y *Hestimoides brosi* n. sp.

Trócoli S., 2023. – Dos nuevas especies del género *Hestimoides* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae) de Islas Salomón. *Faunitaxys*, 11(6): 1 – 4.

DOI: [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(6\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(6))

ZooBank: <http://zoobank.org/3F177F73-3EEE-4FA5-B0C3-1E964F4FEBED>

Received: 15/01/2023 – Revised: 16/01/2023 – Accepted: 17/01/2023

Introducción

El género *Hestimoides* Breuning, se compone de cuatro especies, *Hestimoides compactus* Breuning, 1939, *Hestimoides stellatus* (Pascoe, 1867), *Hestimoides striolatus* (Aurivillius, 1921) y *Hestimoides trigeminatus* (Pascoe, 1867), de los cuáles solo *H. striolatus* se encuentra en las Islas Salomón. Existe el subgénero *Ochrestimoides* Breuning, con la especie *Hestimoides (Ochrestimoides) ochreovittatus* Breuning, 1950, que se separa fácilmente por dos protuberancias pronotales anteriores entre otros caracteres. Un género próximo, *Hestimidius* Breuning, 1939, con tres especies, *Hestimidius humeralis* Breuning, 1939, *Hestimidius ingranulatus* Breuning, 1939 y *Hestimidius ochreosignatus* Breuning, 1939, de los cuáles solo *H. ingranulatus* habita en las islas Salomón. Mirando las descripciones de Breuning, 1964 y consultando los tipos repartidos en los museos de Londres y Leiden, ambos géneros se pueden confundir, aunque las nuevas especies descritas en este artículo tienen más similitudes con el género *Hestimoides*.

Taxonomía

Hestimoides vivesi n. sp.

(Fig. 1 & 2)

ZooBank: <http://zoobank.org/DECE5102-FC42-481E-BB41-F653E2FA72CA>

Holotipo, ♂. – 11 mm de longitud. – 3,5 mm de anchura. << South Pacific, Solomon Is., Guadalcanal I., Karukiki env., 20-25 km SSE of Honiara, 1/18-XII-2016, 750-900m St. Jakl leg. >> (Sergi Trócoli collection, Barcelona).

Paratipo:

- 1 ♂: << South Pacific, Solomon Is., Guadalcanal I., Honiara reg., Barana vill. env., 100-300m, XI/XII-2018, St. Jakl leg. >> (Eduard Vives collection, Terrassa).

Reviewers :

Eduard Vives (Espagne) - ZooBank: <http://zoobank.org/8313D55B-D4A1-4E09-98DF-901E61DE562B>

Alexandre François (Emirates Center for Wildlife Propagation (ECWP), Maroc) - Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3665-9483>

- ZooBank: <http://zoobank.org/E8848ABC-3732-4100-BE81-5B13BFF6E66F>

Aspecto general. – Coloración general marrón grisácea, dando una apariencia de color bronce generalizada, con dos manchas de color blanco-amarillo en cada élitro. Antenas sobreponiendo un artejo y medio la longitud corporal, del mismo color que el cuerpo. Patas robustas con la misma coloración general marrón-bronceada.

Cabeza. – Pequeña, con ojos groseramente facetados, divididos en dos lóbulos por el escapo, unidos por una línea de cuatro ommatíos en la parte más estrecha, tubérculos antenales apenas salientes. Frente convexa fuertemente punteada, toda ella recubierta de una pilosidad corta de color dorado. Labro ligeramente redondeado. Mandíbulas pequeñas, con el borde interior liso y el ápice truncado. Antenas largas y finas, de 11 artejos, sobreponiendo en el macho un artejo y medio la longitud corporal, de color bronceado al igual que el resto del cuerpo. Presencia de pequeñas sedas doradas a lo largo de todos los segmentos siendo más profusas en su parte ventral. Escapo alargado y cilíndrico, siendo levemente más grueso en su tercio posterior estrechándose de nuevo al unirse al segundo segmento antenal, que es tan ancho como largo, cuarto artejo antenal ligeramente más largo que el tercero y ligeramente arqueado hacia la mitad, siendo el resto rectos y disminuyendo paulatinamente el tamaño.

Pronoto. – Más ancho que largo (2,8mm x 1,9mm), con aspecto acampanado, siendo su base mucho más ancha que la parte anterior, con punteado difuso, recubierto por unas sedas densas de color marrón-amarillo, presencia de dos surcos glabros en su base en ambos lados. Prosterno muy corto que continúa con un proceso prosternal muy estrecho acabado en un pequeño saliente con forma redondeada. Cavidades procoxales abiertas. Mesosterno cuadrado pero con la parte posterior truncada formando una cavidad cóncava que encaja con el metasterno. Metasterno liso, en forma de lanza con un surco longitudinal medio, recubierto con un fino tomento haciéndose más abundante y denso hacia sus laterales. Metaepisternas triangulares, siendo más anchas en su base que en la mitad posterior, que acaban en una fina lámina hasta casi desaparecer.

Élitros. – Subcónicos (8mm x 4mm), con húmeros redondeados, un poco abultados y salientes hacia su parte anterior. Escudete en forma de media circunferencia, liso recubierto por un tomento ralo y blanquecino. Presentan tres manchas redondas en cada élitro de color blanco, una de ellas en la mitad superior, en la parte media y otra justo por encima y lateral a esta, la otra, que es la mayor, se encuentra en el tercio posterior lateral de cada élitro. Entre su mitad y el ápex, presenta unas pequeñas manchas repartidas de manera homogénea de tomento blanco. Resto de élitros con una puntuación marcada



This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

Copyright 2023 The Authors. *Faunitaxys* published by Lionel Delaunay on behalf of the AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore).

en su base haciéndose más débil hasta casi desaparecer en el ápice. El ápice elítral, débilmente dehiscente, se encuentra truncado formándose un pequeño saliente en forma de espina más larga en su parte lateral que en la parte inferior. Abdomen con los cinco ventritos visibles, con tomento dorado disperso siendo más abundante y denso hacia los lados. Pigidio acabado de forma truncada dando una imagen de una V inversa.

Patas. – Largas, de la misma coloración del cuerpo. Fémures ensanchados dando apariencia de robustos, tibias finas con ligera dilatación en su ápice, recubiertas por un fino tomento blanco siendo más denso en la parte distal. Presencia de un pequeño surco en la parte distal de las tibias medias con abundante tomento erecto dorado. Tarsos largos y gruesos con uñas simples divergentes.

Organo copulador masculino. – Edeago largo y fino, muy arqueado, con el extremo puntiagudo (Fig. 5). Lamina inferior más larga que la superior. Parámeros largos, separados, uniéndose en el ápice, con largas sedas en su parte apical (Fig. 6).

Etimología. – Se dedica el presente taxón a Eduard Vives, estudiioso con larga trayectoria de la familia Cerambycidae.

Hestimoides brosi n. sp.

(Fig. 3 & 4)

ZooBank: <http://zoobank.org/C8ADE46B-0E94-419C-87A5-CB27E142E6AF>

Holotipo, ♂. – 8,5 mm de longitud. – 3 mm de anchura. << South Pacific, Solomon Is., Guadalcanal I., Lunga river env., 5-15 km S of Barana vill., Honiara reg., 18-XII-2016, 50-100m, St. Jakl leg. >> (Sergi Trócoli collection, Barcelona).

Aspecto general. – Coloración general grisácea, con tres pequeñas manchas de color blanco en cada élitro. Antenas sobrepasando un artejo la longitud del cuerpo y del mismo color. Patas robustas con la misma coloración general grisácea.

Cabeza. – Pequeña, con ojos groseramente facetados, divididos en dos lóbulos por el escapo, por una línea de cuatro omatíodios en la parte más estrecha, tubérculos antenales ligeramente salientes. Frente convexa fuertemente punteada, toda ella recubierta de una pilosidad corta de color blanco. Labro ligeramente redondeado. Mandíbulas pequeñas, con el borde interior liso. Antenas largas y finas, de 11 artejos, sobrepasando en el macho solo los últimos dos artejos, de color marrón-grisáceo, presencia de pequeñas sedas doradas oscuras a lo largo de todos los segmentos siendo más profusas en su parte ventral. Escapo alargado y cilíndrico, siendo levemente más grueso en su tercio posterior, estrechándose de nuevo al unirse al segundo segmento antenal, que es tan ancho como largo, cuarto artejo antenal ligeramente más largo que el tercero y ligeramente arqueado hacia su base, siendo el resto rectos y disminuyendo paulatinamente de tamaño.

Pronoto. – Más ancho que largo (2mm x 1,5mm), con aspecto acampanado, siendo su base mucho más ancha que la parte anterior, con punteado difuso, dando aspecto de granulado, recubierto por unas sedas densas de color blanco grisáceo, se observan dos pequeñísimas manchas de color grisáceo en ambos lados de la parte media. Prosterno muy corto que continúa con un proceso prosternal muy estrecho acabado en un pequeño saliente de forma redondeada. Cavidades procoxales abiertas. Mesosterno cuadrado pero con la parte posterior truncada formando una cavidad cóncava hacia su parte anterior. Metasterno liso, en forma de lanza con un surco longitudinal medio, recubierto con un fino tomento blanco amarillento haciéndose más abundante y denso hacia sus lados. Metaepisternas triangulares, siendo más anchas en su base que en la mitad posterior, que acaban en una fina lámina hasta casi desaparecer.

Élitros. – Subcónicos (6mm x 4mm), con húmeros redondeados, un poco abultados y salientes hacia su parte anterior, presentando una depresión en su unión con el pronoto en ambos lados. Escudete en forma de media circunferencia, ligeramente rugoso recubierto por un tomento ralo y dorado. Presenta dos manchas redondas en cada élitro, en la parte inferior de su tercio anterior, y la parte superior de su tercio posterior, de un tomento blanco-amarillento, muy compacto y apelmazado, existiendo dos pequeñas manchas más al lado de éstas últimas en su parte medial. Resto de élitros con una puntuación marcada en su base haciéndose más débil hasta casi desaparecer en la zona apical. El ápice elítral, débilmente dehiscente, se encuentra

truncado formándose un pequeño saliente en forma de espina más largo en su parte lateral que en la parte interior. Abdomen con los cinco ventritos visibles, con tomento blanco amarillento disperso siendo más abundante y denso hacia los laterales. Pigidio acabado de forma recta.

Patas. – Largas, de la misma coloración del cuerpo. Fémures ensanchados dando apariencia de robustos, tibias finas con ligera dilatación en su ápice, recubiertas por un fino tomento dorado siendo más denso en la parte distal. Presencia de un pequeño surco en la parte distal de las tibias medias con abundante tomento erecto blanco dorado. Tarsos largos y gruesos con uñas simples divergentes.

Organo copulador masculino. – Edeago corto y fino, arqueado, con el extremo puntiagudo (Fig. 7). Lamina inferior ligeramente más larga que la superior. Parámeros cortos, juntos, con pocas sedas en su parte apical (Fig. 8).

Etimología. – Se dedica el presente taxón a Vicenç Bros, malacólogo y estudiioso del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac.

Nota comparativa

Ambas especies se separan fácilmente del resto de especies del género *Hestimoides* por ser las únicas que presentan manchas redondas de cierto tamaño de color blanco o blanco-amarillento en sus élitros. Entre ellas dos, tienen una apariencia similar separándose fácilmente por su tamaño mayor y ser más alargado *H. vivesi* n. sp. aparte de la diferencia en la distribución de las manchas de color en los élitros junto con otros caracteres descritos anteriormente y la genitalia, que separa fácilmente estas dos especies al ser extremadamente diferentes.

Agradecimientos

A Eduard Vives, por la ayuda prestada y la revisión de la presente nota. A Harold Labrique del Museo de Lyon, al Dr. Dmitry Telnov (Natural History Museum, London, United Kingdom) y al equipo de imagen de dicho museo, a Oscar Vorst del Museo de Leiden, a todos ellos por la ayuda en proporcionar las fotos de los tipos de todas las especies descritas de los géneros *Hestimidius* y *Hestimoides*.

Bibliografía

- Aurivillius C., 1921. – Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon 2. *Tijdschrift voor Entomologie*, Amsterdam 64: 46-53, 1 pl.
- Breuning S., 1939. – Novae species Cerambycidarum VII. *Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand*, Riga 5: 144-290.
- Breuning S., 1942. – Novae species Cerambycidarum XI. *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, 11(2): 113-175.
- Breuning S., 1950, Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. *Longicornia* I: 511-535, 8 figs. Paul Lechevalier, Paris.
- Breuning S., 1960. – Catalogue des Lamiaires du Monde (Col. Céramb.), Verlag des Museums G. Frey, Tutzing bei München, (3): 109-182.
- Breuning S., 1964. – Tribus Apomecynini Lac. Die Apomecynini der asiatisch-australianischen Region, *Abhandlungen und Berichte aus dem staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden*, 30 (5): 449-528, pls I-XI, 99 figs.
- Dillon L.S. & Dillon E.S., 1952. – Cerambycidae of the Fiji Islands, *Bernice Pauahi Bishop Museum Bulletin*, 206: 1-114, 17 figs, 1 carte.




Figura 1-2 & 5-6. *Hestimoides vivesi* n. sp.

1. Holotipo, visión dorsal. 2. Holotipo, visión ventral. 5. Edeago, visión dorsal. 6. Parámeros.



Figura 3-4 & 7-8. *Hestimoides brosi* n. sp.

3. Holotipo, visión dorsal. 4. Holotipo, visión ventral. 7. Edeago, visión dorsal. 8. Parámeros.

Pascoe F.P., 1867. – Longicornia Malayana ; or, a Descriptive Catalogue of the Species of the three Longicorn Families Lamiidæ, Cerambycidæ and Prionidæ collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. (Part IV). *The Transactions of the Entomological Society of London*, 3 (3) 4: 337-464, pls XV-XIX.

Waqa-Sakiti H., Hodge S. & Winder L., 2018. – Distribution of Long-horn Beetles (Cerambycidae: Coleoptera) Within the Fijian Archipelago, *The South Pacific Journal of Natural and Applied Sciences*, 36 (1): 1-8, 3 figs.

Résumé

Trócoli S., 2023. – Deux nouvelles espèces du genre *Hestimoides* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae) des Iles Salomon. *Faunitaxys*, 11(6): 1 – 4.

Deux nouvelles espèces du genre *Hestimoides* Breuning sont décrites des Iles Salomon: *Hestimoides vivesi* n. sp. et *Hestimoides brosi* n. sp.

Mots-clés. – Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, *Hestimoides*, *vivesi*, *brosi*, nouvelles espèces, Iles Salomon.

Abstract

Trócoli S., 2023. – Two new species of the genus *Hestimoides* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae) from the Solomon Islands. *Faunitaxys*, 11(6): 1 – 4.

Two new species of the genus *Hestimoides* Breuning, from the Solomon Islands, are described: *Hestimoides vivesi* n. sp. and *Hestimoides brosi* n. sp.

Keywords. – Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, *Hestimoides*, *vivesi*, *brosi*, new species, Solomon Islands.

Derniers articles publiés

Lourenço W. R. & Velten J., 2022. – Further insights on Cretaceous Burmite scorpions with the descriptions of a new genus and species (Scorpiones: Buthoidea: Buthidae). *Faunitaxys*, 10(35): 1 – 5. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(35\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(35))

Lanuza-Garay A., 2022. – A New Species of *Confluentialia* Santos-Silva, Galileo & McClarin (Cerambycidae: Lamiinae: Colobotheini) from Panamá. *Faunitaxys*, 10(36): 1 – 3. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(36\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(36))

Lapèze J., 2022. – Le genre *Centronodus* Funkhouser (Hemiptera : Membracidae : Centronodinae) en Guyane française et description d'une nouvelle espèce. *Faunitaxys*, 10(37) : 1 – 19. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(37\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(37))

Qiu L., 2022. – A new species of *Oospira* Blanford, 1872 (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae) from Chongqing, China. *Faunitaxys*, 10(38) : 1 – 5. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(38\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(38))

Santos-Silva A. & Bezark L. G., 2022. – On some species of *Anobrium* Belon (Coleoptera, Cerambycidae, Pteropliini). *Faunitaxys*, 10(39): 1 – 8. - [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(39\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(39))

Santos-Silva A., 2022. – Description of two new species and one new genus of American Cerambycidae, and notes on *Amphicnæia nigra* Galileo & Martins (Coleoptera). *Faunitaxys*, 10(40): 1 – 8. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(40\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(40))

Devesa S. & Santos-Silva A., 2022. – Description of new taxa in American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 10(41): 1 – 9. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(41\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(41))

Cerda J.-A., 2022. – Descriptions de deux nouvelles espèces du genre *Haemanota* Hampson, 1901, de Guyane et du Panama (Lepidoptera, Noctuoidea, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Phaeopterina). Dixième note. *Faunitaxys*, 10(42) : 1 – 7. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(42\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(42))

Lourenço W. R. & Velten J., 2022. – A second new species for the genus *Cretaceoushormiops* Lourenço, 2018 from Cretaceous Burmite (Scorpiones: Protoischnuridae). *Faunitaxys*, 10(43): 1 – 5. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(43\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(43))

Lacroix M., Coache A. & Filippi G., 2022. – Contribution à la connaissance des *Apogonia* Kirby, 1819 de São Tomé et Príncipe (Coleoptera, Scarabaeoidea, Melolonthinae, Diplotaxini). *Faunitaxys*, 10(44) : 1 – 9. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(44\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(44))

Ythier E., 2022. – A new species of *Opisthacanthus* Peters, 1861 from the dry savannah formations of southern Madagascar (Scorpiones: Hormuridae). *Faunitaxys*, 10(45): 1 – 7. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(45\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(45))

Vitali F., 2022. – Taxonomic notes on some Asian Cerambycini (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 10(46): 1 – 4. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(46\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(46))

Ythier E. & Laborie L., 2022. – The genus *Buthus* Leach, 1815 (Scorpiones: Buthidae) in France with description of a new species from the Sainte-Baume Massif. *Faunitaxys*, 10(47): 1 – 13. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(47\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(47))

Vlasak J. & Santos-Silva A., 2022. – New genus and new species in Cerambycinae from Ecuadorian high Andes. *Faunitaxys*, 10(48): 1 – 12. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(48\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(48))

Sherwood D. & Gabriel R., 2022. – *Euthycaelus janae*, a new species and the first record of the subfamily Schismatothelinae from Peru (Araneae: Theraphosidae). *Faunitaxys*, 10(49): 1 – 4. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(49\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(49))

Bezark L. G. & Santos-Silva A., 2022. – New species of Central and South American Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 10(50): 1 – 11. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(50\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(50))

Lapèze J., 2022. – Un nouveau membracide inféodé aux forêts de nuages : *Cymbomorpha nebulosilvensis* n. sp. (Hemiptera; Auchenorrhyncha; Membracidae). *Faunitaxys*, 10(51) : 1 – 6. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(51\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(51))

Gereys B., 2022. – Examen critique des synonymies des Vespidae sociaux de France métropolitaine (Hymenoptera : Vespidae) – Partie 1 (Polistinae). *Faunitaxys*, 10(52) : 1 – 21. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(52\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(52))

Li Z.-C. & Chen J.-H., 2022. – Supplemental notes on *Broscosoma valainisi* Barševskis, 2010 (Coleoptera: Carabidae: Broscini). *Faunitaxys*, 10(53): 1 – 5. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(53\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(53))

Vlasak J. & Santos-Silva A., 2022. – New Acanthocinini, notes and new records (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 10(54): 1 – 14. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(54\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(54))

Montreuil O. & Keith D., 2022. – Scarabaeoidea (Coleoptera) nouveaux ou peu connus d'Iran. *Faunitaxys*, 10(55) : 1 – 10. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(55\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(55))

Wang F.-L., 2022. – Three new species of genus *Anomala* Samouelle from Yunnan, China (Coleoptera: Scarabaeidae, Rutelinae). *Faunitaxys*, 10(56): 1 – 9. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(56\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(56))

Delahaye N., 2022. – Etude du genre *Braderochus* Buquet, 1852 et description d'une nouvelle espèce du Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Prionini). *Faunitaxys*, 10(57) : 1 – 7. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(57\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(57))

Barria M.D., Clavijo-Bustos J. & Ramírez-Ponce A., 2022. – A new species of *Phyllophaga* (s. str.) *schizorhina* species group (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Rhizotrogini) from Panama. *Faunitaxys*, 10(58): 1 – 5. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(58\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(58))

Vitali F., 2022. – A study of the *Acalolepta permutans* species group (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 10(59): 1 – 7. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(59\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(59))

Gerstmeier R., 2022. – New species of Tillinae from Africa (Coleoptera, Cleridae, Tillinae). *Faunitaxys*, 10(60) : 1 – 8. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(60\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(60))

Huchet J-B., 2022. – Three new species of the genus *Nothochodaeus* Nikolajev, 2005 from Java, Greater Sunda Islands (Coleoptera: Scarabaeoidea: Ochodaeidae). *Faunitaxys*, 10(61) : 1 – 10. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(61\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(61))

Háva J., 2022. – Study of the genus *Anthrenus* subgenus *Anthrenops*. Part 2. *Anthrenus (Anthrenops) ghanae* sp. nov. from Ghana (Coleoptera: Dermestidae: Megatominiae). *Faunitaxys*, 10(62): 1 – 3. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(62\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(62))

Limoges R. & Le Tirant S., 2022. – Nouvelle espèce du genre *Eupholus* Boisduval, 1835 de la Papouasie, Indonésie (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Faunitaxys*, 10(63): 1 – 7. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10\(63\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-10(63))

Bezark L. G., Santos-Silva A. & Botero J. P., 2023. – New species of Cerambycidae and Disteniidae (Coleoptera) from the Neotropical Region . *Faunitaxys*, 11(1): 1 – 13. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(1\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(1))

Háva J., 2023. – Study of the genus *Anthrenus* subgenus *Anthrenops*. Part 3. *Anthrenus (Anthrenops) stolidus* sp. nov. from India (Coleoptera: Dermestidae: Megatominiae). *Faunitaxys*, 11(2): 1 – 2. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(2\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(2))

Ythier E. & François A., 2023. – The scorpion fauna of the Oriental region in Morocco (Scorpiones: Buthidae, Scorpionidae) with description of three new species of the genus *Scorpio* Linnaeus, 1758. *Faunitaxys*, 11(3): 1 – 15. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(3\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(3))

Lourenço W. R., 2023. – A new species of *Bothriurus* Peters (Scorpiones: Bothriuridae) from ‘Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas’ in the State of Pará, Brazil. *Faunitaxys*, 11(4): 1 – 7. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(4\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(4))

Trócoli S., 2023. – Una nueva especie del género *Vesperella* Dayrem (Coleoptera, Cerambycidae) de Marruecos. *Faunitaxys*, 11(5): 1 – 5. [https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11\(5\)](https://doi.org/10.57800/faunitaxys-11(5))

Faunitaxys est échangée avec les revues suivantes (« print versions ») :

- Annali del Museo Civico di Storia Naturale G. Doria (Italie)
- Boletín de la Asociación española de Entomología (Espagne)
- Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología (Espagne)
- Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia (Italie)
- Bulletin de la Société linnéenne de Lyon (France)
- Bulletin of Insectology (Italie)
- Heteropterus Rev. Entomol. (Espagne)
- Israel Journal of Entomology (Israel)
- Klapalekiana (République Tchèque)
- Koleopterologische Rundschau (Allemagne)
- Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Italie)
- Nova Supplementa Entomologica (Allemagne)
- Proceedings of the Entomological Society of Washington (USA)
- Revue suisse de Zoologie (Suisse)
- Spixiana (Allemagne)
- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, Biologie (Allemagne)
- Zoosystematica Rossica (Russie)

Faunitaxys

Volume 11, Numéro 6, Janvier 2023

SOMMAIRE

Deux nouvelles espèces du genre *Hestimoides* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae) des Iles Salomon.

Sergi Trócoli 1 – 4

CONTENTS

Two new species of the genus *Hestimoides* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae) from the Solomon Islands.

Sergi Trócoli 1 – 4



Illustration de la couverture :

Monnaie traditionnelle des îles Salomon:

Monnaie "Barava", réservée aux hommes de haut rang. Cette plaque ajourée, taillée dans du bénitier fossile, était utilisée comme monnaie d'échange.

Elle pouvait également être apposée proche de la sépulture du dignitaire défunt.

Crédits:

© Sergi Trócoli : Fig. 1 - 8.