

Impacts anthropiques sur l'environnement marin: suivi des contaminants métalliques du rejet de l'effluent de l'usine d'alumine de Gardanne en mer Méditerranée

Stéphanie Jacquet

▶ To cite this version:

Stéphanie Jacquet. Impacts anthropiques sur l'environnement marin: suivi des contaminants métalliques du rejet de l'effluent de l'usine d'alumine de Gardanne en mer Méditerranée. Dix ans de recherches de l'Observatoire Hommes-Milieux Littoral méditerranéen sur le Littoral marseillais, OHM Littoral méditerranéen; ESPACE UMR 7300, Jun 2023, Marseille (13), France. hal-04141948

HAL Id: hal-04141948 https://hal.science/hal-04141948v1

Submitted on 26 Jun 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Impacts anthropiques sur l'environnement marin: Suivi des contaminants métalliques du rejet de l'effluent de l'usine d'alumine de Gardanne en mer Méditerranée













JACQUET Stéphanie

CR HDR CNRS / Océanographe MIO - Institut Méditerranéen d'Océanologie Equipe de Chimie des Environnements Marins stephanie.jacquet@mio.osupytheas.fr


Pressions anthropiques sur l'environnement marin:

- Zone littorale péri-urbaine marseillaise (passé historique industriel; grande ville maritime aux activités complexes)
- Rejets déchets de l'usine de production d'alumine de Gardanne depuis les années 60 (Sujet très médiatisé des boues rouges) -Canyon de Cassidaigne


Usine de Gardanne: produit depuis fin 19^{ième} de l'alumine à partir du minerai de Bauxite (procédé bayer) – 1 t alumine = 1.5 t déchets (boues rouges)

Les déchets = partie non exploitable du minerai

- peu de chimie par le Bayer (attaque soude)
- riches en métaux de la bauxite
- stockés à terre puis rejetés en mer



↑ Point du rejet en mer (-324 m), Parc des Calanques, au large de Cassis



Les rejets en mer (années 60) ont généré des questions environnementales accompagnées de conflits militants

Plusieurs périodes charnières dans l'évolution des rejets :

- 1987-1996: décrets, normes à suivre, études d'impact (1997), engagements à arrêter les rejets
- 2010-2015: tournants décisifs (technologiques et décisions organismes d'état: solide terre + liquide mer)
- 2016-2022: modification majeures du traitement de l'effluent (filtres-presses, effluent clarifié, traitement CO₂ et biologique, arrêt de l'attaque de la bauxite)



↑ Filtre presse pour la filtration des boues rouges (2022, inactif).

Les rejets en mer (années 60) ont généré des questions environnementales accompagnées de conflits militants

Plusieurs périodes charnières dans l'évolution des rejets :

- 1987-1996: décrets, normes à suivre, études d'impact (1997), engagements à arrêter les rejets
- 2010-2015: tournants décisifs (technologiques et décisions organismes d'état: solide terre + liquide mer)
- o 2016-2022: modification majeures du traitement de l'effluent (filtres-presses, effluent clarifié, neutralisé, traitement CO₂ et biologique, arrêt de l'attaque de la bauxite)



↑ Filtre presse pour la filtration des boues rouges (2022, inactif).

Comité de suivi (CSIRM) Etudes de l'impact de l'effluent en mer

Suivi des contaminants métalliques de l'effluent rejeté en mer (2016-2021)

- Effluent (usine)
- Zone mélange effluent/ eau de mer, panache
- o Colonnes de Concrétions
- Eau de mer au dessus du rejet
- o Sédiments


Objectifs

- Impact de l'effluent en mer (différents compartiments)?
- Evolution depuis 2016 des métaux en mer en parallèle des avancées du traitement du rejet en usine?



↑ Effluent clarifié, après neutralisation (traitement station CO₂), Usine de Gardanne (2022).

Etude des contaminants métalliques dans les différents compartiments:



[↑] Représentation des compartiments échantillonnés pour l'analyses des métaux


11 Projets de recherche (PI)


 Labex DRIIHM, AT MISTRALS P&C, Labex OT-Med, APOG PACA, GRD-OMER CNRS, EAURMC, CREOCEAN, ALTEO.


15 Missions en mer depuis 2016

- Janus II et Minibex (Comex SAAS),
 Europe, Astroïdes, Antedon
- O Goflo, système HTC, ROV (Apache, Super Achille, Ariane)
- Laboratoire: salles blanches, HR-ICP-MS


Hydrothermalisme « industriel » hyperalcalin (pH12)















Composition chimique et minéralogique, taux de formation, taux de dissolution, vitesse de chute, stabilité dans l'eau de mer.

Formation d'hydrotalcite, Hydroxydes Doubles Lamellaires de type Mg-Al-OH

Structure en feuillets = incorporation de métaux (de l'effluent et de l'eau de mer)

o mg/g: Mg, Al, Ca, S

ο **μ**g/g: Si, V, K, Sr, P, As, B, Mo, Fe, Cu, Zn, Sn

o ng/g: Rb, U, Ba, Cr, Ni, Co, Sb, Mn, Hg, Ag, Cd, Pb, Th traces

RESULTATS CONTEXTE **OBJECTIFS METHODO CONCLUSIONS**

Chemosphere 263 (2021) 127695



Contents lists available at ScienceDirect

Chemosphere

journal homepage: www.elsevier.com/locate/chemosphere



Characterization of the submarine disposal of a Bayer effluent (Gardanne alumina plant, southern France): I. Size distribution, chemical composition and settling rate of particles forming at the outfall



Stéphanie Jacquet a.*, Christophe Monnin b, Olivier Herlory c, Deborah Mille c, Aurélie Dufour a, Benjamin Oursel a, Lars-Eric Heimbürger-Boavida a, Sébastien D'onofrio ^a, Nicolas Layglon ^a, Cédric Garnier

- ^a Aix Marseille Université, CNRS/INSU, Université de Toulon, IRD, Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), UM 110, 13288, Marseille, France b Geosciences Environnement Toulouse, CNRS - Université Paul Sabatier - IRD (Observatoire Midi-Pyrénées), 14 Avenue Edouard Belin, 31400, Toulouse,
- c CREOCEAN, Valparc Bat B, 230 Avenue de Rome, 83500, La Seyne sur Mer, France





Environmental Advances 5 (2021) 100087

Contents lists available at ScienceDirect

Environmental Advances

journal homepage: www.sciencedirect.com/journal/environmental-advances



Characterization of the submarine disposal of a Bayer effluent (Gardanne alumina plant, southern France): II. Chemical composition of the clarified effluent and mineralogical composition of the concretions formed by its discharge in the Mediterranean Sea

Christophe Monnin 4, Aimée Laurenne Koumba Boussougou 4, Priscia Oliva 4, Cédric Garnier 5, Stéphanie Jacquet

⁸ Géosciences Environnement Toulouse, CNRS - Université Paul Sobatier - IRD (Observatoire Midi-Pyrénées), 14 avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse, France b Aix Marseille Université, CNRS/INSU, Université de Toulon, IRD, Mediterranean Institute of Oceanography (MIO), UM 110, 13288 Marseille, France





Depuis 2019: pH effluent similaire à l'eau de mer (effluent neutralisé), arrêt de la formation des concrétions, il n'y a plus de panache blanc, teneurs en métaux effluent beaucoup plus faibles (/100 Al).

TRAVAUX EN COURS

- Autre dimension de l'impact des rejets: la dimension sociétale
 - Circulation de l'information / données scientifiques dans un contexte de conflit ? Soutien /controverses?
 - Comment ont-elles alimenté les discussion et participé aux prises de décision et prises de position
 - Les rendre accessibles pour et avec les acteurs et parties prenantes

Projet INTERFACES (EAURMC – 2022-2025)
Thèse GdR OMER (MITI CNRS): CALLENS
Lauralie
Co-encadrement JUANALS Brigitte
Pr HDR AMU (CNE - INSHS) / Science de
l'information et de la communication

Projet PRESHUMER (80PRIME – 2022-2024)
Thèse MITI CNRS: DARBOURET Aurélie
Co-encadrement PETRIC Boris
DR HDR CNRS (CNE - INSHS) / Anthropologie
sonore et visuelle