



## Coûts associés à la dégradation du milieu marin : ressources conchylicoles - Façade Méditerranée

Delphine Node, Rémi Mongruel

### ► To cite this version:

Delphine Node, Rémi Mongruel. Coûts associés à la dégradation du milieu marin : ressources conchylicoles - Façade Méditerranée. AMURE - Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces marins et littoraux - Centre de droit et d'économie de la mer. 2024. <hal-04609285>

**HAL Id: hal-04609285**

**<https://hal.science/hal-04609285v1>**

Submitted on 12 Jun 2024

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 - Attribution - Non-commercial use - No Derivative Works - International License



# Ressources conchylicoles


## *Façade Méditerranée*

### Delphine Node

UMR AMURE, Université de Bretagne Occidentale, IUEM, Rue Dumont d'Urville, 29280 Plouzané

### Rémi Mongruel

UMR AMURE, Ifremer, IUEM, Rue Dumont d'Urville, 29280 Plouzané



# Coûts liés aux ressources conchyliques – Façade Méditerranée

**Delphine Node**

UMR AMURE, Université de Bretagne Occidentale, IUEM, Rue Dumont d'Urville, 29280 Plouzané

**Rémi Mongruel**

UMR AMURE, Ifremer, IUEM, Rue Dumont d'Urville, 29280 Plouzané

## MESSAGES CLÉS

- Au niveau national, les coûts liés à la dégradation des ressources conchyliques représentent 25 millions d'Euros par an en moyenne sur la période 2017-2021.
- Au niveau de la façade Méditerranée (MED), les coûts liés à la dégradation des ressources conchyliques s'élèvent à 4,1 millions d'Euros, répartis ainsi : 3,2 millions pour des actions de suivi et d'information et 0,9 million pour des actions de prévention et d'évitement. Aucun financement n'a été identifié pour des actions de remédiation.
- Ces estimations sont vraisemblablement sous-évaluées compte tenu des données utilisées pour estimer les coûts d'administration du secteur.

## I. Introduction

Les dégradations des ressources conchyliques affectent l'ensemble du processus d'élevage depuis la reproduction et le captage du naissain jusqu'à la production de coquillages adultes, et se mesurent principalement au travers de l'évolution des performances biologiques des ressources conchyliques : capacité de reproduction des cheptels, abondance et qualité des larves émises, taux de mortalités aux différents stades (juvéniles, demi-élevage, adultes), indicateurs de croissance et de qualité des coquillages.

Les ressources conchyliques sont soumises à de nombreux facteurs de dégradation dans le milieu marin, principalement du fait des activités humaines qui s'exercent dans la bande côtière. Les pressions anthropiques, à l'origine de pollutions chroniques diverses (issues de l'agriculture, de la pêche plaisancière, des industries, des effluents urbains...) ou accidentelles (hydrocarbures), voire des conflits d'usage (par exemple au sujet des apports d'eau douce) sont rappelées, mais ne seront pas toutes traitées ici dans la mesure où elles renvoient à d'autres thèmes de dégradation étudiés par ailleurs (chapitres sur les micropolluants, l'introduction d'organismes pathogènes microbiens, les espèces invasives, l'eutrophisation, les modifications du régime hydrographique...). Les facteurs liés au changement climatique, dont les effets se manifestent directement au travers de l'accroissement des aléas climatiques, doivent également être cités car ils influencent de manière diffuse et indirecte le processus de production via leurs effets cumulatifs avec les autres pressions anthropiques exogènes (ICES WGMASC, 2011). Cependant, les facteurs liés au changement climatique n'entrent pas dans le champ d'étude de la DCSMM et ne seront donc pas traités ici en tant que tels.

Une autre cause de dégradation des ressources conchyliques provient des phénomènes de prédation divers (invertébrés, oiseaux, poissons) qui occasionnent des pertes sur les cheptels en élevage, et du parasitisme qui altère la qualité des coquillages (ex. infestations des huîtres par *polydora*, des moules par *mytilicola*). Certains modes d'exploitation, comme l'élevage en eau profonde, présentent un risque plus élevé par rapport aux prédations par les poissons (ex. daurades), tandis qu'à l'inverse les

risques de prédation par des invertébrés aquatiques ou par les oiseaux sont réduits (ICES WGMASC, 2011). D'autres types de dommages, comme ceux provoqués par l'échouage d'algues invasives sur les parcs d'élevage doivent aussi être mentionnés (ex. sargasse dans la Manche).

Nous traiterons dans cette thématique des facteurs de dégradation du milieu et des ressources conchylicoles qui impactent l'exploitation des ressources et la gestion de ces activités. La question des mortalités de coquillages, naissains d'huîtres creuses ou moules adultes, d'origine multifactorielle, reste centrale dans la mesure où elle mobilise des moyens importants de la profession et de l'administration. Cette problématique structure une part conséquente de l'effort des programmes de recherche et des réseaux de suivi et d'observation des coquillages.

### 1.1. Conditions d'exploitation et gestion des ressources conchylicoles

Les conditions d'exploitation et de gestion des ressources conchylicoles sont définies dans les schémas des structures (SDS) des exploitations de cultures marines (Article D923-6 et D923-7 du code Rural et de la pêche maritime<sup>1</sup>). Ces schémas départementaux sont établis par la profession en concertation avec les DDTM ; ils sont soumis depuis mai 2011 à une évaluation environnementale et une évaluation Natura 2000 en application des articles L122-4 et R122-17 du Code de l'Environnement. Les schémas des structures déterminent les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines sont mis en œuvre dans le secteur considéré (Article D923-6). Ils définissent également (Article D923-7) :

- *Si nécessaire, par bassin de production et par secteur géographique approprié et en fonction des capacités trophiques du secteur en cause, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques (alinéa 6);*
- *Des règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines, incluant notamment des normes de densité des cultures (alinéa 7) ;*
- *Dans les aires marines protégées, des dispositions propres à assurer le respect des prescriptions applicables dans ces périmètres (alinéa 8).*

Les principes de gestion des ressources conchylicoles doivent donc reposer en définitive sur la « capacité de support » (ou « capacité de charge ») des bassins conchylicoles, en lien avec la ressource trophique disponible pour les biomasses en élevage. Cette capacité de support doit également tenir compte d'autres sources de compétition trophique, comme celles issues du développement d'espèces invasives (par exemple la crépidule) ou proliférantes (cas des friches ostréicoles dans les bassins de captage de l'huître creuse...). Les SDS intègrent par ailleurs un certain nombre de mesures de gestion dans le but de respecter les habitats et espèces d'intérêt communautaire. Afin de réduire les impacts de l'activité (sédimentation, gestion et traitement des déchets conchylicoles...) et de contribuer à détruire les espèces non-indigènes invasives, les schémas des structures reprennent les règles d'usage du DPM et les obligations d'entretien des concessions déjà prévues dans le cahier des charges de l'autorisation d'exploitation. Pour prévenir les risques de mortalités, et limiter la dissémination des maladies, certaines dispositions visant à restreindre l'immersion de lots de naissains potentiellement contaminés à certaines périodes de forte sensibilité aux mortalités de juvéniles peuvent être inscrites dans les SDS<sup>2</sup>.

1Articles créés par le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014

2Voir par exemple l'article 8 des schémas des structures du Calvados et de la Manche adoptés en 2016, portant sur la régulation des premières immersions de moules et d'huîtres pour limiter le risque de propagation de maladies et de mortalités. Par ailleurs, les interdictions temporaires de transferts font l'objet d'arrêtés préfectoraux en lien avec la réglementation sanitaire (Directive 2006/88 sur la police sanitaire et prévention de certaines maladies).

## 1.2. Les mortalités ostréicoles et mytilicoles

### 1.1.1. Mortalités ostréicoles

Une analyse des surmortalités ostréicoles avait été effectuée lors de l'évaluation initiale du 1<sup>er</sup> cycle de la DCSMM, qui s'était déroulée peu de temps après que le phénomène des mortalités de naissains se fut brutalement amplifié et étendu à l'ensemble des bassins conchylicoles français en 2008. Ce contexte de crise avait donné lieu à une présentation du plan de soutien à la filière mis en place par l'État et du plan national de relance de l'ostréiculture mis en œuvre en partenariat avec les organismes professionnels, les organismes de recherche et les écoseurs. Un aperçu des connaissances acquises à cette période et des travaux de recherche en cours avait également été fourni à partir d'une synthèse du programme de recherche consacré aux « surmortalités des naissains d'huîtres creuses » (Cochennec-Laureau N. et al, 2011). Parmi les autres bilans effectués sur le sujet, on peut citer l'étude réalisée par AgroCampus Ouest en 2012<sup>3</sup> et l'étude publiée par le LER Poitou-Charente en 2014<sup>4</sup>. Cette question est toujours d'actualité au vu des taux de mortalités ostréicoles qui restent encore très importants (Tableau 1), même si les pratiques conchylicoles ont évolué pour s'adapter à une situation qui perdure. Les aides publiques qui avaient été versées aux professionnels pour compenser les pertes de naissains au plus fort de la crise et jusqu'en 2012 ont cessé depuis, mais les efforts d'observation et de recherche se sont poursuivis dans différents domaines. Des partenariats se sont pérennisés entre l'État et l'Ifremer et aussi entre réseaux d'observation nationaux et régionaux (cf. 2.1.3). La mise en place d'un dispositif interdisciplinaire de recherche, le Centre de Référence sur l'Huître (CRH), en 2011, auquel ont contribué différents partenaires scientifiques et collectivités territoriales de Basse-Normandie avait pour objectif de fédérer ces acteurs sur la problématique des mortalités d'huîtres. Après cinq années d'existence, le CRH a proposé des pistes d'amélioration pour la survie des huîtres et des perspectives de recherche.

### 1.1.2 Mortalités mytilicoles

La période 2014-2016 a été marquée par des phénomènes récurrents de « surmortalités » de moules adultes sur la façade Atlantique et dans la Manche. Dans le pertuis Breton des taux de mortalités de 98% ont été atteints en décembre 2018 sur les sites de Filière et de l'Aiguillon. Suite aux premiers épisodes de mortalités, l'action MORBLEU (Mortalité des moules Bleues) a été lancée en 2015, sous convention DPMA. Elle a été menée dans les Pertuis Charentais et la baie de Bourgneuf afin d'explorer des facteurs potentiellement aggravants, corrélés avec les épisodes de mortalité observés : facteurs environnementaux (biotiques, abiotiques et hydrodynamiques), facteurs intrinsèques aux animaux (traits d'histoire de vie, fond génétique, caractéristiques cytogénétiques et physiologie) en lien avec des agents infectieux potentiels (Pépin *et al.* 2017). Cette action a été reconduite en 2016, 2017 et 2018 afin de poursuivre l'analyse des données et renouveler les campagnes d'observation *in situ*. Les données concernant la période 2017-2020 montrent que seul le site de Maison Blanche est encore affecté par des mortalités anormalement élevées sur ces années (Tableau 2 et Encadré).

Depuis 2012, le réseau MYTILOBS constitue le dispositif national d'observation des moules d'élevage mis en œuvre par l'Ifremer. Cette surveillance est complétée par d'autres réseaux implantés à l'échelle régionale et animés par les différents acteurs de l'interprofession : centres techniques, comités professionnels et bureaux d'études.

3Bertran, R. et Le Clanche, J.-F., 2012. État des lieux de la filière ostréicole : bilan des recherches et des projets de sortie de crise. Partenaires : FSE, Réseau aquacole.

4Pépin J.-F. et al, 2014. Mortalités massives de l'Huître creuse -Synthèse - Rapport final des études menées sur les mortalités de naissains d'huîtres creuses *C. gigas* sur le littoral charentais pour la période de 2007 à 2012. Septembre 2014 – ODE/LER-PC/ 14-05

Tableau 1. Taux de mortalités annuelles standardisés d'huîtres par site de 2018 à 2021 (%). Mortalités cumulées des naissains diploïdes - Source : Ifremer-Réseau national d'Observation Conchylicole RESCO II.

Façade	Sites de suivi RESCO	2018 (bulletin 14/12/18)	2019 (bulletin 19/06/19)	2020 (pas de bulletin)	2021 (bulletin 13/12/17)
MEMN	Géfosse (Baie des Veys)	54,2	8,8	X	62,1
NAMO	Terrelabouet (Baie du Mont Saint-Michel-Cancale)	76,6	57,1	X	58,1
	Pointe du château (Rade de Brest)	57	53,4	X	52,4
	Rouvran (Rivière de Pénerf – Pénerf)	73,9	29,8	X	57,9
	Couperlasse (Baie de Bourgneuf)	60,2	33,7	X	40,4
SA	D'Agnas (Bassin de Marennes-Oléron)	63,4	62,6	X	74
	Le Tes (Bassin d'Arcachon)	74,2	32,6	X	40,4
MED	Marseillan-Est (Etang de Thau)	89,9	49,8	X	7,9

Les observations ci-dessus ne concernent que les lots suivis par le RESCO II, et ne prennent pas en compte celles qui ont pu être faites par les professionnels sur leurs lots d'élevage. Les résultats de l'année 2019 sont partiels, les taux de mortalité cumulés sont normalement calculés à la fin de la campagne, en décembre. Aucune donnée n'est disponible pour 2020.

Tableau 2. Taux de mortalités annuelles cumulées par site, campagnes 2017 à 2020 (%) entre la mise à l'eau de l'année n et décembre de l'année n + 1, données corrigées et lissées. Source : Ifremer - Réseau national d'observation mytilicole Mytilobs (Normand et al., 2021).

Façade	Site du suivi Mytilobs	Déc. 2017	Déc 2018	Déc. 2019	Déc. 2020
MEMN	Agon	7	39	24	21
NAMO	Le Vivier	15	22	12	5
	Pont Mahé	32	52	17	51
	Maison blanche	75	81	68	79
	Filière	20	43	58	27
SA	Aiguillon	9	36	60	39
	Yves	14	18	43	39
	Boyard	10	29	ND	ND

ND : Donnée non disponible car arrêt du suivi sur ce site.

Les causes de ces mortalités semblent multifactorielles. Les analyses en pathologie réalisées par l'Ifremer (LNR maladies des mollusques marins) sur des lots de moules affectées révèlent l'implication de souches virulentes de *Vibrio splendidus*. Les études montrent également que de forts taux d'anomalies cytogénétiques dans les cellules hématocytaires avant les épisodes de mortalité sont associés chez les individus à des taux de survie moindres suggérant une maladie émergente. Par ailleurs, « l'effet site » lié à des facteurs non définis semble interagir avec les moules dans la mesure où la zone de production du Vivier-sur-Mer en baie du Mont-Saint-Michel, qui importe son naissain

de zones de captage diverses (dont celles présentant de forts taux de mortalités chroniques dans la baie de Bourgneuf), n'a pas été touchée par les mortalités (Pépin *et al.* 2017). Depuis 2015, les travaux sur les mortalités ont permis de suivre finement l'environnement de moules en élevage. L'étude des environnements physiques (météorologique et hydro-climatique) et biotiques a permis d'identifier un contexte particulier associé à ces phénomènes de mortalité. La pluviométrie apparaît comme un élément prépondérant : les années marquées par d'importantes dessalures en hiver ou au début de printemps sont caractérisées par des périodes de mortalités printanières modérées à fortes : cas de 2014, 2015, 2016, 2018, contrairement à 2017. La température semble également jouer un rôle important sur l'intensité des mortalités : les hivers chauds de 2014 et 2016 présentent de fortes mortalités, les hivers plus frais (2015, 2018) ont connu de plus faibles mortalités (Pépin *et al.*, 2019).

#### *Encadré. Bilan des mortalités mytilicoles sur le littoral français (2017-2020)*

##### **ANNEE 2017**

La campagne d'observation 2016-2017 est caractérisée par une diminution des taux de mortalités par rapport à 2016 sur la quasi-totalité des sites. Seul le site de Maison Blanche est affecté par des mortalités élevées. Les autres sites ont des taux cumulés de mortalité compris entre 7 et 32% (Normand *et al.*, 2019). L'hiver 2016-2017, qualifié d'« exceptionnellement sec » par Météo France (2017), s'est traduit par des apports d'eau douce très limités pouvant expliquer ces faibles taux de mortalité (Pépin *et al.*, 2019).

##### **ANNEE 2018**

L'année 2018 est marquée par une augmentation généralisée des taux de mortalités par rapport à l'année précédente. Les taux cumulés étaient compris entre 18 et 81% en décembre 2018. Un épisode de « surmortalité » (+ 33%) est survenu dans l'estuaire de la Vilaine au mois d'août, événement inédit pour ce secteur. Cette année est également caractérisée par les plus faibles taux de croissance depuis la création du réseau (Normand *et al.*, 2019). Le site de Pont Mahé a connu un pic de mortalité en juillet-août expliqué par de fortes chaleurs et des blooms phytoplanctoniques intenses avec notamment la détection de dinoflagellés (*Lepidodinium chlorophorum*) (Pépin *et al.*, 2019). Le site de Maison Blanche a toujours le niveau le plus élevé de mortalité cumulée.

##### **ANNEE 2019**

Le suivi Mytilobus sur le site de Boyard a été abandonné à partir de 2019. Pour le lot de naissain 2018, les proportions de mortalité se sont avérées inférieures à celles observées au cours de la campagne précédente sur les sites d'Agon (- 15 %), du Vivier (- 10%), de Pont-Mahé (- 35%) et de Maison Blanche (- 13%). Au contraire, les taux sont supérieurs sur l'ensemble des sites des Pertuis charentais : + 15% sur le site de Filière, + 24% sur le site de l'Aiguillon et + 25% sur le site d'Yves. Les sites de Maison blanche, Filière et Aiguillon sont les plus touchés par ces mortalités.

##### **ANNEE 2020**

En 2020, les plus forts taux de mortalités ont été observés dans la Baie de Bourgneuf sur le site de Maison Blanche (79% de mortalités cumulées). Le site du Vivier-sur-mer en baie du Mont Saint Michel est le plus épargné avec un taux de 5% de mortalités cumulées (Normand *et al.* 2021). Sur les sites des Pertuis charentais (Filière, Aiguillon, Yves), les taux de mortalités sont en légère régression par rapport à 2019 (respectivement 27%, 39% et 39% de mortalités cumulées).



## 2. Évaluation du coût des mesures liées à la dégradation des ressources conchyliques

L'évaluation repose sur les coûts des actions menées par les principaux acteurs du secteur conchylicole (administration, organisations interprofessionnelles, instituts de recherche, centres techniques) et qui concourent à la gestion durable des ressources exploitées par ce secteur. L'évaluation des coûts liés à la dégradation des ressources conchyliques s'attache à distinguer, si possible, les coûts de suivi et d'information, les coûts des actions de prévention et de préservation, et les coûts de remédiation de la dégradation. Cette évaluation est complétée par une caractérisation des impacts résiduels, c'est-à-dire des impacts qui persistent malgré la mise en œuvre de plans de gestion visant à améliorer la qualité du milieu ou/et de plans de gestion durable des ressources conchyliques. Les impacts résiduels sont plus difficiles à évaluer quantitativement, en l'absence notamment de données économiques relatives aux pertes de production. La question des impacts résiduels pourra toutefois être abordée en partie à l'aide de données qualitatives et la proposition de suivi d'indicateurs de performance biologiques et de la qualité du milieu issus des réseaux d'observation.

Les données de coûts présentées dans ce chapitre ont été collectées pour la période 2017-2021 ou, à défaut, pour une année de référence sur cette période. Certaines données ont pu être obtenues à l'échelle de la façade maritime, d'autres n'étaient disponibles qu'au niveau national. Dans ce cas, l'estimation des coûts par façade a été effectuée au prorata du nombre moyen d'emplois (ETP) de la conchyliculture sur la période 2017-2020<sup>5</sup>. Un autre point de méthode concerne les modalités d'affectation des coûts selon les catégories retenues par l'AES. Comme lors des évaluations du cycle 1 et du cycle 2 de la DCSMM, on considère que les coûts des missions et actions menées par l'administration du secteur relèvent à la fois de coûts de suivi de l'activité et de coûts de prévention. Mais en l'absence d'information permettant d'évaluer l'importance respective de ces différentes actions, leurs coûts ont été arbitrairement répartis de manière égale entre suivi et information d'une part et prévention d'autre part<sup>6</sup>. En revanche, les budgets des organisations interprofessionnelles régionales (Comités régionaux de la Conchyliculture - CRC) sont en majorité classés en coûts de prévention puisque, hormis les missions de surveillance du milieu et des ressources et de nettoyage et restructurations du DPM, leurs missions relèvent principalement d'actions de « préservation des cheptels et systèmes de production » (cf. 2.2.). Contrairement aux évaluations du cycle 1 et 2, les coûts des missions menées par l'organisation interprofessionnelle nationale (CNC) ne sont pas pris en compte dans cette évaluation. Selon le CNC, ses missions relèvent uniquement de l'organisation de l'interprofession et de ses marchés et d'actions de communication générique ou liées à l'image des métiers et produits. Le budget du CNC ne couvre donc que des frais de fonctionnement pour l'exécution de ces missions.

La comparaison des coûts entre le cycle 2 et le cycle 3 de l'évaluation de la DCSMM pour la façade MED est faite en considérant que les coûts du cycle 2 pour cette façade sont égaux aux coûts de la sous-région marine Méditerranée occidentale.

### 2.1. Coûts des mesures de suivi et d'information

<sup>5</sup>La répartition moyenne des emplois par façade, sur la période 2017-2020, est la suivante : 15,4% MEMN, 36,2% NAMO, 36,3% SA, 12,1% MED (source : Agreste – Enquêtes aquaculture 2017, 2018, 2019 et 2020)

<sup>6</sup>



Les coûts retenus dans cette catégorie relèvent principalement de 4 domaines d'activité : administration du secteur conchylicole, organisations interprofessionnelles régionales, réseaux de suivi et d'observation, centres techniques en appui à la profession et recherche finalisée en soutien à la gestion des productions conchylicoles. Lors de l'évaluation du cycle 2, l'intégralité des coûts des études menées par les centres techniques en appui aux comités régionaux conchylicoles ont été classés dans la catégorie des coûts de suivi. Le détail des projets menés par les centres techniques a permis de répartir les coûts entre cette catégorie de coûts et la seconde catégorie de coûts (coûts des actions de préservation et prévention) en fonction des actions menées par ces structures.

#### *2.1.1. Coûts d'encadrement des activités conchylicoles*

Ces coûts ont été évalués à partir des dépenses de l'administration centrale (personnels de la DPMA) et des services déconcentrés de l'Etat (DDTM/DML, etc.) alloués à l'action « Gestion Durable des pêches et de l'aquaculture », soit 15,1 millions d'Euros en moyenne sur la période 2017-2020 (LFI programme 217). Les coûts de personnels sur cette action ont été répartis entre 37,5% pour l'administration centrale et 62,5% pour les services déconcentrés (données 2014). Si l'on considère par ailleurs que le personnel dédié à l'aquaculture représente environ 10% des emplois au niveau national (DPMA) et que l'on répartit les personnels des services déconcentrés au prorata des emplois pêche et aquaculture marine (49,6% pour l'aquaculture), on obtient des coûts en personnel de 530 milliers d'Euros au niveau national et de 4 883 milliers d'Euros dans les services déconcentrés, soit un coût de personnels annuel total de 5,4 millions d'Euros en moyenne 2017-2020 pour l'encadrement de l'aquaculture marine<sup>7</sup>. En répartissant ces coûts au prorata des emplois conchylicoles par façade, on obtient un coût annuel moyen de 653 milliers d'euros pour la façade maritime MED.

Ce montant ne tient pas compte des coûts de structure, ni d'interventions spécifiques, est très probablement sous-évalué<sup>8</sup>.

Pour mémoire, seule la moitié des coûts des personnels des services généraux pour l'aquaculture a été imputée aux coûts de suivi et d'information (cela concerne par exemple la gestion des concessions et des concessionnaires, des enquêtes statistiques, etc.), tandis que l'autre moitié est inscrite au titre des actions de prévention et d'évitement.

#### *2.1.2. Coûts d'organisation de l'interprofession nationale conchylicole*

Les statuts et missions générales des comités interprofessionnels sont définis par le Code Rural et de la Pêche Maritime. L'article L. 912-6 stipule que les membres des professions qui se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture doivent, quel que soit leur statut, adhérer obligatoirement à une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture. Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'article L. 912-7 détaille quant à lui les missions du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture, qui comprennent :

*1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;*

*2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ;*

*3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les*

7Il convient de noter que les agents travaillant sur l'aquaculture en centrale peuvent aussi travailler pour la pisciculture continentale.

8Contrairement aux coûts estimés à partir des données mises à disposition lors de l'évaluation du cycle 1 qui prenait en compte le budget global des services généraux de l'administration des pêches et cultures marines estimé, pour la partie aquaculture, à 13 millions d'Euros en 2008.

*intérêts de ces secteurs ;*

*4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;*

*5° La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;*

*6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchyliques.*

Le CNC assure plus particulièrement la défense des intérêts généraux de la filière conchylique au niveau national et européen et représente la profession dans ses relations avec les acteurs scientifiques et institutionnels. Le CNC assure une action de coordination des Comités régionaux et n'intervient donc pas directement dans des projets de gestion des ressources. Bien que ces coûts aient été pris en compte aux cycles précédents de l'évaluation<sup>9</sup>, le CNC ne souhaite que ce budget soit pris en compte dans cette nouvelle évaluation<sup>10</sup>.

### *2.1.3. Coûts de l'appui des CRC aux réseaux de surveillance et suivi des eaux conchyliques*

Comme lors de l'évaluation du cycle 1 et du cycle 2, les CRC ont fait l'objet d'une enquête pour recueillir des données sur leur budget, la répartition de leurs actions et leur mode de financement, et identifier leurs principaux domaines d'intervention (sanitaire, environnement, gestion intégrée, gestion des ressources...). Le financement des CRC est assuré par les CPO<sup>11</sup> (Cotisations Professionnelles Obligatoires) et par des subventions (FEP, État, Région, département) qui augmentent leur capacité à faire face à leurs différentes missions et à impulser diverses actions et/ou contribuer à leur mise en place. Avec la fin du programme FEP (derniers versements en 2014) et les changements accompagnant la mise en place du FEAMP (2014-2020), certaines demandes, comme celles visant à supporter les coûts de fonctionnement des CRC, ne sont plus éligibles. Dans ce contexte, certains CRC ont choisi d'augmenter leur taux de cotisation pour s'affranchir autant que possible des financements externes.

Les missions confiées aux CRC par la réglementation et rappelées en 2.1.2 les amènent à jouer un rôle prépondérant dans la gestion durable des ressources conchyliques et le suivi de la qualité de leur environnement :

- Les CRC ont été fortement impliqués au cours de la période précédente dans la révision et le suivi de la réalisation de l'évaluation environnementale des schémas des structures des exploitations des cultures marines. Dans la façade Méditerranée Occidentale, la révision du schéma des structures de l'Hérault a été validée par arrêté préfectoral en juin 2014<sup>12</sup> tandis que le nouveau SDS du Var a été validé par arrêté préfectoral en octobre 2020 ;
- Ils peuvent contribuer, grâce à l'emploi de gardes-jurés, au contrôle des pratiques d'élevage en relation avec les DDTM/DML ;
- Ils participent à la défense de la qualité des eaux conchyliques, au travers d'actions de sensibilisation des acteurs locaux, et accompagnent les professionnels sur les questions sanitaires et la gestion des mortalités en relation avec les réseaux d'observation ;

<sup>9</sup>Lors de la 2ème évaluation, les budgets du CNC (hors budget de communication) avaient été imputés pour moitié en coûts de suivi et d'information et pour moitié en coûts de prévention.

<sup>10</sup>Echanges avec le CNC en janvier 2022.

<sup>11</sup>Chaque CRC est indépendant pour fixer les taux de cotisation : le montant des CPO fait l'objet d'une délibération spécifique au sein du conseil des CRC, qui fixe également la répartition entre part fixe et part proportionnelle (à la surface des concessions).

<sup>12</sup>Arrêté du préfet de l'Hérault n° DDTM34-2014-06-04069 du 19 juin 2014 portant schéma des structures des autorisations d'exploitation de cultures marines situées dans le département de l'Hérault.

- Une grande partie des moyens humains des CRC sont consacrés à la mise en œuvre de la politique environnementale au sens large (Natura 2000...) et à la représentation et défense des intérêts de la profession dans des domaines couvrant les questions d'environnement et d'aménagement (classement des zones conchyliques, politiques de conservation, aménagement et gestion intégrée des activités s'exerçant sur le littoral).

Le CRC Méditerranée contribue à la surveillance de la qualité des eaux conchyliques notamment dans le cadre du partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de Thau pour la mise en place du Réseau d'Observation lagunaire (ROL) depuis septembre 2020. Ces coûts sont pris en compte dans le coût total des réseaux d'observation et de surveillance des productions conchyliques (cf. 2.1.4).

#### *2.1.4. Coûts des réseaux d'observation et de surveillance des productions conchyliques*

Ils correspondent aux coûts des réseaux Ifremer mis en place en partie dans le contexte de la réglementation européenne et aux coûts des réseaux régionaux complémentaires mis en œuvre par des centres techniques.

Les réseaux d'observation Ifremer comprennent en premier lieu le RESCO et MYTILOBS qui ont pour objectif de fournir des données normalisées de la survie et de la croissance pour des lots sentinelles présentant des origines communes et placés dans différents sites d'élevage d'huîtres creuses et de moule bleue. La création, en 2008, du réseau national d'observation de la reproduction de l'huître creuse, le réseau VELYGER, a permis de compléter le RESCO en apportant, sur six écosystèmes différents, une série d'indicateurs biologiques dont l'analyse croisée avec des indicateurs hydrologiques et climatiques permet de mieux appréhender les causes de variabilité du recrutement de l'huître creuse en France. Depuis 2018, la mise en œuvre et la gestion annuelle des deux réseaux complémentaires conchyliques RESCO et VELYGER sont désormais regroupées au sein de l'action ECOSCOPA. Ils forment un observatoire national unique pour le suivi du cycle de vie de l'huître creuse, dans un contexte de crises environnementales.

Les dispositifs de surveillance de la santé des mollusques marins autres que l'huître creuse et de la moule bleue sont regroupés au sein du REPAMO (REPAMO 2 à partir de 2015), réseau pathologie des mollusques. Ce réseau a pour objectif de détecter et d'identifier les agents pathogènes infectieux associés aux épisodes de mortalité anormale des mollusques marins afin d'aider l'autorité compétente à mettre en œuvre, si cela est possible, des actions permettant de limiter la propagation des maladies.

Au total, le budget annuel moyen des actions d'observation et de surveillance, dont la plupart font l'objet d'une convention avec la DPMA ou la DGAL, s'est élevé à 600 milliers d'Euros sur la période 2017-2021 pour la façade MED. Ce budget prend en compte le coût de l'appui des CRC aux réseaux de surveillance et suivi de la qualité des milieux (2.1.4). La part des coûts dédiés à la mytiliculture sur l'ensemble des réseaux (observatoire conchylique et réseau pathologie des mollusques) représente 33% des coûts sur la période 2017-2021.

Les observatoires des centres techniques contribuent à ces coûts d'observation avec les réseaux régionaux de suivi des productions conchyliques et des milieux. Les principaux acteurs dans ce domaine sont le SMEL (Normandie), le CAPENA (ex-CREAA depuis 2021), le SMIDAP et le CEPALMAR. Entre l'évaluation du cycle 2 et du cycle 3, le total des coûts annuels sur les 4 façades consacrés à des actions d'observation par ces acteurs régionaux, en relation avec les CRC, augmenté de 33% (d'environ 621 à 829 milliers d'Euros). Cette forte progression est liée à des efforts accrus d'observation des productions mytilicoles faisant suite aux mortalités massives observées à partir de 2014 (Charente-Maritime, Vendée et Pays de Loire). À l'échelle de la façade MED, ces coûts sont nuls pour les deux cycles de l'évaluation.

### 2.1.5. Coûts de la recherche appliquée en soutien aux productions conchyliques

La collecte des données sur cette catégorie de coûts s'est concentrée sur les actions de recherche menées par l'Ifremer en appui au secteur conchylicole, en l'absence de données concernant les programmes de recherche menés par les universités. Un certain nombre des actions de recherche en soutien au secteur conchylicole sont inclus dans la convention Ifremer/DPMA.

Pour l'Ifremer, les recherches finalisées en conchyliculture relèvent principalement des actions rattachées à la thématique « Santé animale », qui inclut, entre autres, le budget consacré au LNR (Laboratoire national de référence) et au LRUE (Laboratoire européen de référence).

Le montant des budgets de recherche Ifremer à imputer aux coûts de suivi et d'information (acquisition de connaissances) a été évalué sur la base des « coûts complets » fournis par l'institut. Le coût annuel moyen sur la période 2017-2021, au niveau national, est de 4,6 millions d'euros dont 0,5 million d'euros pour la façade MED. La majorité des actions sont de dimension nationale, et leur coût a été partagé selon les façades au prorata des emplois conchyliques. Les coûts des projets identifiés comme régionaux ont été attribués à la façade maritime concernée.

En parallèle, une évaluation des coûts des activités de recherche consacrées à l'ensemble des thèmes de dégradation a été menée à partir d'une approche globale : les effectifs des laboratoires actifs dans le domaine des sciences marines ont été recensés et multipliés par un budget annuel environné par chercheur (coûts de personnels et de fonctionnement) pour obtenir un coût total de la recherche, qui a ensuite été réparti par thème de dégradation au prorata de la production scientifique elle-même estimée via une approche bibliométrique. Cette approche globale estime à 6,1 millions d'Euros par an le coût de la recherche consacrée à la dégradation des ressources conchyliques, dont 1,78 millions Euros pour la façade Méditerranée.

### 2.1.6. Synthèse des coûts de suivi et d'information pour la façade Méditerranée

Le tableau de synthèse (Tableau 3) présente les données pour la façade maritime Méditerranée. Cette façade recouvre les régions conchyliques de l'Hérault (Etang de Thau) et du Var.

Tableau 3. Bilan des coûts de suivi et d'information pour la façade Méditerranée (en milliers d'Euros)

Cycle 3 (2017-2021)				
	Moyenne annuelle MED	Moyenne annuelle nationale	Période de référence des coûts	Sources
Administration - coûts de personnels des services généraux et déconcentrés	327	2 707	2017-2020	LFI programme 217*
Expertise DCSMM	1	8	2018-2020	MTE
AFB/OFB	10	42	2018-2021	OFB
Observatoire conchylicole et réseau de surveillance	600	2 197	2017-2021	IFREMER*, CRC Méditerranée
Observatoires régionaux (centres techniques)	0	829	2017-2020	CEPRALMAR (FEAMP**)
Projets de recherche nationaux et régionaux de l'Ifremer	500	4 621	2017-2021	IFREMER*
Recherche nationale sur la thématique « Ressources conchyliques »	1 780	6 110	2022	AMURE
<b>Total</b>	<b>3 218</b>	<b>16 514</b>		

\* Répartition par façade au prorata du nombre d'emplois conchyliques (uniquement pour les réseaux de suivi et projets de recherche nationaux dans le cas de l'IFREMER) ; \*\*liste des bénéficiaires FEAMP.

Compte tenu des hypothèses retenues en termes de répartition des coûts d'encadrement et d'organisation interprofessionnelle, le total des coûts de suivi et d'information relatifs aux ressources conchyliques s'est élevé à environ à 1,5 million d'Euros en moyenne annuelle 2017-2021 pour la façade maritime Méditerranée. Le récapitulatif des coûts à l'échelle de la façade (Tableau 4) montre que ce montant est augmenté par rapport à l'évaluation du cycle 2 de la DCSMM (1,3 millions d'Euros).

*Tableau 4. Récapitulatif des coûts de suivi et d'information pour les cycles 1, 2 et 3 pour la façade Méditerranée (en milliers d'Euros)*

	Evaluation cycle 1*	Evaluation cycle 2**	Evaluation cycle 3	Evolution cycle 2 / cycle 1	Evolution cycle 3 / cycle 2
Administration	817	333	327	-59%	-1,8%
MTE + OFB	/	/	11	ND	ND
CNC	73	129	ND	+77%	ND
Observation et surveillance	180	206	600	+14%	+191%
Recherche	796	617	2 280	-22%	+270%
<b>Total façade MED</b>	<b>1 866</b>	<b>1 285</b>	<b>3 218</b>	<b>-31%</b>	<b>+150 %</b>

*\*Principalement basée sur des données 2010 (sauf coûts de l'administration de 2008) ; \*\* Moyenne annuelle sur la période 2014-2016.*

*ND : non disponible*

Cependant, la comparaison n'est que partiellement possible car les coûts du CNC ne sont plus renseignés pour ce cycle et, à l'inverse, le financement de l'expertise pour la DCSMM, par le Ministère de la Transition Ecologique, ainsi que les budgets de l'OFB pour les actions de gestion des ressources conchyliques n'étaient pas renseignés au cycle précédent de l'évaluation.

Les principaux postes de coûts en 2017-2021 sont, par ordre décroissant, les budgets de recherche (en partie conventionnés avec la DPMA), suivis par les coûts des réseaux d'observation et de surveillance, puis des coûts d'encadrement de l'administration (coûts de personnel uniquement). Entre le cycle 2 et le cycle 3, les coûts de la recherche sont nettement à la hausse (+270%), de même que les coûts d'observation et de surveillance (+191%).-

## 2.2. Coûts des mesures de prévention et de préservation

Les coûts des actions consacrées à la prévention de la dégradation des ressources conchyliques et à leur préservation, intègrent la moitié des coûts relatifs aux services généraux de l'administration des Cultures Marines (cf. supra). Les coûts des services déconcentrés incluent notamment les coûts du contrôle sur le DPM. Les autres coûts de prévention se rapportent aux actions menées par les CRC et au montant des études réalisées par les centres techniques en soutien au secteur (études et/ou expérimentations visant à optimiser les productions et réduire les mortalités par des innovations et changements de pratiques conchyliques). Le détail de ces coûts montre que ce sont des actions presque exclusivement de prévention.

### 2.2.1 Approche des coûts supportés par les CRC

Indépendamment des missions générales qui incombent aux CRC et qui ont été rappelées en 2.1.2, ces derniers peuvent être engagés dans certaines études et projets (avec l'appui ou non des centres techniques) visant à prévenir ou éviter les dégradations des ressources conchyliques.

Les CRC interviennent de fait dans de nombreuses réunions qui mobilisent, en plus des personnels permanents, des professionnels membres du bureau des CRC ou de différentes commissions, et dont le coût est difficilement chiffrable (du fait de l'absence de défraiement).

Un aperçu de ces études permet de faire le lien avec les causes de dégradation des ressources identifiées pour la façade Méditerranée dans la fiche « utilisation de nos eaux ». Certaines des études mentionnées ont été financées au-delà la période 2017-2021.

- CRC Méditerranée : le Comité est engagé dans des actions d'accompagnements, de diversification et de sécurisation des activités conchylicoles. Le CRC participe au projet CocoriCO2, mentionné au 2.2.2. Une étude pour la reconquête de la production conchylicole en mer ouverte est également menée par le CRC Med pour sécuriser la production.

Les budgets des CRC qui ont été affectés aux coûts des mesures de prévention correspondent au montant des budgets totaux après déduction des :

- budgets de communication et de promotion ;
- co-financements de réseaux d'observation (déjà intégrés dans le bilan des coûts de suivi en 2.1.6) ou d'études en partenariat avec les centres techniques (la part CRC a alors été comptabilisée dans la rubrique « autres études en soutien à la profession ») ;
- coûts de nettoyage et restructuration du DPM conchylicole, inclus dans les coûts de remédiation (cf. 2.3).

Concernant la façade MED, ce coût s'élève annuellement, en moyen sur la période 2017-2021, à 476 milliers d'euros.

#### *2.2.2 Coûts de la recherche appliquée en soutien à la préservation des ressources conchylicoles*

Dans le cadre du FEAMP, plusieurs projets de recherche éligibles au titre de la mesure 47 (innovation en aquaculture) ont été approuvés et financés sur la période 2017-2021, tel que le projet CocoriCO2. Ce projet national, financé à partir de 2020, a pour objectif d'améliorer la résilience et la durabilité des productions conchylicoles françaises, dans un contexte d'élévation des températures et d'acidification du milieu marin. Ce projet est mené par l'Ifremer, en partenariat le Laboratoire d'Océanographie de Villefranche (Sorbonne Université/CNRS), les CRC de Bretagne Nord et de Méditerranée et le CNC.

D'autres projets de recherche menés par l'Ifremer à l'échelle régionale (ECOMAP) ou nationale (ADAQUA, PEMEC, SOAP) cherchent à développer des systèmes de traitement de l'eau pour les établissements conchylicoles afin de prévenir des contaminations et sécuriser les productions conchylicoles.

Les coûts de la recherche en appui à la profession menés par des centres de recherche ou centres techniques pour la préservation des ressources conchylicoles s'élèvent annuellement en moyenne à 535 milliers d'Euros à l'échelle nationale, sur la période 2017-2021. Les coûts alloués à la façade MED représentent 8,4% de ces coûts nationaux.

#### *2.2.3 Synthèse des coûts de prévention et de préservation*

Le tableau de synthèse (Tableau 5) présente les données pour la façade maritime Méditerranée et au niveau national.

Compte tenu des hypothèses retenues en termes de répartition des coûts d'encadrement et d'organisation interprofessionnelle nationale, le bilan du coût moyen des actions de prévention et de préservation s'établit à 6,1 millions d'Euros au niveau national et à 852 milliers d'euros à l'échelle de

la façade Méditerranée (Tableau 5). Ce montant a augmenté de 8,5% par rapport aux mêmes coûts estimés lors de l'évaluation du cycle 2.

*Tableau 5. Bilan des coûts des actions de prévention\* pour la façade Méditerranée (en milliers d'Euros)*

Cycle 3 (2017-2021)				
	Moyenne annuelle MED	Moyenne annuelle nationale	Période de référence des coûts	Sources
Administration - coûts personnels services généraux et déconcentrés	326	2 707	2017-2020	LFI programme 217**
AFB/OFB	4	12	2018-2021	OFB
CRC (hors budgets promotion, entretien et financement CT)	476	2 895	2017-2021	CRC
Autres études en soutien à la profession	45	535	2017-2021	IFREMER**
<b>Total</b>	<b>852</b>	<b>6 150</b>		

\*Aucune action de préservation n'a été identifiée pour la période correspondant au cycle 3 de l'évaluation DCSMM.

\*\* Répartition par façade au prorata du nombre d'emplois conchylicoles pour les projets nationaux.

*Tableau 6. Récapitulatif des coûts des actions de prévention et de préservation pour les cycles 1, 2 et 3 pour la façade Méditerranée (en milliers d'Euros)*

	Evaluation cycle 1*	Evaluation cycle 2**	Evaluation cycle 3	Evolution cycle 2 / cycle 1	Evolution cycle 3 / cycle 2
Administration (2)	817	333	326	-60%	-2,1%
CNC (2)	73	129	ND	+77%	ND
AFB/OFB	/	/	4	ND	ND
CRC (hors budgets promotion, entretien DPM...)	130	292	476	+125%	+63%
Autres études en soutien à la profession	131	31	45	-76%	+45%
<b>Total façade MED</b>	<b>1 151</b>	<b>785</b>	<b>852</b>	<b>-32%</b>	<b>+8,5%</b>

\*Basée sur les données 2010 (CNC), 2009 ou 2010 (CRC), 2008 (DPMA) ; \*\*Moyenne annuelle sur la période 2014-2016.

ND : non renseigné

## 2.3. Coûts des mesures de remédiation

Le coût des actions de remédiation intègre le coût de l'entretien et de la réhabilitation du DPM par les CRC ainsi que le coût des projets de restauration des ressources conchylicoles menés par les instituts scientifiques et centres techniques en appui à la profession conchylicole.

### 2.3.1 Approche des coûts supportés par les CRC pour l'entretien et la restructuration du DPM

Les opérations de nettoyage et de restructuration du DPM conchylicole ont été rattachées aux mesures de remédiation. Elles visent en effet à restaurer de bonnes conditions d'exploitation des



ressources conchyliques et d'environnement physique, en réduisant la surcharge en biomasse des bassins, en éliminant les structures d'élevage abandonnées (supports de la prolifération d'huîtres ou autres coquillages dans les bassins de captage et sources de perturbations du milieu), et en éliminant les prédateurs et compétiteurs (bigorneaux perceurs, étoiles de mer, crépidules, etc.).

Les actions privées qui relèvent des obligations des entreprises en matière d'entretien de leurs parcs, de gestion des déchets conchyliques<sup>13</sup> et d'enlèvement des prédateurs et compétiteurs en conformité avec les cahiers des charges des autorisations d'exploitation de cultures marines ne sont pas comptabilisées ici, considérant qu'il s'agit de charges d'exploitation normales, destinées justement à éviter la survenue des problèmes de détérioration des sites d'exploitation. La collecte des déchets conchyliques peut en outre être organisée collectivement par les CRC, quand les entreprises ne sont pas trop dispersées, mais elle est financée dans ce cas majoritairement par les CPO des entreprises.

Les coûts des actions collectives portées par les CRC, et qui peuvent bénéficier de fonds européens, de l'État, des régions et des collectivités territoriales, sont les principaux coûts pour l'évaluation des coûts de remédiation. Ces opérations de nettoyage/restructuration des parcs conchyliques ont lieu de manière récurrente dans les bassins ostréicoles de la façade Sud Atlantique. Les secteurs des bassins de Marennes-Oléron et d'Arcachon, mobilisent des moyens réguliers et conséquents pour nettoyer et restructurer les zones atteintes par les friches, voire l'envasement. Sur la façade MED, aucune action de nettoyage et de restructuration des parcs conchyliques n'a été réalisée sur la période 2017-2021. Les actions du CRC Méditerranée ne couvrent pas non plus la collecte des déchets conchyliques, cette tâche incombe aux entreprises.

### 2.3.2 Synthèse des coûts de remédiation

Alors que le bilan des coûts de remédiation s'élève à un peu plus de 2,3 millions d'euros au niveau national, il est nul à l'échelle de la façade Méditerranée si l'on considère uniquement les coûts collectifs. Il n'y a pas d'évaluation des coûts privés de nettoyage des parcs et d'enlèvement des déchets. Le coût des actions de remédiation était également nul au cycle 2 de l'évaluation de la DCSMM pour la façade Méditerranée.

Tableau 7. Bilan des coûts de remédiation pour la façade Méditerranée (en milliers d'Euros)

Cycle 3 (2017-2021)				
	Moyenne annuelle MED	Moyenne annuelle nationale	Période de référence des coûts	Sources
Coûts d'entretien et de réhabilitation du DPM	0	2 061	2017-2021	CRC
Aides pour compenser les mortalités mytilicoles	0	0	X	<i>Pas de coûts pour le cycle 3</i>
Appui des centres techniques et scientifiques pour la restauration de l'huître plate	0	210	Variable : 2019-2021 ; 2017-2021	CAPENA (ex-CREAA) IFREMER
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2 262</b>		

<sup>13</sup>Ces déchets comprennent les coquilles, déchets plastiques (filets, poches), collecteurs usagés, carburant, lubrifiant, gros encombrants, ainsi que les moules sous-taille dans certaines régions mytilicoles.

Tableau 8. Récapitulatif des coûts des actions de remédiation pour les cycles 2 et 3 pour la façade Méditerranée – en milliers d’Euros

	Evaluation cycle 1*	Evaluation cycle 2**	Evaluation cycle 3	Evolution cycle 2 / cycle 1	Evolution cycle 3 / cycle 2
CRC	0	680	0	np	-100%
Centres techniques et scientifiques	0	0	0	=	=
Aides mortalités mytilicoles	0	0	0	=	=
<b>Total façade MED</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>np</b>	<b>-100%</b>

\*Basée sur les données, 2008 (DPMA) ; \*\*Moyenne annuelle sur la période 2014-2016.

### 3. Synthèse

L'évaluation des différents types de coûts aboutit à un total annuel de l'ordre de 4,1 millions d'Euros en moyenne sur la période 2017-2021 pour la façade maritime Méditerranée. Par ailleurs, les coûts liés aux impacts résiduels ne peuvent être estimés en l'état actuel des connaissances disponibles. Le bilan national atteint pour sa part un montant de près de 25 millions d'Euros (Tableau 9). Ces deux chiffres sont probablement sous-évalués compte tenu des données utilisées pour estimer les coûts d'administration du secteur. En raison de ce biais, on ne peut pas conclure avec certitude à une diminution des coûts liés à la dégradation des ressources conchyliques par rapport aux résultats de l'évaluation du cycle 2 de la DCSMM. Comme dans le cas des ressources exploitées par la pêche, les impacts résiduels de la dégradation des ressources conchyliques prennent *in fine* essentiellement la forme de pertes de bénéfices pour les entreprises du secteur : ces pertes de bénéfices restent par ailleurs la grande inconnue de cet exercice, mais nécessiteraient un projet de recherche dédié et la définition d'une méthodologie adaptée.

Tableau 9. Synthèse des coûts liés à la dégradation des ressources conchyliques exploitées pour la façade Méditerranée (en milliers d'Euros)

Coût des actions de suivi et d'information	Métropole	MED	Période	Source
<b>Administration et coordination de la gestion des ressources</b>	2 757 044 €	337 540 €		
Administration - Coûts personnels des services généraux et déconcentrés	2 706 669 €	326 546 €	2017-2020	LFI Programme 217
Expertise DCSMM	8 403 €	1 017 €	2018-2020	MTE/DEB
AFB/OFB	41 972 €	9 978 €	2018-2021	OFB
<b>Structures professionnelles</b>	- €	- €		
Organisation interprofessionnelle nationale	n. d.	n. d.		CNC
<b>Suivi, recherche et expertise</b>	13 756 846 €	2 880 413 €		
Recherche portant sur la thématique ressources conchyliques	6 110 000 €	1 780 000 €	2022	Amure
Projets de recherche IFREMER	4 620 613 €	500 096 €	2017-2021	Ifremer/DAJF
Observatoire conchylicole et réseaux de surveillance mis en œuvre avec l'appui des CRC	1 169 474 €	475 976 €	Variable, 2017-2020	CRC Normandie, PdL, PC, AA et MED
Observatoire conchylicole et réseaux de surveillance IFREMER	1 027 611 €	124 341 €	2017-2021	Ifremer/DAJF
Surveillance et réseaux de suivi centres techniques (SMEL, SMIDAP, CAPENA, CEPALMAR)	829 148 €	- €	Variable, 2017-2021	SMEL, SMIDAP, CAPENA
<b>TOTAL - Suivi et information</b>	<b>16 513 889 €</b>	<b>3 217 953 €</b>		
<b>Coût des actions de prévention</b>				
<b>Administration et contrôles des ressources</b>	2 718 682 €	331 049 €		
Administration - Coûts personnels des services généraux et déconcentrés	2 706 669 €	326 546 €	2017-2020	LFI Programme 217
AFB/OFB	12 013 €	4 504 €	2018-2021	OFB
<b>Actions de gestion</b>	3 430 504 €	520 753 €		
Organisation interprofessionnelle	n. d.	n. d.	x	CNC
CRC (hors budget promotion, entretien DPM et financement CT)	2 895 284 €	475 976 €	Variable, 2017-2020	CRC Normandie, PdL, PC, AA et MED
Projets de recherche IFREMER	388 663 €	44 777 €	2017-2021	Ifremer/DAJF
Projets de recherche centres techniques (SMEL, SMIDAP, CAPENA)	146 556 €	- €	2017-2018 ; 2017-2020 ; 2019-2021	SMEL, SMIDAP, CAPENA
<b>TOTAL - Prévention</b>	<b>6 149 186 €</b>	<b>851 803 €</b>		
<b>Coût des actions de préservation</b>	n. d.	n. d.		
<b>TOTAL - Préservation</b>	-	-		
<b>Coût des actions de remédiation</b>				
<b>Actions de gestion</b>	2 262 044 €	- €		
Entretien et restructuration du DPM	1 958 642 €	- €	2018	CRC 17, CRC AA
Projets de recherche régionaux	209 965 €	- €	2019-2021	CAPENA, SMEL
Projets de recherche IFREMER (Restauration de l'huître plate)	93 437 €	- €	2017-2021	Ifremer/DAJF
Aides pour compenser les mortalités mytilicoles	n. d.	n. d.	2017-2021	x
<b>TOTAL - Remédiation</b>	<b>2 262 044 €</b>	<b>- €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>24 925 119 €</b>	<b>4 069 756 €</b>		

## 4. Impacts résiduels

**Remarque :** la démarche employée pour caractériser le risque d'IR pour les autres thématiques de dégradation ne peut être appliquée ici faute d'informations suffisantes. Il est donc qualifié sur la base de l'étude des "schémas des structures des exploitations de cultures marines", dans les principales zones de production.

Les zones conchyliques étant utilisées par des secteurs d'activité économique marchands, les impacts résiduels liés à leur dégradation se manifestent sous la forme de pertes de bénéfices : ils correspondent aux « pertes de bénéfices associées à la dégradation des ressources conchyliques » ainsi qu'aux « pertes de bénéfices associées à la dégradation du milieu ».

En l'absence de données économiques pour quantifier ces pertes de bénéfices, l'approche retenue consistera à proposer un suivi d'indicateurs afin d'évaluer le degré d'atteinte des objectifs des documents de gestion existants.

Ces documents comprennent en premier lieu les schémas des structures des exploitations des cultures marines qui définissent les règles d'élevage par type de production et par bassin de production homogènes. En conformité avec leurs objectifs initiaux de pérennisation de l'activité conchylicole dans le respect de l'environnement, les SDS des départements de l'Hérault, du Var et des Alpes-Maritimes définissent un ensemble de mesures, parmi lesquelles les règles d'élevage par type de production et par bassin de production homogènes, en particulier des normes maximales de densité par bassin de production afin d'assurer les meilleures conditions de croissance des coquillages.

Ces documents de gestion comprennent également les documents de gestion relatifs au PNM du Golfe du Lion qui définissent des objectifs à atteindre pour la conchyliculture.

En ce qui concerne la qualité de l'eau, la présentation d'objectifs d'amélioration de la qualité du milieu dans certaines zones conchylicoles (ex. contrat de gestion intégrée du territoire de Thau, SAGE, etc.) et d'indicateurs de suivi, quand ils sont disponibles, est renvoyée aux fiches sur les thèmes de dégradation concernés.

### **Problématique des mortalités et « surmortalités » de coquillages**

#### *Objectifs sur les actions à mettre en œuvre*

Les schémas des structures des exploitations de cultures marines reprennent la réglementation générale des exploitations visant à une gestion durable des activités aux différents stades d'élevage :

- Les techniques autorisées pour lutter contre la prédation des daurades sont décrites dans le schéma des structures de l'Hérault (filets de protection à disposer autour des structures d'élevage).
- Le schéma n'intègre pas en revanche de mesures spécifiques concernant la prévention des surmortalités, mais rappelle l'obligation faite aux exploitants de signaler dans les plus brefs délais toutes mortalités anormales ou inexplicables à la DDTM-DML. L'interdiction des transferts de naissain d'huîtres en période de crise pour limiter la dissémination des maladies dans d'autres bassins conchylicoles relève quant à elle de l'application de la réglementation sanitaire.
- Pour limiter les risques d'eutrophisation du milieu et de malaïgue associés, le schéma des structures intègre des mesures à caractère environnemental concernant la gestion des rejets des eaux usées des mas conchylicoles (eaux de lavage, eaux de purification).

Les rejets des eaux riches en matières organiques sont interdits et chaque établissement à terre doit être équipé d'un décanteur qui reçoit toutes les eaux de lavage.

### **Problématique de la dégradation des conditions d'élevage (qualité des eaux conchylicoles et performances de croissance des coquillages exploités)**

#### *Objectifs sur les actions à mettre en œuvre*

Les schémas des structures des exploitations de cultures marines définissent les objectifs de la politique structurelle et les conditions d'exploitation par types de culture (en conformité avec l'application des directives environnementales) :

- L'objectif général est de « définir une politique d'aménagement des exploitations de cultures marines afin de garantir la viabilité économique des entreprises en tenant compte des aspects environnementaux, sanitaires et d'usage ».

- Les mesures à caractère cultural comprennent la détermination d'un nombre maximal de concessions par zone de production, qu'il s'agisse de l'élevage sous tables en étang ou des filières en mer, ainsi que la description des différentes structures d'élevage correspondantes (schéma des structures de l'Hérault)
- Elles incluent également des normes maximales de densité par technique et par stade d'élevage pour satisfaire aux « règles propres à assurer la meilleure croissance des cultures marines ». Exemple : pour le mode d'élevage traditionnel dans l'étang de Thau, ces normes fixent un nombre maximum de cordes par table (huîtres et moules) et un nombre maximum d'individus par table (huîtres).
- Les mesures environnementales du schéma des structures visant à réduire les risques d'eutrophisation issus des cultures marines concernent la gestion des eaux usées des mas conchylicoles (eaux de lavage, eaux de purification). Les rejets de ces eaux riches en matière organique sont interdits et chaque mas devra être équipé d'un décanteur.

### **Qualification du risque d'impacts résiduels**

Le risque d'IR a dans le cas présent été qualifié sur la base de l'étude des "schémas des structures des exploitations de cultures marines", dans les principales zones de production.

Sur la façade MED, tous les bassins étudiés ont des mesures de lutte contre la surexploitation (limitation des densités d'élevage pour l'ostréiculture et la mytiliculture), et donc, en termes d'effectivité, le risque d'IR est faible.

En revanche, ils n'ont pas de mesures de luttés contre les mortalités (interdiction de l'introduction de "naissain moribond" et encadrement des périodes d'ensemencement), donc le risque d'IR est fort de ce point de vue là.

### **Références**

Agreste, 2019. Enquête Aquaculture 2017. Agreste chiffres et données Juillet 2019 N°8

Agreste, 2020. Enquête Aquaculture 2018 Recensement Pisciculture, culture d'algues et de cyanobactéries 2018. Agreste chiffres et données Mai 2020 N°3 – version complétée en janvier 2021

Agreste, 2021. Enquête Aquaculture 2019. Agreste chiffres et données Mai 2021 N°5

Agreste, 2021. Enquête Aquaculture 2020. Agreste chiffres et données Novembre 2021 N°16

Bertran, R. Le Clanche, J. -F., 2012. Etat des lieux de la filière ostréicole : bilan des recherches et des projets de sortie de crise. Partenaires : FSE, Réseau aquacole.

ICES WGMASC Report, 2011. Report of the Working Group on Marine Shellfish Culture. Steering group on human interactions on ecosystems. La Trinité sur Mer, 5-8 avril 2011.

Météo-France, 2017. Bilan 2017. Disponible sur :

<http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/bilan-2017>

Normand, J., Louis, W., & Grizon, J. (2019). MYTILOBS Campagne 2017-2018, Réseau d'observation des moules d'élevage sur la côte Atlantique et dans la Manche.

Normand J., Benabdelmouna A., Louis W., Grizon J. (2020). MYTILOBS Campagne 2018 - 2019, Réseau d'observation des moules d'élevage sur la côte Atlantique et dans la Manche. RST ODE/UL/LERN/20-15. Convention DPMA 2019 – IFREMER. <https://archimer.ifremer.fr/doc/00653/76490/>

Normand J., Benabdelmouna A., Louis W., Grizon J. (2021). MYTILOBS Campagne 2019 - 2020, Réseau d'observation des moules d'élevage sur la côte Atlantique et dans la Manche. RST ODE/UL/LERN/21-07. Convention DPMA 2020 – IFREMER. <https://archimer.ifremer.fr/doc/00750/86251/>

Pépin J.-F. *et al.* 2017. Mortalités de moules bleues dans les secteurs mytilicoles charentais et vendéens : description et facteurs liés – MORBLEU. R.INT.RBE/SG2M-LGPMM.  
<http://archimer.ifremer.fr/doc/00391/50288/>

Pépin J.F. et al, 2014. Mortalités massives de l’Huître creuse -Synthèse - Rapport final des études menées sur les mortalités de naissains d’huîtres creuses *C. gigas* sur le littoral charentais pour la période de 2007 à 2012. Septembre 2014 – ODE/LER-PC/ 14-05

Pépin et al, 2019. Mortalités de moules bleues dans les secteurs mytilicoles : description et étude des facteurs liés, action –MORBLEU-2018. RBE/SG2M-LGPMM-2019.