



**HAL**  
open science

## Sur la loi d'Ampère

P. Duhem

► **To cite this version:**

P. Duhem. Sur la loi d'Ampère. J. Phys. Theor. Appl., 1886, 5 (1), pp.26-29.  
10.1051/jphystap:01886005002601 . jpa-00238641

**HAL Id: jpa-00238641**

**<https://hal.science/jpa-00238641v1>**

Submitted on 4 Feb 2008

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

---

**SUR LA LOI D'AMPÈRE;**

PAR M. P. DUHEM.

Gauss a énoncé le premier la proposition suivante :

« Il existe une infinité de lois pour l'action d'un élément de courant sur un autre élément de courant, telles que l'action d'un courant fermé sur un élément de courant soit identique à l'action déterminée par la loi d'Ampère; mais, parmi toutes ces lois, une seule, la loi d'Ampère, est telle que l'action d'un élément de courant sur un autre élément de courant se réduise à une force unique dirigée suivant la droite qui joint les deux éléments. »

Depuis l'époque où Gauss a découvert cette proposition, on en a donné plusieurs démonstrations. La suivante nous paraît particulièrement simple.

La proposition en question résulte immédiatement de celle-ci :

*L'action d'un élément de courant sur un autre élément de courant est complètement déterminée lorsqu'on connaît l'action d'un courant fermé et uniforme sur un élément de courant, et lorsqu'on sait, de plus, que l'action élémentaire est dirigée suivant la droite qui joint les éléments.*

Soient  $ds$ ,  $ds'$  les deux éléments de courant; soient  $i$ ,  $i'$  les intensités des courants qui les traversent. Supposons que l'on puisse admettre pour l'action de l'élément  $ds$  sur l'élément  $ds'$  deux expressions distinctes, soumises toutes deux aux restrictions indiquées dans l'énoncé précédent. D'après la première expression,

les composantes de l'action de  $ds$  sur  $ds'$  auraient pour valeur

$$\begin{aligned} i'X ds ds', \\ i'Y ds ds', \\ i'Z ds ds'. \end{aligned}$$

D'après la seconde expression, ces mêmes composantes auront pour valeur

$$\begin{aligned} i'X_1 ds ds', \\ i'Y_1 ds ds', \\ i'Z_1 ds ds'. \end{aligned}$$

Supposons que l'élément  $ds$  fasse partie d'un courant fermé et uniforme quelconque. L'action de ce courant sur l'élément  $ds'$  doit être la même, que l'on accepte l'une ou l'autre des deux lois élémentaires. On doit donc avoir

$$\begin{aligned} \int X ds &= \int X_1 ds, \\ \int Y ds &= \int Y_1 ds, \\ \int Z ds &= \int Z_1 ds, \end{aligned}$$

les intégrales étant des intégrales curvilignes étendues à un contour fermé quelconque.

D'après les propriétés connues des intégrales curvilignes, ces égalités peuvent être remplacées par les suivantes :

$$(1) \quad \begin{cases} (X - X_1) ds = d\mathcal{F}(x, y, z), \\ (Y - Y_1) ds = d\mathcal{G}(x, y, z), \\ (Z - Z_1) ds = d\mathcal{H}(x, y, z), \end{cases}$$

$\mathcal{F}$ ,  $\mathcal{G}$ ,  $\mathcal{H}$  étant des fonctions quelconques des coordonnées  $x, y, z$  d'un point de l'élément  $ds$ .

Si les deux actions considérées sont dirigées suivant la droite qui joint les deux éléments  $ds, ds'$ , on devra avoir, en désignant par  $x', y', z'$  les coordonnées d'un point de l'élément  $ds'$ ,

$$\begin{aligned} (y' - y)Z - (z' - z)Y &= 0, \\ (z' - z)X - (x' - x)Z &= 0, \\ (x' - x)Y - (y' - y)X &= 0; \end{aligned}$$

et aussi

$$\begin{aligned} (y' - y)Z_1 - (z' - z)Y_1 &= 0, \\ (z' - z)X_1 - (x' - x)Z_1 &= 0, \\ (x' - x)Y_1 - (y' - y)X_1 &= 0. \end{aligned}$$

On déduit alors des égalités (1) les relations suivantes :

$$(2) \quad \begin{cases} (y' - y) d\mathfrak{J}(x, y, z) - (z' - z) d\mathfrak{G}(x, y, z) = 0, \\ (z' - z) d\mathfrak{F}(x, y, z) - (x' - x) d\mathfrak{J}(x, y, z) = 0, \\ (x' - x) d\mathfrak{G}(x, y, z) - (y' - y) d\mathfrak{F}(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

Posons

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(x, y, z) &= (y' - y) \mathfrak{J}(x, y, z) - (z' - z) \mathfrak{G}(x, y, z), \\ \mathbf{G}(x, y, z) &= (z' - z) \mathfrak{F}(x, y, z) - (x' - x) \mathfrak{J}(x, y, z), \\ \mathbf{H}(x, y, z) &= (x' - x) \mathfrak{G}(x, y, z) - (y' - y) \mathfrak{F}(x, y, z). \end{aligned}$$

Les égalités (2) permettront d'écrire

$$(3) \quad \begin{cases} \mathfrak{J}(x, y, z) dy - \mathfrak{G}(x, y, z) dz = -d\mathbf{F}(x, y, z), \\ \mathfrak{F}(x, y, z) dz - \mathfrak{J}(x, y, z) dx = -d\mathbf{G}(x, y, z), \\ \mathfrak{G}(x, y, z) dx - \mathfrak{F}(x, y, z) dy = -d\mathbf{H}(x, y, z). \end{cases}$$

Examinons la première égalité : la différentielle totale de  $\mathbf{F}(x, y, z)$  ne renfermant pas de terme en  $dx$ , la fonction  $\mathbf{F}(x, y, z)$  est indépendante de  $x$  ; il en est de même de ses dérivées partielles  $\mathfrak{G}(x, y, z)$  et  $\mathfrak{J}(x, y, z)$ . En raisonnant de même sur les deux autres égalités, on arrive à la conclusion suivante :

$\mathfrak{F}$  est une fonction de la seule variable  $x$ ,  
 $\mathfrak{G}$  est une fonction de la seule variable  $y$ ,  
 $\mathfrak{J}$  est une fonction de la seule variable  $z$ .

Mais les égalités (3) nous donnent également, en exprimant que les premiers membres sont des différentielles totales,

$$(4) \quad \begin{cases} \frac{\partial \mathfrak{J}}{\partial z} + \frac{\partial \mathfrak{G}}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial x} + \frac{\partial \mathfrak{J}}{\partial z} = 0, \\ \frac{\partial \mathfrak{G}}{\partial y} + \frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial x} = 0. \end{cases}$$

De là on déduit

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathfrak{F}}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial \mathfrak{G}}{\partial y} &= 0, \\ \frac{\partial \mathfrak{J}}{\partial z} &= 0. \end{aligned}$$

Si l'on joint ces résultats à ceux qui viennent d'être obtenus, on voit que les quantités  $\mathfrak{F}$ ,  $\mathfrak{G}$ ,  $\mathfrak{H}$  sont de simples constantes. En se reportant aux égalités (1), on trouve

$$X = X_1,$$

$$Y = Y_1,$$

$$Z = Z_1,$$

ce qui démontre la proposition énoncée.

---